




Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library



TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE NOSOLOGIE.

De hoc multi multas, omnes aliquid, nemo satis.

Inscription de la pierre d'Ensisheim.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE NOSOLOGIE,

Contenant une exacte classification de toutes les maladies, soit internes soit externes; la bibliographie des genres et des espèces qui les constituent, des tables analytiques à la fin de chaque volume, et une table alphabetique générale à la fin de l'Ouvrage;

Par M. BAUMES,

Professeur de Pathologie et de Nosologie à l'Ecole de Médecine de Montpellier, et ci-devant Professeur de Médecine et de Clinique de l'Université de Médecine de cette Ville; Ex-Président et Secrétaire-perpétuel de la Société de Médecine-pratique de Montpellier; Associé de la Société de l'Ecole de Médecine de Paris; Membre de l'Académie de Médecine, de la Société départementale de Médecine, de la Société médicale d'émulation, de la Société académique des Sciences et de la Société galvanique de la même Ville; des Sociétés de Médecine de Bordeaux, de Marseille, de Nancy, de Bruxelles, de Nismes, d'Avignon; des Sociétés des Sciences de Montpellier, de Dijon, de Vaucluse, du Gard, etc. etc.

TOME SECOND.

A PARIS,

Chez Crochard, Libraire, rue de l'Eccle de Médecine, N.º 8.

M. D. CCC. VI.



EXPOSÉ MÉTHODIQUE

Des classes, des genres, des espèces et des formes des maladies.

CLASSE DEUXIÈME.

CETTE deuxième classe est destinée aux maladies dans lesquelles l'état du système paroît lié avec un vice remarquable dans la quantité d'oxigène qui entre dans le corps des animaux vivans pour l'entretien et la coordination de leurs fonctions.

OXIGÉNÈSES.

Eth. Dénomination tirée de deux mots, dont l'un est oxigène s'élidant avec le dérivé de nosos, terme grec qui veut dire maladie.

Dans les considérations générales qui ont précédé la première classe, on a vu le calorique, dont il faut une si grande partie pour l'entretien de la vie, mériter la principale attention; relativement à l'explication des phénomènes propres à jeter du jour sur l'étiologie des maladies qui composent cette classe. Les autres substances élémentaires n'ont concouru que très-secondairement à les produire et à en varier la nature. En jetant un coup-d'œil sur la théorie de cette seconde classe, nous allons voir l'oxigène prendre le premier rang dans l'analyse sommaire des phénomènes qui peuvent nous frapper; sans toutefois en exclure le concours des autres principes qui influent sur les différences que présentent les maladies d'une même classe.

Cette réflexion mérite d'autant plus d'être faite, que l'on peut dire que le calorique est le premier principe de la nature; que toutes les compositions ou décompositions qui ont lieu et qui varient la scène du monde, ne consistent en dernier résultat que dans le dégagement ou l'absorption du calorique, ou, en d'autres termes, dans les effets propres au changement de température. Cependant le calorique, malgré ce qui vient d'être dit, n'a pas toujours la première part dans la cause des phénomènes dus à la série des mouvemens et

des actes chimiques qui s'opèrent; et c'est sous ce rapport que nous avons classé, sous les effets généraux de l'oxigène, plusieurs circonstances qui vont être brièvement retracées.

Le rôle que joue l'oxigène dans les divers phénomènes de la nature, est aujourd'hui connu de tous ceux qui ont la plus légère connoissance en chimie pneumatique. On sait que cet être singulier et unique en propriétés diverses, fondu et tenu en dissolution dans le calorique et dans la lumière, constitue un gaz connu sous le nom d'air vital; et si un composé a jamais mérité ce nom, c'est sans doute celui qui est strictement nécessaire à l'entretien de la vie; sans lequel il est impossible d'exister; et qui est le principal agent des combinaisons qui se font, à tous les instans, dans l'économie des animaux pour l'entretien et la série coordonnée de leurs fonctions.

L'oxigène ne parvenant (a), en grande par-

⁽a) Il y parvient en état de radical à Paide des alimens. M. Josse, dans son traité de la chaleur animale, considère l'oxigène sous un rapport plus précieux encore qu'on ne l'a fait avant lui, puisque, suivant

tie, dans les corps vivans que sous la forme de gaz, produit des effets complexes, c'est-à-dire, des effets résultans de plusieurs principes combinés. Les organes et les diverses parties soit liquides, soit solides des animaux étant fort avides de la base ou du radical de ce gaz, celui-ci doit se décomposer dès qu'il est en contact avec les substances qui l'attirent par le degré d'affinité qui se trouve entr'elles.

Un premier phénomène de cette décomposition est la liberté du calorique, de la lumière; conséquemment un changement de température; et avec ce changement naît une cause de combinaisons nouvelles qui n'ont lieu qu'en vertu de la température et du degré de pression atmosphérique. Encore cette pression est-elle subordonnée au calorique, puisque la compression ou condensation et la dilatation ou raréfaction de l'air atmosphérique sont dépendans de cette substance.

L'oxigène, à raison de ce premier ordre

cet auteur, les fonctions du poumon sont presque exclusivement oxigénantes; la caloricité dépendant plus immédiatement des phénomènes de la digestion,

de phénomènes ou d'effets, est tellement stimulant, qu'il excite fortement les solides du corps vivant, augmente la densité de certaines parties: ce qui tient à la fixation du radical du gaz oxigène; accroît la fluidité de certaines autres: ce qui dépend de l'action du calorique; qu'enfin il modifie la couleur: ce qui est imputable, en grande partie, à l'action de la lumière.

La fixation de l'oxigène se fait par une opération que l'on nomme combustion, et ses produits sont la formation d'un oxide, d'un acide ou d'un sel. Les parties oxidées deviennent plus pesantes; les substances acidifiées acquièrent une saveur nouvelle ou des qualités qui leur sont propres selon que ces acides sont concrêts, fluides ou gazeux.

Ces principes communs à la chimie morte et à la chimie vivante sont démontrés relativement au premier point de vue; ils le sont aussi, sous le second, par les faits que l'on possède et qui sont plus ou moins positifs.

On a observé que, si l'on place, sous une cloche pleine de gaz oxigène, un animal à sang chaud; sa respiration s'accélère, sa poitrine se dilate à un point considérable, le cœur et les artères se contractent avec force, ses yeux deviennent rouges et saillans, la sueur coule de toutes parts, et la température de tout son corps augmente.

Ainsi quand le gaz oxigène se décompose dans les corps des animaux, il s'y comporte d'après des lois physiques et chimiques. Son radical se fixe en retenant une portion de son calorique (a); mais la plus grande partie de ce principe se dégage, se répand dans le système et produit de la chaleur.

Or, tandis que les animaux vivans s'échauffent et augmentent de température en s'oxigénant, comment pourroit - on avancer que la respiration, qui est une grande fonction calorinante, quoiqu'elle ne soit pas exclusive, sert à rafraîchir le sang et à diminuer la

⁽a) M. BRUGNATELLI, qui paroît avoir bien saisi cette idée, a insisté sur la nécessité de distinguer le véritable oxigène ou la base pure et isolée de l'air vital, de l'oxigène passé à l'état concrêt avec une portion de calorique, qu'il propose d'appeler et qu'il nomme lui-même thermoxigène. Voyez journal de physique, réflexion sur les différences qui se trouvent entre l'oxigène et le thermoxigène, tom. LIII, pag. 353.

impression de l'air sur les surfaces du corps, de la bouche et des bronches paroît réellement rafraîchissante? Mais qu'on réfléchisse qu'un air plus ou moins frais se trouvant en contact avec des surfaces échauffées produit au premier instant un sentiment de fraîcheur: sentiment qui se dissipe avec la rapidité de l'éclair et que remplace celui d'une chaleur que tend encore à tempérer une évaporation soutenue.

De pareilles idées se retrouveroient au besoin dans les écrits des anciens.

En effet, dans la haute antiquité on admettoit un pneuma continuel dans l'air atmosphérique qui, par l'acte de la respiration, selon Aristote, se combinoit dans le cœur avec le sang, et que les artères répandoient dans les parties musculaires. Hippocrate reconnut même l'influence que ce pneuma avoit dans la production de la chaleur. La secte pneumatique qui s'établit vers le commencement du premier siècle de l'ère chrétienne, à la tête de laquelle on voit Chrysippe, qu'Athenée fit valoir, et qu'Arretée embrassa, expliquoit principalement les phénomènes des corps vivans,

par les effets de cet élément qu'ils appeloient esprit, dont la propriété étoit de pénétrer tous les corps et de les conserver dans leur état naturel. Bien long-temps après, le chancelier BACON prouva l'influence du sang imprégné du pneuma ou esprit vital sur les nerfs; et connoissant assez bien les propriétés de l'air, distinguant entre un air plus ou moins vital, et voyant que la respiration des animaux est aussi nécessaire que la nutrition, il observa, avec l'instinct du génie, que toute la vie peut être regardée comme une sorte de combustion que peuvent seule entretenir l'air et les substances combustibles. Mayow connut plus clairement la partie respirable de l'atmosphère. HENRI MUND, mort au commencement du dernier siècle, parla même de l'action de l'air sur la peau, et présente son esprit nitreux comme l'aliment de l'ame corporelle. Avec l'augmentation des connoissances chimiques, la vérité paroît dans tout son jour, et les phénomènes dus à la décomposition du gaz oxigène se montrent dans leur vraie étendue.

Toutes les expériences dans lesquelles l'oxigène a été immédiatement appliqué aux animaux; confirment que cette substance a toujours donné à ceux qui l'ont respiré plus de force, plus d'agilité. Il a ranimé la vigueur des gens foibles et languissans; il leur a donné de la vivacité et une disposition remarquable à la gaieté. Son action est si prompte et si énergique que, quand on le respire pur, on le sent dans la poitrine comme un esprit ardent; il semble qu'il brûle. Appliqué sur la peau quand elle est privée de son épiderme après l'effet d'un vésicatoire, il produit de vives douleurs, une sensibilité beaucoup plus exaltée. Aussi lorsqu'on a voulu le faire respirer aux personnes irritées, échauffées, en proie à une inflammation lente et chronique; ce gaz a-t-il empiré leur situation et augmenté l'intensité de leurs symptômes.

La nature a donc eu son but de réunir dans l'atmosphère le gaz oxigène avec le gaz azote; afin que le premier ne pût s'introduire qu'en petite quantité par l'acte de la respiration, et qu'il ne portât pas trop loin le principal foyer de la chaleur des animaux. Mais le gaz azote ne se décompose pas dans les poumons; le gaz oxigène seul éprouve cette décomposition; et lorsqu'on veut apprécier les

phénomènes de la respiration, lorsqu'il s'agit de l'air atmosphérique relativement à cette fonction; on ne peut avoir en vue que les résultats que donne la décomposition seule du gaz oxigène. Combien seroit donc vaine et contraire aux moindres connoissances en chimie une objection qui, pour combattre une opinion fondée sur les effets d'une quantité augmentée d'oxigène dans un air atmosphérique condensé, feroit valoir l'augmentation proportionnelle du gaz azote. L'objection se réfute d'elle-même.

En appréciant les effets du gaz oxigène, tenus dans de justes bornes, on se fait une idée de ce que ce gaz peut produire lorsqu'il agit trop activement et par une surabondance relative.

Les corps sont pénétrés d'un principe doué de facultés excitantes. Ce stimulus, appliqué sur des surfaces sensibles doit déterminer des irritations, des combustions, des inflammations qui ne sont que des combustions plus ou moins vives dans leurs effets, leurs symptômes et leurs conséquences.

Les vrais observateurs ne compareront point

les circonstances favorables à la production des maladies inflammatoires avec les qualités physiques et chimiques de la température, sans être frappés du rapport qui se trouve entre les unes et les autres.

Les inflammations règnent dans les régions habitables élevées, dans les sites septentriomaux, pendant les températures boréales (a), c'est-à-dire, dans tous les cas où l'air est plus vif, plus pur, plus condensé, plus piquant; et où, sous un volume donné d'air atmosphérique, le radical du gaz oxigène est plus abondant et se présente en plus grande quantité aux organes qui doivent se l'approprier.

⁽a) On a cherché, avec quelque prétention, à infirmer cette vérité en avançant que les sièvres insammatoires sont très-rares en Russie et en Allemagne, fort communes au contraire en Italie et dans les régions ou climats chauds. Mais un homme instruit peut-il réfuter sérieusement un pareil énoncé ? sa réponse ne trouve-t-elle pas dans les écrits de Lancisi, de Ba-Glivi, d'Orlandi, de Vastapani, de Lind, de Clarke, d'Hillary, etc., qui ont si bien tracé le caractère des maladies des climats chauds; ainsi que dans ceux de Mertens, de Samoilowits, de Vans-wieten, de Storck, de De Haen qui ont écrit sur les maladies propres à leurs contrées.

Il est hors de doute que lorsque l'air est plus condensé, ou le calorique se combine plus intimement avec lui, ou ce principe est en quantité moindre dans sa masse, par une suite du principe que la solidification relative d'une substance composée se fait toujours au dépens du calorique.

La lumière est nécessaire, elle est indispensable pour une parfaite dispensation de l'oxigène; sans elle ce principe se combine trop abondamment dans le corps; il s'y combine d'une manière inégale, insuffisante pour la régularité des fonctions. Aussi ceux qui se soustraisent à ses influences favorables, comme une foule de citadins, un grand nombre de femmes, quelques artisans, sont tourmentés par des maladies qui dépendent du désordre de la mobilité soit nerveuse soit musculaire; et ces phénomènes paroissent liés avec un certain degré d'étiolement qui ne va point jusqu'à l'asthénie, jusqu'à la cachexie par une suite de circonstances qui se rencontrent ici.

Ces résultats sont très-différens de ceux qu'on trouve chez les personnes dont le corps s'oxigène sous l'influence de la chaleur et de la lumière: témoin la vigueur des gens de campagne, des terrassiers, des laboureurs. L'expérience a démontré que l'effet de l'oxigène sur les muscles est de leur donner plus de densité. Il est du moins très-certain que les chairs des animaux suroxigénés ont été trouvées, dans les essais imaginés par le docteur Beddoés, plus fermes et plus compactes.

Une chose qui vient appuyer ces considérations et qui est relative aux suites de l'oxigénation dans la production des inflammations phlegmoneuses, car les inflammations érysipélateuses ou érythématiques sont d'un autre ordre; c'est que les membranes affectées d'inflammation s'épaississent à l'instar des métaux qui s'oxident, et qu'elles deviennent plus consistantes. L'albumine du sang et des autres humeurs acquiert de même une plus grande concrescibilité, quoique ses molécules bien pénétrées de calorique, dans l'inflammation, tendent de plus en plus à s'écarter, parce que l'écartement des molécules par le principe de la chaleur est une loi générale de la nature.

Et voilà ce qui donne la mesure de l'état du sang dans les maladies inflammatoires; ce qui rend raison de la disposition qu'a le sang inflammatoire de former la coenne; à résister

plus ou moins aux mélanges refroidissans. Il n'est point jusqu'aux terminaisons possibles et observables de l'inflammation qui ne montrent les effets d'une suroxigénation portée à l'excès; et combien cette théorie, à laquelle conduit évidemment l'analyse d'une foule de faits, ne se renforce-t-elle pas de l'opinion énoncée par M. Josse (a), que le poumon est l'organe condensateur dominant de l'oxigène; ainsi que des résultats généraux de cette observation : que les maladies inflammatoires phlegmoneuses sont essentiellement liées avec le degré de condensation de ce principe, et sur-tout avec le degré d'affinité que le sang et ses organes ont pour lui. On pourroit également invoquer les. témoignages de Reich, de Busch, etc.

Lorsque des faits d'un certain ordre prouvent qu'il y a oxigénation trop forte dans l'économie des animaux; lorsqu'on est assuré, par des faits d'un autre ordre, qu'en voulant dans ces cas suroxigéner le système, on porte à l'extrême les effets de la suroxigénation: sans doute on réunit, pour faire une preuve, les méthodes analytique et synthétique. Tout le monde

⁽a) De la chaleur animale, etc.

peut se convaincre qu'un certain régime qu'on ne peut s'empêcher d'appeler oxigénant; qu'un air trop pur, trop vif, trop vierge selon l'expression de BORDEU, et pour parler le langage chimique, un air suroxigéné; que la respiration ou une application quelconque de l'oxigène au corps des animaux plus ou moins éloignés de l'état de santé, font le plus grand mal dans les cas plus ou moins prononcés d'inflammation, d'irritation générale ou particulière. Les observations sont déjà suffisamment multipliées sur ce point, pour qu'on n'ose ou qu'on ne puisse point contredire cette assertion.

Un principe incontestable et général est que par-tout où il se forme des acides fluides ou concrêts, il y a eu oxigénation; puisque l'acidité n'est que le résultat de l'oxigène avec une base acidifiable. Une foule de faits, qu'il ne peut venir dans l'esprit de personne de contester, prouve que dans les corps vivans il se forme, soit en santé, soit en maladie, des humeurs ascécentes, même décidemment acides; qu'il y naît des corps étrangers, des calculs qui ne sont autre chose qu'une concrétion d'une substance acide. Donc il est plus

sieurs circonstances dans lesquelles des esprits; même prévenus, ne peuvent point nier qu'il ne se passe, dans l'économie des animaux, des opérations oxigénantes; et que leurs produits ne soient des causes plus ou moins puissantes de maladie.

Les effets de l'oxigène sur les corps vivans, l'existence d'une chimie vivante sauroient ils être mieux prouvés? Il n'est pas moins incontestable que, tandis que la suroxigénation du système produit des maux caractérisés par plus ou moins d'inflammation, d'irritation, de ce qu'on appelle spasme, enfin d'acidification; la diminution ou la privation relative d'oxigène doit influer sur l'état des forces, et produire des affections frappées d'un caractère particulier d'asthénie et de dégénération.

L'oxigène est fort avide de carbone; ce principe, abondant dans les végétaux, est introduit dans les corps vivans où, plus ou moins brûlé par l'oxigène, il contribue à la formation des oxides. Mais l'oxigène étant absorbé, employé, dissipé pendant l'exercice des fonctions, le carbone devient libre, il surabonde dans le sang veineux, influe sur la production des sucs gélatineux, bilieux et graisseux,

dans l'organe cutané, se combiner avec l'oxigène et le calorique, et s'échapper sous la forme d'un gaz impropre aux diverses fonctions de l'économie animale vivante.

La diminution respective de l'oxigène influe donc sur l'augmentation respective du carbone et même de l'hydrogène; dès-lors les fonctions languissent, les mouvemens deviennent foibles, les humeurs se dépravent, et la suspension des actions organiques va jusqu'à produire un état de mort apparente.

Pour se confirmer dans les idées que je viens de présenter, tant sur les effets de l'oxigénation que sur ceux de la désoxigénation, on n'a qu'à considérer que les plongeurs supportent d'autant plus la soustraction de l'air atmosphérique, c'est-à-dire, qu'ils restent d'autant plus long-temps dans l'eau, qu'ils ont oxigéné davantage le système, soit à l'aide de quelques remèdes, soit avec le secours de la nourriture. Ceux qui se trouvent dans le cas de la diathèse inflammatoire, ou voisins d'une inflammation, supportent plus long-temps un air, comme on dit méphitique; soit qu'un air hydrocarboné contribue à calmer des

parties qui sont dans un état habituel d'irritation; soit que le sang étant plus oxigéné dans ceux qui éprouvent des maladies inflammatoires, la privation, jusqu'à un certain point, d'air vital, leur est moins incommode.

Ne pourroit-on pas citer encore la force extraordinaire des maniaques, leur résistance habituelle aux diverses impressions de l'air, etc. etc.?

Ainsi donc l'oxigène est une substance trèsimportante, et sa considération est d'une utilité majeure dans l'étiologie des maladies. Ses phénomènes dans ses rapports de gaz oxigène ou d'oxigène concrêt, solide, sont très-nombreux et variés. Soumis à des lois d'attraction ou d'affinité, soumis à des anomalies dans ces mêmes lois, il devient le principe, la cause, l'instrument d'une foule de modifications auxquelles tiennent essentiellement la santé et les maladies, la vie ou la mort.

En excès, l'oxigène occasionne des maladies inflammatoires, spasmodiques, des affections dues à la production des sucs acides, à la formation des corps étrangers; et ces faits pathologiques incontestables viennent à l'appui de la manière d'agir de l'oxigène dans l'économie des animaux vivans.

En défaut, l'oxigène favorise la génération d'une foule de maladies marquées par la foiblesse, par la prédominance d'autres principes plus ou moins nuisibles au système.

Ainsi considérant l'oxigène dans l'universalité de ses effets, nous verrons naître une classe de maladies à laquelle sera affectée la dénomination d'OXIGÉNÈSES.

Cette classe aura deux sous-classes; l'une comprendra les maladies par suroxigénation ou par surabondance présumée d'oxigène; l'autre embrassera les affections par désoxigénation ou par diminution présumée de ce principe.

L'utilité pratique que présente cette classification, est que, dans les maladies par suroxigénation, les méthodes curatives qui emploient des remèdes dont la principale action consiste à céder leur oxigène, sont pernicieuses. Leur indication fondamentale est de priver l'économie animale du principe qui surabonde en elle. La clinique des maladies inflammatoires, celle des affections spasmodiques peut donc être épurée; et ce n'est point le seul service que peut rendre à la médecine pratique, une sage application des connoissances chimiques.

Dans les maladies par désoxigénation, aussi débilitantes ou asthéniques, que les maladies par suroxigénation sont actives, excitantes, sthéniques; il faut oxigéner fortement les corps vivans et se servir de tous les moyens que la nature et l'art donnent pour y parvenir.

Si je ne me trompe, il se rattache aux principes que je viens d'exposer des idées assez claires, assez justes, assez probables pour que je puisse les regarder comme très-propres à faire faire des progrès réels dans l'art de guérir.

Pour nous arrêter dans l'adoption d'une doctrine vraiment lumineuse, on nous citeroit vainement l'exemple d'HIPPOCRATE, dont le nom a percé la nuit des temps en entraînant la vénération des siècles qui se sont écoulés.

Mais les praticiens qui en appellent si gratuitement au grand HIPPOCRATE, et qui se plaisent à dire que ce philosophe n'a donné que des résultats d'observations, oublient, ainsi

que l'a très-éloquemment rapporté le savant Fourcroy (a), que l'art d'observer, dans l'ancienne Grèce, étoit, comme il sera dans tous les lieux et dans tous les temps, fondé sur un grand nombre de connoissances préliminaires; qu'HIPPOCRATE avoit réuni toutes les lumières des autres sciences cultivées de son temps; qu'il étoit un des plus grands physiciens de l'antiquité; qu'il avoit tout appris; qu'il n'avoit négligé ni l'histoire naturelle des animaux, ni l'étude de l'air, des météores, des grands phénomènes de la naure; qu'il en avoit fait l'application à la machine de l'homme; qu'il avoit même recherché jusqu'à l'influence prétendue des astres; en un mot qu'il étoit ce qu'un grand médecin doit être et sera toujours, au courant de toutes les connoissances humaines de son siècle, véritable philosophe, profond dans toutes les sciences immédiatement applicables à la connoissance de l'homme; et que, si peu de médecins ont approché du trône qu'on lui a élevé avec tant de justice, c'est qu'ils ont eu des vues trop courtes et trop rétrécies sur la manière de ce grand homme; c'est qu'ils ont cru, à tort, qu'il suf-

⁽a) Encyclop. méthod.; art. calorique.

fisoit de décrire sèchement les événemens des maladies et des remèdes; c'est, en un mot, parce que, méprisant en quelque sorte les lumières de toutes les branches de la physique, ils n'ont pu établir, comme l'avoit fait le philosophe de Cos, des bases solides pour élever l'édifice de l'expérience médicinale.

Sous - classe première.

DESOXIGÉNÈSES.

Les genres qui composent cette sous-classe, destinée aux maladies qu'on peut généralement attribuer à une diminution notable de quantité d'oxigène, sont:

XIII. L'Anæmie.

XIV. La Cyanose.

XV. La Blennose.

XVI. L'Adynamie.

XVII. La Gastrose.

XVIII. L'Helminthèse.

XIX. Le Stuporisme.

XX. La Démence.

XXI. Le Goître.

XXII. La Dyscinie.

XXIII. La Mélancolie.

Gen. XIII. ANÆMIE.

Eth. d'a, privatif; et aima, sang.

Syn. Anæmie, défaut de sang.

Bibl. PICHLER, Anæmia theoretice et practice illustrata; Tubing. 1756.

Car. A la blancheur matte de la peau, au refroidissement, à la foiblesse générale; se joint un pouls mou, foible et vide.

Rap. Anæmie apparente; J. F. Isenflamm, de anæmiå spuriå; Erlang. 1766.

Gen. XIV. CYANOSE.

Eth. de Cyanos, bleu; et nosos, maladie.

Syn. Melasictère (de melas, noir; et icteros, jaunisse); SAUVAGES, cl. X, cachexies;
ord. VI, ictérities; gen. XXXIII. — SAGAR,
cl. III, cachexies; ord. VI, icterities; gen.
XXXIV.

Maladie bleue; LENTIN, rec. périod. de littérature médic. étrang., tom. I, pag. 311. — Odier, bilioth. germ., scienc. et arts, tom. VI, pag. 164.

Car. L'habitude du corps ou seulement le

visage et les extrémités ont une teinte lividé et bleuâtre ou noîrâtre, avec un degré plus ou moins fort d'asthénie.

Var. A. Mélasictère nuancé; SAUV., loc. cit., esp. 1.

Le visage étoit verd jusqu'au cou, le côté droit du corps étoit noir et le gauche jaune.

B. Mélasictère périodique; SAUV., loc. cit., esp. 3.

La lividité revenoit tous les deux jours.

Gen. XV. BLENNOSE.

Eth. de blenna, mucosité; et nosos, ma-ladie.

Syn. Maladie muqueuse, affection pituiteuse.

Bibl. C. F. KALTSCHMID, de cacochymia pituitosa; Jenæ 1760.

HERLE, diss. de muco et morbis à muco oriundis; Lugduni-Batav. 1792.

CH. DARWIN, experiments establishing a criterion between mucaginous and purulent matter, etc.; Edinb. 1780.

Car. Il y a mollesse du pouls, chaleur moin-

dre qu'à l'ordinaire; la matière muqueuse ess abondante, et il y a diminution des forces.

Esp. I. Blennose pyrétique.

Syn. Fièvre pituiteuse ou phlegmatique de divers auteurs, notamment de Sarcone, istoria ragionata de mali osservati in Napoli, etc. part. II; — de Selle, pyretolog., Berlin, edit. 3, 1789, pag. 262; — de Stoll, de cognosc. et curand. febr. aphor. 376 et suiv.

Fièvre catarrale ou pituiteuse; GRIMAUD, vours de fièvres, tom. 111, pag. 69.

Fièvre putride lymphatico-mésentérique, ou fièvre pituiteuse; BAUMES, année médicinale, part. 1, pag. 213.

Fièvres adéno-méningées; PINEL, cl. 1, fièvres; ord. 111.

Fièvre latique (cachée) des auteurs barbares.

Bibl. REDERER et WAGLER, de morbo mucoso; Gotting. 1762--1765--1783.

Th. W. Schroeder, historia febris biliosopituitoso putridæ, quæ mense decembri 1783, etc. epidemice grassata est; Gotting. 1785.

Wiebers, discrimen inter febrim pituitosam,

et biliosam; Gotting. 1789; et coll. de Gottingue, tom. 1.

Car. Le pouls est fréquent avec lenteur; la chaleur est légère et sans acrimonie; l'urine est pâle, et dépose souvent une matière muqueuse; il y a sur la langue un sédiment blanc plus ou moins épais; les forces sont abattues et la fièvre, qui est soutenue, marche lentement.

S-esp. I. Continue.

Il y a peu de fièvre quoiqu'elle se soutienne; mais les nuits sont laborieuses et il y a au moins quelque tendance au dérangement des facultés intellectuelles.

Rap. A. Fièvre adéno-méningée continue; PINEL, loc. cit., gen. v.

Amphimerine latique; SAUV., cl. II, ord. II, gen. IV, esp. I.

B. Quotidienne continue des anciens; Bur-SERI, instit. med. pract. tom. I, pag. 397.

Var. A. Fièvre mésentérique pituiteuse; GRI-MAUD, loc. cit., pag. 91.

B. Fièvre pituiteuse putride générale; GRI-MAUD, loc. cit., pag. 195.

S-esp. II. Intermittente.

Var. A. Quotidienne.

Invasion de l'accès chaque jour, la nuit ou de grand matin, avec débilité et pâleur de la face; PINEL, loc. cit., gen. VI.

B. Quarte.

Deux jours d'intervalle; apyrétique, invasion de l'accès vers le soir, accroissement lent de la chaleur qui succède au froid; PINEL, loc. cit., gen. VII.

S-esp. III. Rémittente.

Plusieurs caractères de la blennose pyrétique avec des accès de fièvre intermittente.

Rap. Fièvre rémittente adéno-méningée; PINEL, loc. cit., gen. VIII.

Formes.

- Sor. 1. Fièvre épiale de Galien; Burseri, loc. cit., tom. 1, pag. 404.
- 2. Fièvre syncopale humorale d'Avicenne; Burseri, loc. cit., pag. 405.
- 3. Péripneumonie catarrale; Sauv., cl. 181, ord. 111, gen. XXII, esp. 6. Quoiqu'avec une

nuance inflammatoire, elle n'en appartient pas moins aux formes de la blennose.

Esp. II. Blennose apyrétique.

Car. Il y a mollesse et lenteur du pouls, foiblesse des mouvemens, inappétence, crudité des excrétions et autres symptômes qui varient d'après le siège de la congestion muqueuse.

Formes.

- Sor. 1. Asphyxie amnio-pituiteuse; la trachée-artère étant remplie de pituite et de la liqueur de l'amnios épaissie. Berhold, obs. sur une cause méconnue jusqu'à présent de l'asphyxie des nouveaux nés; rec. périod. de littérat. médic. étrang., tom. 1, pag. 225; et biblioth. germ., tom. 1, pag. 327.
- 2. Dyspermatisme muqueux (l'urètre étant obstrué par un mucus tenace, occasionne l'impuissance d'éjaculation); Sauv., cl. IX, ord. III, gen. XXXI, esp. 4.
- 3. Anorexie pituiteuse; SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XI, esp. 2.
- 4. Vomissement pituiteux; SAUV., cl. 1X, ord. 11, gen. XIII, esp. 26.—Ph. A. Boehmer, diss.

diss. nonnulla de vomitu pituitoso sistens; Hal. ad Salam 1778.

5. Hypochondrie pituiteuse; SAUV., cl. VIII, ord. 1, gen. v, esp. 4.

A. Hypochondrie asthmatique; SAUV., cl. VIII., ord. r, gen. v, esp. 7.

6. Épilepsie muco-trachéale; ARMET, journ. de médec., juin 1792; tom. XCI, pag. 117. 7. Asthme pituiteux.

Asthme pneumonique de WILLIS; humoral de BAGLIVI; pituiteux d'HOFFMAN.

C. F. KALTSCHMID, de asthmate pituitoso;
Jena 1757.

Il vient par périodes, ayant au commencement de l'accès une toux étouffée, et vers la fin, avec une toux aisée, une abondante expectoration de matière pituiteuse. Cette maladie dégénère en phthisie; et on l'a vue compliquée avec des symptômes très-angoissans.

gen. VIII, esp. I.

- B. Asthme stomachique; SAUV., ib. esp. 8.
- C. Dyspnée pituiteuse; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. VII, esp. 1.
 - 8. Phthisie pituiteuse.

Phthisie pulmonaire pituiteuse; Baumes, Tom. II.

traité de la phthisie pulmonaire, tom. 11; pag. 297, chap. 111, S. 530.

A. MURRAY, de phthisi pituitosa; Gotting. 1776; opusc. med., tom. 1, pag. 275; et coll. de BALDINGER, tom. v, pag. 316.

Il y a dyspnée avec une gêne plus marquée de l'expiration, toux grasse, expectoration visqueuse. La fièvre se met insensiblement de la partie, elle entraîne la maigreur, est accompagnée de crachats suspects, et pendant toute la maladie l'anorexie est plus ou moins constante.

A. Phthisie asthmatique, SAUV., cl. x, ord, gen. 11, esp. 5.

B. Anacatharse puriforme; SAUV., cl. IX, ord. IV, gen. XXIV, esp. 4. — R. A. Vogel, descatharro pharyngis; Gotting. 1765.

ord. v, gen. XXVIII, esp. 2.

ord. IV, gen. XX, esp. 2, var. 2.

ro. Colique pituiteuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 2.

11. Iléose pituiteux; SAUV., cl. IX, ord.
11, gen. XIV, esp. 5.

12. Amaurose pituiteuse; SAUV., cl. VI erd. 1, gen. IV, esp. 2.

13. Ischurie pituiteuse.

A. Néphro-phlegmatique ou ischurie rénale pituiteuse ou muqueuse; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIX, esp. 9.

B. Ischurie urétéro-phlegmatique, ou ischurie urétérique pituiteuse; Sauv., ib. esp. 15.

C. Ischurie cysto-phlegmatique, ou ischurie vésicale muqueuse; SAUV. ib. esp. 25.

D. Ischurie utétro-phlegmatique, ou ischurie urétrale muqueuse; SAUV., ib. esp. 33.

14. Diarrhée pituiteuse; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 4.

Pituitaire; Vogel, cl. 11, flux; ord. 11, apocénoses; gen. CXI.

A. Cæliaque muqueuse; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVII, esp. 3.

15. Cataracte muqueuse; Leveillé, rec. périod. de la société de médec. de Paris, tom. XII, pag. 397.

16. Météorisme gastrique; SAUV., cl. X, ord. 111, gen. XVIII, esp. 1.

Esp. III. Blennose fluante.

Syn. Blennorhée, de blenna, mucosité; et rheo, je coule.

Car. Excrétion muqueuse plus ou moins

abondante et soutenue par un émonctoire naturel, avec un certain degré de relâchement et de foiblesse.

S-esp. I. Rinorrhée.

Eth. de rhinos, nez; et rheo, je coule.

Syn. Nez morveux.

Car. L'écoulement vient de la membrane de Schneider, et se fait jour par le nez, quelquefois par les arrières-narines.

Rap. A. Coryze phlegmatorragique; SAUV., cl. 1X, ord. 111, gen. XXII, esp. 2.

S-esp. II. Cystirrhée.

Eth. de cystis, vessie; et rheo, je coule.

Syn. Maladie rare de la vessie; HOFFMAN, tom, IV, consil. medic., centur. II, cas...

Fluxion catarrale de la vessie; LIEUTAUD, précis de méd., édition in-8.º, tom. 1, pag. 596.

Glu; LINNÉ, cl. IX, évacuatoires; ord. IV, des parties génitales; gen. cc.

Catarre de la vessie urinaire; PINEL, cl.

vr, phlegmasies, ord. 1, des membranes muqueuses; gen. XIX.

Hypostase muqueuse, suite de la blennorragie; LANG, gazette salutaire, ann. 1792, pag. 237 et 235.

Hémorroïdes muqueuses de la vessie; Selig-MANN, de hæmorrhoidibus mucosis in universum, pag. 18.

Bibl. PARNHAM, de cystirrhæd, coll. d'E-dimbourg, tom. 111, pag. 251.

Car. L'écoulement a lieu par l'urêtre chez les personnes des deux sexes, et vient de la vessie avec les urines.

Rap. A. Dysurie muqueuse; Cullen, cl. Iv, ord. Iv, gen. CXXIV, esp. 6.

B. Pyurie muqueuse; SAUV, cl. IX, ord. III, gen. XXVIII, esp. 6.

C. Pyurie visqueuse; SAUV. ib. esp. 5.

D. Pyurie arthritique; SAUV. ib. esp. 9.

S-esp. III. Phallorrhée.

Eth. de phallos, membre viril; et rheo, je coule.

Car. L'écoulement se fait par l'urètre qui

en est le siège propre, sans indices de blennorragie syphillitique, ni de gonorrhée.

S-esp. IV. Métrorrhée.

Eth. de metra, matrice; et rheo, je coule.

Syn. Fleurs blanches, dénomination vulgaire.

Leucorrhée; Sauvages, cl. 1x, flux; ord.

111, de sérosité; gen. XXIX. — LINNÉ, cl. IX,

évacuatoires; ord. 1v, des parties génitales;

gen. CCII. — VOGEL, cl. 11, flux; ord. 11,

apocénoses; gen. CXIX. — SAGAR, cl. v, flux;

ord. Iv, séreux; gen. XXIX. — PINEL, cl. 11,

phlegmasies; ord. 1, des membranes muqueuses; gen. XXI.

Ménorragie blanche; Cullen, cl. 1, pyrexies; ord. 1v, hémorragies; gen. xxxix; esp. 5.

- Bibl. H. ALLEN, de fluoris albi charactere et notis quibus cum gonorrhæa convenit, yel differt et utriusque curatione; 1751.
- J. Juncker, de fluore albo titulo quidem et ortu benigno, curatione autem sæpius maligno; Halæ 1752.
- G. L. ALFFELD, de fluore albo, ex neglectu faminarum belgicarum præcipue propullante; Giessæ 1766.

RAULIN, traité des fleurs blanches; Paris 1766.

G. VAN DER HESP, de leucorrhæå; 1771.

J. SHORE, de fluore albo; Edinb. 1777.

STOLL, de fluore albo; coll. d'EYEREL, tom. 11, pag. 35.

G. KEATING, de leucorrhæa; Edinb. 1780; et coll. de Webster, 1781, tom. 11, pag. 235.

W. TRNKA, historia leucorrhææ; Vind. 1781.

P. J. M. ZIMMERMANN, de fluore albo; Gotting. 1788.

Car. L'écoulement est fourni par la matrice et se fait par le vagin.

Rap. A. Ménorrhagie incolore; Sauv., cl. IX, ord. I, gen. VI, esp. 7.

Hémorroïdes utérines de SENNERT.

- B. Leucorrhée américaine; Sauv., loc. ci., esp. 5.
- C. Leucorrhée indienne; SAUV., loc. cit., esp. 6.

Formes.

Sor. 1. Hystérie leucorrhoïque; SAUV., cl. IV., ord. IV., gen. XX., esp. 4.

S-esp. V. Elytrorrhée.

Eth. d'elytron, vagin; et rheo, je coulc.

Car. L'écoulement qui sort par la vulve ne vient que du vagin.

S-esp. VI. Proctorrhée.

Eth. de procthos, fondement, anus; et rheo, je coule.

Syn. Hémorroïdes blanches; Alberti, de hæmorrh., pag. 248.

Hémorroïdes décolorées, blanches et muqueuses; Juncker, tab. XIII, §. 2.

Hémorroïdes muqueuses; Cullen, cl. 1, ord. IV, gen. XXXVIII, esp. 1, var. B.

Bibl. S. SELIGMANN, de hæmorrhoidibus albis in universum; Gotting. 1782. Sect. 11, de hæmorrhoidibus mucosis ani, pag. 5.

JENECKE, de hæmorrhoidibus mucosis in specie; diss. de hæmorrhoidibus; Gotting. 1791, §. XXXII, XXXIV.

- Car. L'écoulement sort par l'anus et vient des parties qui l'avoisinent; sans indices de diarrhée, de dyssenterie ou de flux cœliaque.
- Rap. A. Proctalgie intertrigineuse; MAC-BRIDE, cl. 1, ord. IV, gen XII, esp. 5.
 - B. Urine pituiteuse (slymgraveel); VAN

DER HAAR, verhandelingen uitgegeeven door de hollandsche der veetenschappen te haarlem, x deels, etc.; Haarlem 1768; stuck, pag. 17.

Gen. XVI. ADYNAMIE.

Eth. d'a, privatif; et dynamis, force.

Syn. Maladies de foiblesse, de relâchement; laxum des méthodistes; atonie des patholologistes; affections asthéniques de Brown; débilités ou maladies paralytodées de Sauvages, cl. vi; adynamies de Vogel, cl. vi; débilités de Sagar, cl. ix.

Bibl. G. E. HAMBERGER, de atoniæ causis in genere; Jenæ 1751.

Id. de atoniá; Jenæ 1754.

C. A. G. HELLWIG, de debilitate corporis humani; Helmst. 1780.

Car. Langueur ou foiblesse dans l'exercice des fonctions, pouvant aller jusques à leur suspension.

S. I. Adynamie générale.

Esp. I. Asthénie.

Eth. d'a, privatif; et sthenos, force.

S-esp. I. Corporelle.

Syn. Asthénie; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. IV, leipopsychies; gen. XXI.—
LINNÉ, cl. VI, maladies quiétales; ord. I, défectives; gen. XCII.—VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. (asthénie) ccxxIII; gen. (torpeur) ccxxIV; gen. (adynamie) ccxxV.—
SAGAR, cl. IX, débilités; ord. IV leipopsychies; gen. XXI.

Car. Foiblesse des mouvemens volontaires; la lésion des facultés intellectuelles n'étant que consécutive.

Rap. A. Asthénie native; SAUV., loc. cit., esp. 17.

B. Asthénie américaine; SAUV., loc. cit., esp. 16. Effet de l'action du climat.

Var. A. Asthénie par exercice outré du corps; G. Ch. Ludwig, de immoderatis exercitationibus, causa debilitatis in morbis; Lips. 1763.

Formes.

Sor. 1. Hémorragie (du nez) passive; SAUV.; cl. IX, ord. 1, gen. 1, esp. 1.

Voyez sur les hémorragies passives, Cullen, cl. IV, locales; ord. IV, apocénoses; gen. CXVII, profusion.—Ludwig, de nimiis hæmorrhagiis, causa debilitatis in morbis; Lipsiæ 1763.

ord. I, gen. II, esp. II.

Hémoptysie helvigienne; SAUV., ibid esp. 17.

3. Enterragie 1.º hépatique.

Hépatirrhée; Sauvages, cl. IX, flux; ord. II, de ventre sanguinolens; gen. VIII. — SAGAR, cl. V, flux; ord. II, de ventre sanguinolens; gen. VIII.

Cholirique; Linné, cl. ix, évacuatoires; ord. iii, de l'abdomen; gen. CXCI.

- A. Hépatirrhée sanglante; Sauv.; loc. cit., esp. 6.
- B. Hépatirrhée scorbutique; SAUV., loc. cit., esp. 5.
- C. Dyssenterie scorbutique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. X, esp. 17.
- D. Diarrhée hépatirrhéique; Cullen, cl. 11, ord. 111, gen. LXI, esp. 6.
- E. Hépatirrhée intestinale; SAUV., loc. cit., esp. 2.
- F. Hépatirrhée mésentérique; Sauv., loc. cit., esp. 4.
 - 2.º Mélænique.

Maladie noire.

Melæna; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. II; de ventre sanguinolens; gen. XI. — SAGAR, cl. V, flux; ord. II, de ventre sanguinolens; gen XI.

Voy. F. Hoffmann, de morbo nigro HIP-POCRATIS; Halæ 1701; et BALDINGER selecta doct. viror. opuscula, pag. 1.

SIGWART, de hæmorrhagiā intestino-hepaticā; Tubing. 1758.

- S. A. D. Tissot, de morbo nigro, schirris viscerum etc. Laus. 1760 en français par Vicot.
- T. M. GASSER, de morbo nigro HIPPO-CRATIS; Argentor. 1761; et BALDINGER, loc. cit., pag. 24.
- I. P. Ronne, de sanguinis tam fluidi quam in scybalorum formam coacti, per alvum excretione; Erford 1767.

Schoningh, de morbo nigro HIPPOCRATIS; Groning. 1768; et BALDINGER ibid, pag. 42.

H. HALL, de melænå; Edinb. 1782, et dissert. medic Edinburg., art. 3.

- A. Mélæne sanguine. Le sang étant pur ou dominant fortement dans les déjections.
- A. Mélæne hémorragique; SAUV., loc .cit., esp. 4.

- B. Hématémèse noire; SAUV., cl. IX, ord.

 1, gen. IV, esp. 12.
- C. Mélæne première d'HIPPOCRATE; SAUV., loc. cit., esp. 5.
- D. Mélæne splénique; Sauv., loc. cit., esp. 1.
- E. Maladie noire sanguine, essentielle et primitive; BRIEUDE, rec. périod. de la société de médecine. de Paris, tom. 1, pag. 441, obs. 1.
- F. Maladie noire sanguine, symptômatique et critique; BRIEUDE, ib., pag. 442, obs. 2.
- G. Maladie noire sanguine, accidentelle; Brieude, ib., pag. 443, obs. 3.
- B. Mélæne atrabilieux. Le sang étant mélangé de matières bilieuses plus ou moins altérées.
- A. Mélæne atrabilieux; SAUV., loc. cit., esp. 3.
- B. Maladie noire atrabilieuse succédanée; BRIEUDE, loc. cit., pag. 447, obs. 5.
- C. Maladie noire critique; BRIEUDE, loc. cit., pag. 448, obs. 6.
- D. Maladie noire atrabilieuse sénile; BRIEUDE; loc. cit., pag. 449; obs. 7.

- 5. Ménorragie immodérée; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. VI, esp. 3.
- A. Hystérie ménorragique; Sauv., cl. IV, ord. IV, gen. XX, esp. 3.
- B. M. Hugvenin, de atonia uteri post partum, ejusque sequela hæmorrhagia; Argent.
- 6. Hématurie après la transfusion; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. V, esp. 13.
- 7. Hectique des flux; SAUV., cl. II, ord. I, gen. v, esp. II.
- 8. Rhumatisme dorsal; SAUV. cl. VII, ord. I, gen. III, esp. II; par l'abus des plaisirs vénériens.
- A. Lumbagie satyriasique; SAUV., cl. VII, ord. v, gen. XXX, esp. 15, par l'abus des femmes.
- 9. Leucorrhée nabothique; SAUV., cl. 1X, ord. 111, gen. XXIX, esp. 9.
 - 10. Anorexie exhaustique; SAUV. cl. VI, ord. 11, gen. XI, esp. 8.
 - A. Anorexie néophytique; SAUV., ib. esp. 11.
- G. G. Ludwig, de primarum viarum debilitate; Leips. 1748.
- ord. 1v, gen. XXXIV, esp. 4.
- de ventriculi imbecillitate; Edinb. 1755.

- den schwindel etc. Berlin 1791, esp. 3.
- 14. Typhe exhaustique; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. IV, esp. 8.
- A. Tremblement, typhode; SAUV., cl. 1V, ord. 111, gen. XIV, esp. 19. Symptôme de la sièvre carceraire.
- 15. Agrypnie sénile; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 9.
 - 16. Névrose apyrétique asthénique.
- A. Spasme par inanition; A. H. GERNHARD, de spasmo ab inanitione; Lips. 1755.
- B. Affections nerveuses et hypochondriaques, 1.º de Whytt, observations on the nature, causes and cure, of those disorders, which have been commonly called nervous, hypochondriac or hysteric, etc.; Lond. 1765; trad. franç, Paris 1767; 2.º de Vithers, observations on chronic weakness, etc. Yorck 1777,
- 17. Strabisme buffonien; SAUV., cl. IV, ord.

 1, gen. 1, esp. 3.
- 18. Eclampsie inanitique; SAUV., cl. IV, ord.: IV, gen. XVIII, esp. 8.
- A. Eclampsie fiévreuse; Sauv., ib. esp. 15. Attaquant les enfans de naissance avec grande foiblesse.

- ord. 111, gen. XIII, esp. 1.
- A. Convulsion onanismique; Sauv., ibid. esp. 12.
- B. Convulsion hémitotone; SAUV., ibid, esp. 16.
- 20. Pulmonie par irritabilité; WHITE, rech. sur la nature et les moyens curatifs de la phthisie pulmonaire ou consomption des poumons, trad. de l'angl. par TARDY, Paris 1795--an 111, pag. 119.
- A. Consomption pulmonaire de MAY; essay on pulmonari consumptions, etc. London 1792.
- 21. Cardialgie bradypeptique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 9.
- A. Gastrodynie américaine; SAUV., cl vII, ord. IV, gen. XXI, esp. 6.
- ord. 1, gen. IV, esp. 16.
- 23. Atrophie nerveuse; SAUV., cl. x, ord.

 1, gen. XIII, esp. 1.
 - A. Atrophie latérale; SAUV., ib. esp. 15.
 - B. Atrophie sénile; SAUV., ib. esp. 11.
- 24. Ischurie polyurique; SAUV., cl. x, ord. III, gen. XIX, esp. 22. Causée pour avoir retenu trop long-temps son urine.

25. Constipation

- 25. Constipation par foiblesse; Cullen, cl. IV, ord. V, gen. CXXIII, esp. 1.
- 26. Diarrhée acrisique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 7.

GLASER, de incontinentia alvi; Jena 1789.

- A. Lienterie secondaire; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XVIII, esp. 5.
- 27. Ephidrose sanguine; Ch. E. ESCHEN-BACH, de sudore Christi sanguineo pauca à principiis medicis; Rostoch 1766.
- 28. Enurèse enfantile; Sauv., cl. IX, ord.
 111, gen. XXVI, esp. 1.
- 29. Diabètes fiévreux; SAUV., cl. IX, ord. 111, gen. XXV, esp. 7.
- 30. Phrénésie inanitique; SAUV., cl III, ord. II, gen. XI, esp. 16.
- 31. Dyssenterie équinoxiale; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. X, esp. 14.
- A. Dyssenterie scorbutique; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. X, esp. 17.
- 32. Pétéchie apyrétique; E. G. GRAF, de petechiis sine febre; Gotting. 1775.
- 33. Ulcères chroniques; LOEFFLER, obs. de médec. et de chirurgie, en allem., Lips. et Altona 1791; bibl. germ., tom. 1, pag. 450.

 Tom. II.

w., . . .

S-esp. II. Mentale.

Car. Les facultés intellectuelles sont sans énergie ou affoiblies; et l'asthénie des forces corporelles n'est que consécutive ou secondaire.

Var. A. Asthénie par exercice outré des facultés mentales; G. Ch. Ludwig, de nimit animi defatigatione, caus à debilitatis in morbis; Lips. 1762.

Formes.

Sor. 1. Tristesse.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. 11.

Car. Abattement moral et état douloureux de l'imagination, éprouvés à l'occasion d'un bien perdu ou que l'on craint de perdre; et principalement exprimés par la langueur, l'œil abattu et le teint plus ou moins pâle et changé.

Var. A. Affliction.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Tristesse avec un degré très-marqué

d'accablement et de sensibilité, quelquesois ex-

B. Accablement.

Voy. VITET, loc. cit., esp. IV.

Chagrin prolongé; Tissot, traité des nerss; etc., tom. 11, part. 1, pag. 372.

Car. Tristesse soutenue avec un morne si-

Rap. A. Oubli pathématique; SAUV. cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. 5.

B. Anesthésie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. X, esp. 4.

C. Aphonie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XV, esp. I.

2. Morosité.

Syn. Abattement d'esprit; VITET, cl. v; maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XV.

Morosité; VITET, ib. esp. 1. — LINNÉ; cl. VI, quiétales; ord. 111, privatives; gen. 106.

Car. Inaction de l'imagination, allant quelquefois jusqu'à la privation de cette faculté, Var. A. Apathie.

Voy. VITET, ib. esp. 11.

Car. Affaissement de l'imagination, avec cessation de toutes passions.

3. Foiblesse.

Syn. Foiblesse d'esprit; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. VI.

Car. Facilité à laisser prendre aux autres un empire plus ou moins absolu sur soi-même.

Var. A. Foiblesse d'esprit par crainte; VI-TET, ib. esp. I.

B. Foiblesse d'esprit par amour; VITET; ib. esp. 11.

C. Foiblesse d'esprit par indolence; VITET, ib. esp. 111.

4. Radoterie.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. XI.

Car. Foiblesse de jugement qui porte à s'ap-,

pesantir sans cesse sur les mêmes objets, et à en rappeler par ses discours les circonstances les plus minutieuses.

5. Minutie.

Syn. Le minutieux; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. x.

Car. Disposition du caractère à ne point discerner ce qu'il y a d'essentiel dans les objets et à ne s'attacher qu'aux plus petites circonstances.

6. Irrésolution.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. XIX.

Bibl. DesTouches, comédie de l'irrésolu.

Car. Aptitude habituelle du jugement à suspendre son action, par défaut d'idées distinctes, ou par la crainte de quelque inconvénient souvent supposé.

7. Crainte.

Syn. Crainte; VITET, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XVII.

Appréhension; VITET, ib. esp. IX. — TISSOT; traité des nerfs, tom. II, part. I, pag. 389.

Car. Appréhension d'un mal futur, prévu ou présumé, avec trouble et désordre de l'imagination.

Rap. A. Syncope phlébotomique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 4.

Var. A. Peur.

Syn. Le peureux; VITET, ib. esp. vI.

Car. Disposition constante du caractère à s'effrayer, sans cause évidente, principalement pendant la nuit et dans l'obscurité; fréquente chez les enfans, chez les femmes et chez les hommes sans courage.

B. Lâcheté.

Voy. VITET, ib. esp. VII.

Car. Mouvement inquiet de l'imagination, habituel ou passager, qui porte à fuir à l'approche du danger qu'il faudroit vaincre.

C. Poltronnerie.

Voy. VITET, ib. esp. VIII.

Car. Mouvement inquiet de l'imagination, habituel ou passager, qui empêche d'aller audevant du péril qu'il faut supporter.

D. Pusillanimité.

Voy. VITET, ib. esp. x.

Car. Disposition habituelle de l'imagination qui porte à manquer de résolution, de courage et de fermeté, même dans les circonstances les moins difficiles.

E. Timidité.

Syn. Timidité; VITET, ib. esp. XI. Le craintif; VITET, ib. esp. XII.

Bibl. MARIVAUX, comédie du legs.

Car. Crainte déplacée de paroître et de parler devant quelqu'un; ordinairement avec contenance embarrassée, voix foible ou tremblotante, et confusion dans les idées.

8. Défiance.

Syn. Méfiance; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. 111.

Défiance; VITET, ib. esp. 1.

Car. Disposition habituelle à douter des vertus d'autrui et à craindre d'être trompé.

9. Crédulité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. 1v.

Car. Aptitude constante à adopter sans examen toutes les idées qu'on nous suggère, et à croire les choses les moins vraisemblables.

10. Paresse.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. v.

Car. Disposition soutenue à rester dans le repos, et à s'abandonner, avec une sorte de plaisir, à l'inaction.

Var. A. Fénéantise.

Voy. VITET, ib. esp. 1.

Car. Éloignement invincible pour le travail du corps et de l'esprit.

B. Nonchalance.

Syn. Nonchalance; VITET, ib. esp. 11. Indolence; VITET, ib. esp. 111.

Car. Aptitude constante et involontaire à n'agir qu'avec lenteur et mollesse, même avec indifférence.

11. Volupté.

Syn. Le voluptueux; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. x.

Car. Habitude dominante de rechercher les plaisirs des sens, et d'accroître par la ses jouissances.

Var. A. Molesse.

Syn. Mollesse; VITET, ib. esp. 1. Efféminé; VITET, ib. esp. 11.

Car. Disposition permanente à savourer tranquillement les plaisirs des sens, avec repugnance à faire le moindre effort pour se les procurer.

B. Sybaritisme.

Car. Trouble involontaire avec foiblesse de l'esprit et des sens à la vue de ceux qui se livrent à un travail corporel même ordinaire.

Esp. II. Lipothymie.

Eth. de leipo, je manque; et thymos; esprit.

Syn. Lipothymie; Sauvages, cl. vi, débilités; ord. IV, leipopsychies; gen. XXII.— LINNÉ, cl. vi, maladies quiétales; ord. i, défectives; gen. XCIII.— VOGEL, cl. vi, adynamies; gen. CCLXXIII.— Cullen, cl. 11, névroses; ord. 11, adynamies; gen. XLIV.— SAGAR, cl. IX, débilités; ord. IV; leipopsychies; gen. XXII.

Bibl. C. T. BRAUSER, an lipothymia venæ sectioni semper sine aliqua probabili causa superveniens ab ea abstinere jubeat; Gotting. 1756.

Car. Abattement subit et momentané des forces, n'allant pas jusques à supprimer tout à fait le pouls et les forces.

Rap. Lipothymie stomachique; SAUV., loc. cit., esp. 11.

Esp. III. Syncope.

Eth. de syncopto, je tombe.

Syn. Syncope; SAUVAGES, cl. VI, débilités;

ord. IV, leipopsychies; gen. XXIII. — LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. I, défectives; gen. XCIV. — VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLXXIV. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. II, adynamies; gen. XLIV. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. IV, leipopsychies; gen. XXIII.

Bibl. A. WESTPHAL, de animi deliquiis; Gryphisw. 1764.

HARE, de syncope; Edinb. 1782; et coll. d'Edimbourg, tom. IV, pag. 279.

Car. Abattement extrême des forces; le mouvement du cœur étant insensible ou suspendu.

Rap. A. Syncope stomachique; SAUV., loc. cit., esp. 13.

B. Syncope inanitique; SAUV., ibid esp. 1.

C. Éphidrose syncoptique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XX, esp. 4.

Esp. IV. Asphyxie.

Eth. d'a, privatif; et sphygmos, pouls.

Syn. Asphyxie; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. IV, leipopsychies; gen. XXIV. —— LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. I, défectives; gen. XCV. —— VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. cclxxv. — Cullen, cl. 11, névroses; ord. 11, adynamies; gen. XLIV. — SAGAR, IX, débilités; ord. IV, leipopsychies; gen. XXIV.

Bibl. J. J. BRUHIER, dissertation sur l'incertitude des signes de la mort; Paris 1742 et 1745, dern. édit. en 1749.

CH. E. ESCHENBACH, de apparenter mortuis; Rostoch 1766.

A. DE HAEN, de auxiliis præstandis his, qui aut in aquâ, aut aliis de causis suffocati, sive morti propinqui videntur, sive veram mortem simulant; rat. med. pars 13, tom. VIII, édit. de Par. 1771, pag. 349. — Id. tom. VIII, pars 11, pag. 1. — Id. tom. IX, pag. 187.

GARDANE, avis au peuple sur les asphyxies, etc., Paris 1774; et Catéchisme sur les morts apparentes dites asphyxies; Paris 1781, en allem., Berlin 1787.

Hufeland, dissertat. medic. sistens usum vis electricæ in asphyxiå, et. Gotting. 1783.

Engelman, cur rarum sit suffocatos, submersos et laqueo suspensos vitæ reddi, etc.; Lipsiæ 1787.

THIERRY, la vie de l'homme respectée et défendue dans ses derniers momens, etc.; Paris 1787.

Wanters, responsum ad quæsitum quæ tum medica, tum politica præsidia adversus periculosos inhumationum præfestinarum abusus, etc.? Bruxell. 1787.

PORTAL, observ. sur les effets des vapeurs méphitiques dans l'homme, sur les noyés, sur les enfans qui paroissent morts en naissant, etc., 6.° édit. in-8°; Paris 1787.

Steinfeld, de signis mortuis diagnosticis dubiis cauté admittendis et reprobandis; Jena 1788.

DE PRÉVINAIRE, traité sur les asphyxies; Bruxelles 1788.

Kite, an essay on the recovery of the apparently dead, etc.; Lond. 1788.

E. GOODWIN, the connection of lise with respiration, etc.; London 1788; en français par Hallé.

Herz, etc., uber die fruhe beerdigung der juden, etc.; Berlin 1788.

EHRHART, de asphyxia neophytorum; Memmingen 1789.

HOFFMAN, uber die den scheintodt, etc.; Coburg. 1790.

J. Curry, observations on apparent death, etc., Edinb. 1799.

Car. Asthénie portée jusques à l'état de mort apparente.

S-esp. I. Pulmonaire.

Syn. Asphyxie pulmonaire; Hallé, compte rendu à la classe des sciences mathématiques et physiques de l'institut national...., par la commission nommée pour examiner et vérifier les phénomènes du galvanisme.

Car. L'asphyxie est superficielle; toutes les parties du corps sont irritables; les fonctions seules de l'organe de la respiration sont abolies.

Rap. A. Asphyxie néophytique; Sauv., loc. cit., esp. 17.

S-esp. II. Corporelle.

Syn. Asphyxie corporelle; HALLÉ, ib.

Car. L'asphyxie est profonde; l'irritabilité de tout le corps est détruite.

Var. A. Asphixie des noyés.

Bibl. ROEDERER, observ. de submersis aquá; Gotting. 1760; et opusc. med., tom. 1, pars 11, pag. 337.

ISNARD, le cri de l'humanité en faveur des personnes noyées, etc. Paris 1762.

J. P EBHERARD, de submersorum vitâ restituendă; Halæ 1767.

CHAMPEAUX et FAISSOLE, expériences et observations sur la cause de la mort des noyés, etc.; Paris 1768.

PIA, détail des succès obtenus sur les noyés, etc.; Paris 1772 à 1789.

J. DONNEL, de submersis; Edinb. 1784; et diss. medic., Edinb., art. 23.

GOODWIN, de morbo, morteque submersorum investigandis, etc.; Edinb. 1786.

Vogel, diatribe medico-politica, de causis quare tot submersi in vitam non revocentur; Hambourg 1790.

P. Fine, de la submersion, ou recherches sur l'asphyxie des noyés, etc.; Paris an VIII.

B. Asphyxie des suffoqués.

Bibl. ROEDERER, de suffocatis; Gotting. 1754; et opusc. medic., tom. 1, pars 11, pag. 283. — De infantibus in partu suffocatis; Gotting. 1760, ib. pag. 345.

J. H. STOLTE, de morte suspensorum, aliisque huc spectantibus; Groning. 1766.

CHAUSSIER, réflexions sur les moyens propres à déterminer la respiration dans les enfans qui naissent, sans donner aucun signe de vie, etc.; hist. et mém. de la société roy. de méd., ann. 1780--81; Paris 1785, pag.

§. 2. Adynamie particulière

Esp. V. Dysopie.

Eth. de dys., difficilement; et ops, œil.

Syn. Amblyopie (d'amblys, émoussé; et ops, œil); SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. I, dysesthésies; gen. III. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. I, dysesthésies; gen. I.

Dysopie; Cullen, cl. IV, locales; ord.

1, dysesthésies; gen. xcIV.

Bibl. Fr. B. DE SAUVAGES, de amblyopiá;
Monsp. 1760.

Car. Vue foible, les parties qui servent à la vision conservant leur transparence.

S-esp. I. Myopique.

Syn. Myopie (de myo, je ferme; et ops, œil); LINNÉ, cl. X, difformes; ord. VII, déformations; gen. CCCIX.—Cullen, cl. IV, locales; ord. I, dysesthésies; gen. XCIV, esp. III.

Myopiase, Vogel, cl. XI, disformités; gen.

Vue

Vue courte, vue de jeunes gens.

Bibl. G. Ch. Detharding, de myopiá et presbyopiá; Rostoch 1756.

Car. Les objets ne peuvent être vus qu'à une courte distance.

Rap. A. Amblyopie myopique; SAUV., loc. cit., esp. 3.

S-esp. II. Nyctalopique.

Syn. Nyctalopie (de nyx, nuit; et ops, œil); cécité nocturne; héméralopie des Grecs.

Bibl. E. A. DE BERGEN, de nyctalopia seu cæcitate nocturna; Francofurt. ad Viad. 1754; et coll. de HALLER, tom. 1, pag. 359.

CHAMZERU, recherches sur la nyctalopie ou l'aveuglement de nuit, etc.; mém. de la société roy. de médec., ann. 1786, tom. VIII, pag. 130.

VALENTIN, dissert. medico-chirurg. de strumâ, bronchocele dictâ, et de hemeralopiâ; Nancy 1787.

Car. Les objets ne peuvent être vus que pendant le jour.

Tom. II.

Rap. A. Amblyopie crépusculaire; SAUV.; loc. cit., esp. 1.

B. Amblyopie absolue; SAUV., loc. cit., esp. 7.

C. Goutte sereine nocturne épidémique, ou nyctalopie; DUPONT, rec. périod. de la soc. de méd. de Paris, tom. II, pag. 80.

S-esp. III. Colorique.

Car. Il y a impossibilité de distinguer les couleurs.

Obs. de John Haddart, transact. philosoph., vol. LXVII.

Esp. VI. Dysosmie.

Eth. de dys, difficilement; et osme, odeur.

Syn. Anosmie; voy. le genre paralysie, l'anosmie des nosologistes confondant l'affoiblissement et l'abolition du sens de l'odorat.

Car. Affoiblissement de la faculté à laquelle est due la perception des odeurs.

Esp. VII. Dysgeustie.

Eth. de dys, difficilement; et de geysis, goûter.

Syn. Ageustie; voyez le genre paralysie, l'ageustie des nosologistes comprenant la débilité et la perte du goût.

Car. Affoiblissement de la faculté à laquelle ést due la perception des saveurs.

Esp. VIII. Dysecæe.

Eth. de dys, difficilement; et acouo, j'en-

Syn. Dysecœe; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. I, dysesthésies; gen. VII. — Vogel, cl. VI, adynamies; gen. CCXLVI. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. I, dysesthésies; gen. XCVI.

Car. Affoiblissement de la faculté à laquelle est due la perception des sons.

Var. A. Dysecœe myringique (causée par l'atonie de la membrane du tympan); SAUV., loc. cit., esp. 3.

B. Dysecœe monaute (provenant du défaut de l'oreille externe); SAUV., loc. cit., esp. 1.

Esp. IX. Dysphonie.

Eth. de dys, difficilement; et phonos, voix.

Car. Foiblesse, difficulté ou discordance dans la voix simple ou articulée.

S-esp. I. Psellique.

Syn. Psellisme; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. III, dyscinesies; gen. XVI. — LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. II, agitatoires; gen. CXXXVIII. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. III, dyscinésies; gen. CXIII. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. III; gen. XVI.

Psellotis; Vogel, cl. vi, adynamies; gen. CCLIX.

Car. Difficulté d'articuler les mots ou certaines parties de ces mots.

Var. A. Psellisme ischnophonique; Sauv., loc. cit., esp. 1. — Psellisme hésitant; Cullen, loc. cit., esp. 1. — Ischnophonie; Vogel, cl. vi, gen. cclx. — Battarisme; Vogel, ib., gen. cclxi. — Bégaiement.

Difficulté de prononcer facilement, sur-tout le premier mot d'un discours, et sans répéter souvent la première syllabe.

B. Psellisme rottacismique; SAUV., loc. cit., esp. 2.— Psellisme grasseyant; Cullen, loc. cit., esp. 2.— Traulotis ou blésité; Vogel, cl. VI, gen. CCLVIII.— Grasseyement.

Articulation particulière des mots, dans la-

quelle le son de la lettre R est toujours aspiré et est quasi redoublé (a).

C. Psellisme lambdacismique; SAUV., loc. cit., esp. 3. — Psellisme lallant; CULLEN, loc. cit., esp. 3.

De lambda, consonne de l'alphabet grec, qui étoit exprimée en hébreu par lamed, et qui a donné lieu à notre lettre L.

Vice de l'articulation qui fait que le son de

⁽a) La lettre R est au nombre des dentales, c'est-àdire des lettres dont la production suppose que la pointe de la langue s'appuie entre la racine des dents supérieures, comme pour y retenir la voix; de manière que l'explosion s'y opère et que la voix paroît en sortir. Ces lettres, chez les hébreux, sont zain, samech, thsade, resch, schin; et parmi nous, S, Z, R. Pour prononcer la lettre R, on commence par ouvrir la bouche, on pousse ensuite fortement la voix qui, étant arrêtée par les dents qui ferment le passage, est obligée de rouler dans le palais, à quoi contribue la langue qui se replie un peu dans son extrémité. Il faut pousser la voix fortement; ce qui rend la prononciation de cette lettre assez rude et difficile. Ceux qui ne la peuvent pas prononcer, mettent L en sa place : au reste ceux qui grasseyent par affectation, changent tous les G en D, tous les K en T, tous les J en Z.

la lettre L est plus mouillé ou se prononce à la place de la lettre R (a).

D. Psellisme traulotique; SAUV., loc. cit., esp. 4. — Psellisme émollient; Cullen, loc. cit., esp. 4. — Blésité.

Manière d'articuler, dans laquelle les lettres dures sont changées en molles, et la lettre S est souvent employée (b).

⁽a) La lettre L se trouve parmi les linguales: telles sont en hébreu, daleth, theth, lamed, nun, tau; et dans l'alphabet français, D, TH, L, N, T. En commençant de prononcer L, on ouvre la bouche, ainsi cette lettre n'est pas muette entièrement. La langue travaille peu, elle porte seulement la voix contre le palais contre lequel elle s'appuie par son extrémité. La mâchoire d'en bas contribue à la prononciation de cette lettre, portant la voix en haut. La trachée-artère retient aussi la voix; de sorte que cette lettre se prononce fort vîte, parce que le larynx se ferme tout à coup, et qu'on ne fait point d'effort pour pousser la voix.

⁽b) La lettre S, sigma des grecs, et samech des hébreux, attachée à la classe des linguales, a la plus grande affinité avec les lettres Z, CH, H et autres articulations linguales ou labiales, ce qui explique les permutations qui se font de ces différentes lettres. Cette lettre S se prononce lorsque les dents approchant les unes des autres, coupent la voix qui coule sur la lan-

E. Psellisme balbutique; SAUV., loc. cit., esp. 5. — Psellisme balbutiant; Cullen, loc. cit., esp. 5.

Sorte d'articulation qui fait que les lettres labiales (a) se font mieux entendre, ou que souvent on les prononce à la place des autres.

gue, laquelle s'appuie dans son extrémité contre les dents de dessus, et demeure droite; c'est pourquoi la voix n'étant point arrêtée, au contraire étant contrainte de passer avec vîtesse entre les dents, on entend un sissement semblable à celui d'un vent qui passe avec violence par une fente. Il faut pousser la voix fortement pour faire sonner cette lettre, ce qui la constitue primitivement une articulation linguale, sisslante et forte, dont la foible est ZE.

(a) Les articulations labiales sont celles qui sont produites par les divers mouvemens des lèvres; et les consonnes labiales sont celles qui représentent ces articulations. Les lettres labiales hébraïques sont beth, vau, mem, pe; dans le latin et dans le français, B, P, M, V, F. Les deux dernières, V et F, exigent que la lèvre inférieure s'approche des dents supérieures, et s'y appuye comme pour retenir la voix : quand elle s'en éloigne ensuite, la voix en reçoit un degré d'explosion plus ou moins fort, selon que la lèvre inférieure appuie plus ou moins fort contre les dents supérieures; et c'est ce qui fait la différence des deux articulations V et F, dont l'une est foible et l'autre forte.

F. Psellisme mogilalique; SAUV., loc. cit.; esp. 6. — Psellisme acheilos; Cullen, loc. cit., esp. 6.

Articulation des mots dans lesquels les lettres labiales ne sont qu'à peine ou point du tout prononcées.

G. Psellisme jottacismique; SAUV., loc. cit., esp. 8.

Manière d'articuler qui ôte la faculté de prononcer nettement les lettres gutturales (a) ou celles du palais.

Les trois autres B, P et M exigent que les deux lèvres se rapprochent l'une de l'autre : s'il ne se fait point d'autre mouvement lorsqu'elles se séparent, la voix part avec une explosion plus ou moins forte, selon le degré de force que les lèvres réunies ont opposé à son émission; et c'est en cela que consiste la différence des deux articulations B et P, dont l'une est foible et l'autre forte : mais si, pendant la réunion des lèvres, on fait passer par le nez une partie de l'air qui est la matière de la voix, l'explosion devient alors M; et c'est pour cela que cette cinquième labiale est justement regardée comme nasale. L'enchifrenement contribue donc à changer la lettre M en B.

(a) Les consonnes du gozier ou lettres gutturales sont, dans la langue hébraïque, aleph, he, ghet ou chet, hgain ou gnaim ou aiim; car les grammairiens ne s'accordent pas entre eux touchant la prononciation de

S-esp. II. Paraphonique.

Syn. Paraphonie (de para, vicieusement; et phonos, voix); SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. III, dyscinésies; gen. XVII.—Cullen, cl. IV, locales; ord. III, dyscinésies; gen. CXII.

Cacophonie; SAGAR, cl. IX, débilités; ord. III, dyscinésies; gen. XVII.

Car. Vice qui rend la voix désagréable, rauque, ingrate et obscure.

Rap. A. Enrouement (élocution avec sifflement); LINNÉ, cl. VIII, suppressoires; ord. I, suffocatoires; gen. CXLVI. — VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLII.

ces lettres, que les anciens grecs ne regardoient que comme des aspirations; c'est pourquoi, en exprimant les noms hébreux en grec, ils ne marquoient point ces lettres. Toutefois on appelle gutturales, les lettres dont la prononciation suppose que la pointe de la langue s'appuie contre les dents inférieures, afin que la racine de cette partie qui est gutturale ou voisine du gozier, s'élève pour intercepter la voix dans cette région d'où en effet on l'entend partir avec explosion propre à ce mécanisme. Nous n'avons point de gutturales que notre H, qui est la marque de l'expiration.

- B. Asaphie (obscurité de la voix); Vogel; cl. VI, adynamies; gen. CCL.
- C. Glapissement (voix aiguë avec bruit aigre); Vogel, cl. vi, adynamies; gen. ccli.
- D. Leptophonie (extrême gracilité de la voix); Vogel, cl. VI, adynamies; gen. CCLIV.
- E. Oxyphonie (voix aiguë, telle qu'on la produit lorsqu'on pousse des gémissemens et des plaintes); VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLV.

Var. A. Paraphonie pubertique; Cullen, loc. cit., esp. 1.

La voix devient grave et désagréable, d'aiguë et d'agréable qu'elle étoit auparavant, dans ceux qui se trouvent à l'âge de puberté.

B. Paraphonie nasale; SAUV., loc. cit., esp. 2. — Paraphonie résonnante; Cullen, loc. cit., esp. 111. — Rénophobie; Vogel, cl. VI, adynamies; gen. ccl. VI.

La voix ne passant pas par le nez, devient rauque et accompagnée d'un sifflement nasal.

Esp. X. Dyspermatisme.

Eth. de dys, difficilement; et spermatismos, ensemencement.

Syn. Dyspermatisme; SAUVAGES, cl. IX; flux; ord. 111, de sérosité; gen. XXXI.—Cullen, cl. IV, locales; ord. V, épischèses; gen. CXXV.

Stérilité; LINNÉ, cl. VIII, suppressoires; ord. II, constrictoires; gen. CLXXI.

Agénésie; Vogel, cl. vi, adynamies; gen. CCLXXXIII.

Bradyspermatisme.

Bibl. M. PERRIER, de bradyspermatismo; Monspel. 1761.

Car. Affoiblissement de l'émission de la liqueur séminale ou sperme.

Rap. A. Dyspermatisme apractode (produit par la mollesse du membre viril); SAUV., loc. cit.; esp. 7.

B. Dyspermatisme séreux; SAUV., ibid, esp. 8.

C. Anaphrodisie gonorrhoïque; SAUV., cl. VI, ord. II, gen. VIII, esp. 2.

Esp. XI. Dysesthésie.

Eth. de dys, difficilement; et aisthesis, sentiment.

Car. Diminution de la faculté tactile.

Rap. A. Anesthésie néophytique; SAUV.; cl. v1, ord. 1, gen. x, esp. 3.

Gen. XVII. GASTROSE.

Eth. de gaster, qui chez les grecs signifie tantôt tout l'abdomen, tantôt l'estomac seul, et qu'on emploie ici pour exprimer un genre de maladie qui tient à la lésion des fonctions des organes, d'où dépend la digestion.

Syn. Maladies ou affections gastriques, mésentériques ou intestinales.

- Bibl. J. H. CASSEBOHM, de pathematum ventriculi morbis; Halæ 1750.
- D. VAN ROYEN, de intestinis crassis, multorum malorum causá et sede; Lugd.-Batay. 1752.
- C. CH. SCHMIEDEL, de dignitate duodeni in disjudicandis et curandis morbis; Erlang. 1757.

GMELIN, de primis viis ut plurimorum morborum fonte; Tubing. 1761.

- J. M. DE MENGHIN, diagnoses morborum ventriculi et intestinorum; Viennæ 1764.
- C. S. BRANDAU, de intemperantia et morbis ex ipsa oriundis; Marburg. 1785.

WEDEKIND, de morborum primarum viarum verā notitiā et curatione, etc.; Nuremb. 1792.

GRAMBERG, de vera notione et cura morborum primarum viarum; Erlang. 1793.

Car. La bouche est mauvaise, l'haleine est désagréable, la langue est sale, les dents sont graisseuses; l'appetit est foible où nul, il y a même quelquefois du dégoût; les déjections sont mal liées ou fétides, et il y a généra-lement asthénie.

Esp. I. Gastrose pyrétique,

Syn. Fièvre gastrique; BAILLOU, epidem. et ephem., lib. 11, tom. 1, édit. de TRONCHM, pag. 87.— SELLE, pyretol., 3.º édit.; Berlin 1789, pag. 212.

Fièvre mésentérique; BAGLIVI, oper. med. lib. 1, cap. IX, tom. 1, édit. de PINEL, pag. 69; specim., etc., ibid, pag. 525, tom. 11, pag. 405.

Fièvre putride; FISES, traité des fièvres; Paris 1755, pag. 55.

Fièvre aiguë, stomachique et intestinale; Heister, compend. med. pract.; Amstelod. 1763, pag. 83, cap. v.

Fièvre stercorale; Quesnay, traité des fièvres; Paris 1767, tom. 11, pag. 367. — Fièvre cathartique; Quesnay, ib., pag. 472.

Fièvre synoque putride; VITET, cl. 1, fièvres; ord. 1, fièvres continues simples; gen. 111.

Fièvre gastrique aiguë; Burseri, institut. medic., etc., Lips. 1787.

Fièvre putride gastrique; BAUMES, année médicinale, 4.º partie, pag. 39.

Fièvre remittente des enfans; G. BUTTER, a treatise on infantile remittent fevers, etc.; Lond. 178... — Fièvre éminemment gastrique suivant BURSERI.

Bibl. Burchard, de febribus mesentericis;

RIEDEL, de febribus intestinalibus; Erfort. 1748; et coll. de BALDINGER, tom. 1, pag. 42.

- J. M. ROCCA, de febribus ab chyli cruditate productis; Feltriæ 1751.
- J. G. Schenckbecher, de febre stomachică intestinali; Argent. 1760.
- J. C. ŒTTINGER, de febribus acutis intestinalibus incolis oppidi megasæmmerdæ endemiis; Erfort 1767.

C. F. Born, de febre gastrica putrida; Gotting. 1784.

A. Th. Gemeiner, de verâ febrium putridarum notione; Erlang 1786.

S. P. AUTHENAC, essai sur l'idéologie, la technologie, la nosographie et la médicographie des fièvres gastriques simples; Paris, an x-1801.

Car. Le pouls est fréquent avec plus ou moins de mollesse, souvent avec des inégalités ou des intermittences; la chaleur est augmentée et il y a une turgescence soit stomacale, soit intestinale.

Rap. A. Gale critique; SAUV., cl. x, ord. v, gen. xxx, esp. 2.

B. Délire fébrile; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 9. Voy. Th. Leid, de delirio febrili; Edinb. 1768.

C. Diarrhée fébrile; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 3.

S-esp. I. Légère.

Syn. Fièvre continue putride; BOERHAAVE, aph. 730.

Car. Tous les accidens qui se rencontrent

dans la maladie sont peu remarquables ou diminuent bientôt d'intensité.

Rap. A. Hectique enfantile; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. V, esp. 1.

- B. Éphémère nauséative; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. 1, esp. 2.
- C. Synoque dyssentérique; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. 111, esp. 4.
 - D. Synoque anniversaire; SAUV., ib., esp. 9.

S-esp. II. Grave.

Syn. Fièvre putride des premières voies, devenue maligne; CHAMBON, traité des fièvres, etc., tom. 111, pag. 95.

Car. On trouve tous les accidens de la gastrose pyrétique, joints à des épiphénomènes qui se présentent dans un ordre plus ou moins confus.

Formes.

Sor. 1. Amphimerine péripneumonique; SAUV. cl. 11, ord. 11, gen. 1, esp. 15.

2. Pleurésie putride; SAUV., cl. III, ord. II, gen. III, esp. 9.

Synoque pleurétique; SAUV., cl. II, ord.

I, gen. III, esp. 5.

Esp. II.

Esp. II. Gastrose apyrétique.

Car. Il n'y a point de fièvre; mais l'appareil gastrique n'en est pas moins bien prononcé.

S-esp. I. Anorexie.

Eth. d'a, privatif; et orexis, appetit.

Syn. Anorexie; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. II; dysorexies; gen. XI. — LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. III, privatives; gen. CXVI. — VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLXXIX. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. II, dysorexies; sect. II, appetits manquants; gen. CVII. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. II, dysorexies; gen. XI.

Bibl. G. M'ILVANE, de anorexiá; Edinb.

Car. Diminution ou perte de l'appetit pour les alimens solides.

Var. A. Anorexie saburrale; SAUV., loci, cit., esp. 9.

B. Anorexie admirable; SAUV., loc. cit. 2

Tom. II.

C. Anorexie de Swart (par un défaut de bile); Sauv., loc. cit., esp. 13.

Rap. A. Tympanite de SWART; SAUV., cl. x, ord. 111, gen. XVII, esp. 6.

S-esp. II. Adypsie.

Eth. d'a, privatif; et dipsia, soif.

Syn. Adypsie; Sauvages, cl. vi, débilités; ord. II, anepithymies; gen. XII. — LINNÉ, cl. vi, quiétales; ord. III, privatives; gen. CXVII. — VOGEL, cl. vi, adynamies; gen. CCLXXXI. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. II, dysorexies; sect. II, appetits manquants; gen. CVIII. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. II, anepithymies; gen. XII.

Car. Défaut de soif.

Rap. A. Adypsie primitive; SAUV., loc. cit., esp. 1.

S-esp. III. Nausée.

Eth. de nausæa, mot latin qui veut dire nausée.

Syn. Nausée; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. 11, de ventre; gen. XII. — SAGAR, cl. V, flux; ord. 111, de ventre; gen. XII.

Anatrope; Vogel, cl. VI, adynamies; gen CCLXXX.

Car. Anxiété précordiale avec envie de vomir.

Rap. A. Nausée cacochylique; SAUV., loc. eit., esp. 11.

S-esp. IV. Vomissement.

Eth. de vomitus, mot latin qui veut dire vomissement.

Syn. Vomissement; SAUVAGES, cl. 1x, flux; ord. 11, de ventre; gen. XIII. — SAGAR, cl. v, flux; ord. 111, de ventre; gen. XIII.

Bibl. STOLL, de vomitu; dissert. medic., et coll. d'EYEREL, tom. III, pag. 374.

A. AINSLIE, de vomitu idiopathico; Edinb.
1753.

J. HAWRANEK, de vomitu; Viennæ 1770.

C. L. BOUVENOT, recherches sur le vomissement; Paris, an x--1802.

Car. Nausées suivies de la rejection par la bouche des matières contenues dans le foyer de la digestion.

Rap. A. Vomissement saburral; SAUV., loc. cit., esp. 2.

- B. Vomissement crapuleux; SAUV., ibid; esp. 1.
- C. Vomissement ruminant; Sauv., ib., esp. 6. (C'est une variété du vomissement crapuleux.)
- D. Vomissement laiteux; Sauv., ibid, esp. 3. (Il arrive après s'être gorgé de lait; ce vomissement est familier aux enfans en nourrice.)

S-esp. V. Flatulence.

Eth. de flatulentia, mot latin qui exprime flatulence.

Syn. Flatulence; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. IV, d'air; gen. XXXIV. — SAGAR, cl. V, flux; ord. V, d'air; gen. XXXIV.

Car. L'estomac ou les intestins sont distendus par de l'air que les malades rendent par haut ou par bas.

Var. A. Flatulence nidoreuse (amenant ou laissant des rapports d'œufs couvis); SAUV., loc. cit., esp. 2.

B. Flatulence acide (déterminant des rapports aigres ou un agacement de dents). S-esp. VI. Dyspepsie.

Eth. de dys, disficilement; et pepsis, coction.

Syn. Dyspepsie; Cullen, cl. 11, névroses; ord. 11, adynamies; gen. xlv.

- Bibl. G. FORREST, de ventriculi concoctione læså; Edinb. 1755.
- J. TEMPLE, de dyspepsiá; Edinb. 1778; et coll. de Webster, tom. 11, pag. 1.

DAUBENTON, mém. sur les indigestions; Paris 1785.

Car. La difficulté ou la dépravation de la digestion est caractérisée par des gonflemens, des rots, des rapports et des anxiétés ou des souffrances plus ou moins vives. Les nausées, le vomissement ou la diarrhée et quelquefois la constipation en sont les suites.

Var. A. Apepsie; Vogel, cl. vi, adynamies; gen. CCLXXVI. Incoction des alimens dans l'estomac.

- B. Dyspepsie; Vogel, ib., gen. CCLXXVII.

 Digestion tardive et difficile.
 - C. Diaphtore; Vogel, ib., gen. cclxxvIII. Corruption des alimens dans l'estomac.

Formes de la gastrose apyrétique.

- Sor. 1 Lumbagie saburrale; SAUV., cl. VII, ord. v, gen. xxx, esp. 8.
- 2. Syncope arthritique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 16.
- 3. Dysecœe saburrale; PAULISKY, medicinisch pratische beobachtungen, etc. Frankfurt am Mayn 1784.
 - 4. Dysphonie saburrale; PAULISKY, ib.
- 5. Tremblement saburral; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 12.
- 6. Tintouin saburral; SAUV., cl. VIII, ord.

 1, gen. IV, esp. 7.
- 7. Vertige stomacal; SAUV., cl. VIII, ord.

 1, gen. 1, esp. 2. HERZ, versuch uber den schwindel; Berlin 1791, esp. 4.
- 8. Cochemar stomacal; SAUV., cl. v, ord. 1, gen. 1, esp. 2.
- 9. Agrypnie par indigestion; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 7.
- de médec., tom. XCIII, pag. 128.
- ord. v, gen. XXXI, esp. 10.

Apoplexie præcordiale; Schroeder, de apoplexiæ ex præcordiorum vitiis origine; Gotting. 1767; et opusc. med., tom. 1, pag. 338.

- 12. Eclampsie saburrale; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 5.
- 13. Épilepsie stomacale; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 3.
- 14. Toux stomacale, var. A, humide; SAUV. cl. v, ord. r, gen. v, esp. 6.— Var. B, sèche; SAUV., ib., esp. 7.
- 15. Phthisie gastrique; EICHHORN, de morbis gastricis phthisin mentientibus; Gotting. 1788.

Phthisie fébrique; SAUV., cl. x, ord. 1, gen. 11, esp. 13.

Phthsie abdominale; A. E. Buchner, de morbis viscerum abdominalium phthisin mentientibus; Hal. ad Salam. 1769.

- 16. Boulimie addéphagique; SAUV., cl. VIII, ord. 11, gen. VIII, esp. 5.
 - A. Boulimie convulsive; SAUV., ib. esp. 6.
- 17. Odontalgie stomacale, SAUV., cl. VII, ord. 11, gen. XVI, esp. 9.
- 18. Cardialgie saburrale; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 1.

- A. Cardialgie lactique; SAUV., ib., esp. 11.
- 19. Gastrodynie saburrale; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 1.
- A. Gastrodynie par des corps étrangers imprudemment avalés; SAUV., ib., esp. 11.
- 20. Cholerée crapuleuse; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XV, esp. II.
- 21. Colique stercorale; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 3.
- A. Colique accidentelle ou d'indigestion; SAUV., ib., esp. 18.
 - B. Colique méconiale; SAUV., ib., esp. 19.
- 22. Constipation obstructive (le canal intestinal étant obstrué ou bouché par des matières épaissies ou endurcies); Cullen, cl. IV, ord. V, gen. CXXIII, esp. 3.
- 23. Diarrhée stercoreuse; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XVI, esp. 1.
 - A. Diarrhée lactique; SAUV., ib., esp. 19.
- 24. Sueur saburrale; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XX, esp. 18.
- 25. Salivation nauséeuse; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXIII, esp. I.
- 26. Tympanite ascitique; SAUV., cl. x, ord. II, gen. VI, esp. 4.

- 27. Ophtalmie gastrique; I. F. Delius, de ophtalmia à vitio ventriculi; Erlang 1786; et adversar. fascic. v, diss. XXII.
- 28. Catarrhe abdominal; WILLICH, de frequenti catarrhorum ex primis viis origine; Gotting. 1776.
- 29. Exhantémie abdominale; J. Velti, exanthematum fons adominalis; Gotting. 1784; et coll. de Franck, tom. IV, pag. 30.
- 30. Jaunisse néophytique (occasionnée par la bile retenue, par le méconium épaissi); SAUV., cl. X, ord. VI, gen. XXXII, esp. 12.

Gen. XVIII. HELMINTHÈSE.

Eth. d'helminthes ver; dénomination proproposée pour exprimer toute maladie occasionnée par des vers.

Syn. Maladies ou accidens qui proviennent des vers qui habitent ou qui peuvent se rencontrer dans l'homme.

Vers; Juncker, tab. CIX.

Vers des intestins; PINEL, classe non déterminée, gen. LXXXII.

Bibl. N. Andry, de la génération des vers dans le corps de l'homme; Paris 1700.

J. H. SCHULZE, diss. de lumbricis effractoribus; Halæ 1740.

BIANCHI, de naturali in humanum corpus vitiosă morbosăque generatione historia; Tau-rini 1741.

- J. G. FISCHER, de vermibus in corpore humano et anthelmintico priori anno invento; Stadæ 1751.
- J. Malbois, de intestinis ac vermibus in iis nidulantibus; 1751.
- G. VAN DOEVEREN, de vermibus intestinalibus hominum; Lugd-Batav. 1753; et en français, sous le titre: observ. physico-médic. sur les vers qui se forment dans les intestins, etc.; Lyon et Paris 1764.
- G. KRAMER, theoremata phys. med. de lumbricis corporis humani; Viennæ Austriæ 1753.
- C. F. KALTSCHMID, de vermibus et præcipuè de specie illa vermium intestinalium quam tæniam vocamus; Jena 1755.
- J. Th. Klein, tentamen herpetologiæ, etc. accessit J. A. Unzeri, observ. de tæniis; Leidæ et Gotting. 1755.
- J. G. BRENDEL, ascaridodea HIPPOCRA-TIS; Gotting. 1757.
- J. Juncker, de respectu ad vermes in morbis chronicis et acutis habendo; Halæ 1757.

PALLAS, de infestis viventibus intra viventia; Lugd-Batav. 1760; et coll. de SANDI-FORT, tom. I, pag. 247.

M. J. BITTERMANN, de vermibus; Vindob. 1763.

A. E. BUCHNER, de colluvie verminos à quatenus cacochymiæ caus à; Halæ 1765.

J. F. PALMER, de vermibus intestinorum; Edinb. 1766; et coll. d'Edinbourg, tom. III, pag. 34.

Muller, vermium terrestrium et fluviatilium, seu animalium infusoriorum, helminthicorum, etc.; Hauniæ et Lipsiæ 1773 et 1774.

- Zoologiæ danicæ prodomus, etc.; Hauniæ 1776.
- P. HAPP, vermium intestinorum hominis historia; Lipsiæ 1780.
- A. BROUGHTON, de vermibus intestinorum; Edinb. 1781; et coll. de Webster, tom. 11, pag. 199.
- P. Ch. F. Werner, vermium intestinalium, præsertim tæniæ humanæ brevis expositio; Lips. 1782. Continuatio prima; Lips. 1782. Secunda; Lips. 1786. Tertia; Lips. 1788.

TH. WALLIS, de vermibus intestinorum; Edinb. 1784.

J. BARBUT, the genera vermium exemplified by various specimens of animals contained in

the orders of the intestina et mollusca linnæi.....; London 1785.

RETZIA, lectiones publicæ de vermibus intestinalibus, etc.; Holmiæ 1786.

Moder, bibliotheca helminthologica; Erlang. 1786.

DE HAEN, tractatus de vermibus; in prælect. in herm. BOERHAAVE institut. patholog. edente de WASSERBERG in-4.°, 1786, tom. 1, pag. 481.

BLOCH, traité de la génération des vers; Strasbourg 1788.

Buniva, de generatione et propagatione vermium, etc., theses inaugurales; Taurini 1788.

VIREY, mém. sur la classe des vers et principalement sur ceux qu'il importe le plus de connoître en médecine; journ. de physiq., etc. tom. IV, pag. 409.

Car. Diagnostic incertain qu'expriment cependant, au milieu d'un assemblage de symptômes souvent bizarres, quelquefois extaordinaires:

L'haleine forte, sur-tout le matin; les gencives en mauvais état; un prurit au nez et à l'anus; un appetit irrégulier, toujours d'un ex;

,

trême à l'autre; un gros ventre; des maux d'estomac; quelquefois des vomissemens; mais plus souvent une constipation ou une diarrhée visqueuse; des coliques irrégulières; de la soif; de la stupeur; une physionomie particulière, mal-saine et bouffie, avec un cercle sombre et creux autour des yeux; des soubresauts pendant le sommeil; et des grincemens de dents.

Esp. I. Helminthèse par l'ascaride (a) lombrical.

Syn. Maladies occasionnées par l'ascaride

⁽a) L'ascaride, genre de vers de la famille des cylyndracés, a la tête en trèsse avec trois petits tubercules, le corps cylindrique et devenant plus mince aux deux extrémités qui sont obtuses. Ce ver est glabre, serme, même élastique.

Il réunit deux espèces.

I. L'ascaride lombrical, ascaris lombricoides, long de deux décimètres, et se distinguant du ver de terre par le défaut de soies et l'absence du renslement annulaire; peu de rides transversales; sa queue obtuse et son anus en forme de fente transverse. Ce ver, ordinairement ovipare, vit en troupes dans les intestins grêles de l'homme.

II. L'ascaride vermiculaire, long d'environ deux à trois centimètres, ayant aussi trois renssement à sa tête, côtés légèrement crênelés et queue très pointue. Ce

lombrical, connu plus particulièrement sous le nom de strongles, de vers lombrics ou lombricaux, de vers des enfans.

Bibl. La plupart des ouvrages inscrits dans la bibliographie du genre.

Consulus, degli ascaridi; Roma 1701.

VAN PHELSUM, historia physiologica ascaridum; Leovardiæ 1762.

J. A. Murray, de ascaride lumbricoide linn.

Gotting. 1779; et opusc., tom. 11, pag. 1.

— De lumbricorum setis; opusc., tom. 11,
pag. 401.

C. Perebom; descriptio et iconica delineatio novi generis vermium stomachidæ dicti in corpore humano hospitantium; Amstelod. 1780.

ABRAHAM, cautelæ anthelminthicorum in paroxismis verminosis, etc.; Gotting. 1783.

Car. Les symptômes du genre, parmi lesquels on distingue la dilatation de la pupile, les démangeaisons du nez, l'odeur aigre-douce de l'haleine, et autres phénomènes dyspeptiques.

ver vivipare, se reproduisant souvent, habite en trèsgrand nombre dans l'intestin rectum, dans le vagin et quelquesois dans la vessie urinaire.

S-esp. I. Pyrétique.

Syn. Fièvre vermineuse.

Bibl. A. STRASZGULT, dissert. sistens historiam vermium et febris verminosæ; Viennæ 1774; et coll. de Wasserberg, t. IV, p. 303.

DE HAEN, de febre verminosa; rat. medend. édit. de Paris, 1774, tom. VIII, pag. 105.

Junge, historia febris verminosæ; societ. medic. Hauniensis collectanea, tom. 11, pag. 322, art. 35.

VAN DEN BOSCH, historia constitutionis epidemicæ yerminosæ, etc.; Norimb. 1779.

Dufour, observations diverses sur la fièvre putride vermineuse, etc.; journ. de médec., tom. LXVI, pag. 404.

Car. Le pouls est fréquent; il y a des anxiétés précordiales, avec le sentiment d'une compression expansive, une disposition aux affections soporeuses; et les déjections, assez faciles, sont plus ou moins chargées d'ascarides lombricoïdes.

Var. A. Légère.

Car. Les accidens qui la caractérisent n'ont pas une très-grande intensité.

B. Grave.

Bibl. Moreali, systema theoretico-practicum febrium malignarum et contagiosarum; 1739.

BIANCHINI, lettere medico-practiche intorno all'indole delle febri maligne e de loro principali remedi colla storia de vermi del corpo humano e dell'uso de mercurio; Venezia 1750.

CHASSANIS, dissert. sur la maladie épidémique de Lodève, en 1751; Avignon 1753.

J. В. Вонарсн, de synocho putridā epidem.... vermibus stipatā; Pragæ 1758.

LEPECQ DE LA CLOTURE, épidémie du gros theil, fièvre putride vermineuse et maligne de 1770; collect. d'observ. sur les maladies et constitut. épidém., tom. 1, pag. 91.

Car. Les symptômes qui l'accompagnent ont une marche confuse et une grande intensité.

Formes.

Sor. 1. Hectique vermineuse; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. v, esp. 9.

v, gen. xxx, esp. 7.

A. Typhomanie vermineuse; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXVII, esp. 4.

3. Variole

- 3. Variole vermineuse; Beireis, de febribus et variolis verminosis; Helmstadt 1780.
- 4. Amphimérine tussiculeuse; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. VI, esp. 11.
- 5. Pleurésie vermineuse; SAUV., cl. 111, ord. 11, gen. XIII, esp. 8.
- A. Pleurésie stomacale; BIANCHI, histor. hepat., tom. I, pag. 234, §. VI. VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 258.
- 6. Tierce vermineuse; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. x, esp. 18. Colombier, méd. milit., tom. 1, pag. 454; idem tom. 11, pag. 31--132.

S-esp. II. Apyrétique.

Car. Le pouls est à peu près naturel; mais le corps paroît s'émacier quoique souvent l'appétit se soutienne et même soit plus fort; il y a un certain degré de météorisme, borné quelquefois à l'épigastre, et il s'y joint le plus ordinairement des urines laiteuses, des déjections de matières qui paroissent argentées; quelques douleurs poignantes ou lacérantes vers le nombril, et par fois un sautillement dans le ventre.

Tom. II.

Formes.

§. I. Les vers étant contenus dans les intestins.

- Sor. 1. Hémorragies vermineuses; VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 168, 170, 172.
- 2. Bouffissure vermineuse; BERTRAND, journ. de médec., tom. LIV, pag. 373.
- 3. Hydropisie vermineuse; Ludolf, dissert. de hydrope à vermibus causato.
- 4. Chlorose vermineuse; SAUV. cl. x, ord. VI, gen. XXXV, esp. 6.
- ord. 11, gen. XIII, esp. 5.
- 6. Dyspepsie vermineuse; VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 328.
- 7. Chorée vermineuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XXI, esp. 5.
- 8. Démonomanie vermineuse; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XIX, esp. 4.
- 9. Vertige vermineux; Roziere de la Chase sagne, journ. de médec., tom. XXVI, pag. 430. Herz, esp. 5.
- ord. 1, gen. 1, esp. 4.
- 11. Étranglement vermineux; VAN DEN BOSCH loc. cit., pag. 110.

- 12. Histérie vermineuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XX, esp. 1. DUFAU, journ. de médec., tom. XXIX, pag. 120.
- 13. Tetanos vermineux; SAUV., cl. IV, ord. 11, gen. VII, esp. 8.
- A. Emprostothone vermineux, Rosen, malad. des enf., pag. 398.
- B. Epistothone vermineux; Whalbom, act. de l'académie de Suède, (en suédois), vol. XXVI, pag. 203.
- 14. Trisme vermineux; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. 11, esp. 5.
- 15. Catalepsie vermineuse; VAN DEN BOSCH, loc. cit., esp. 151.
- ord. v, gen. XXXI, esp. 15. VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 39.
- 17. Eclampsie vermineuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 2.
- 18. Epilepsie vermineuse; Dupau, journ. de médec., tom. LXXX, pag. 343.
- 19. Convulsion vermineuse; Rosen, malad. des enf., pag. 394.
- 20. Toux vermineuse; SAUV., cl. v, ord.

 1, gen. v, esp. 21, var.
- 21. Asthme ascaridique; acta med. soc. reg. hauniens., tom. 1, pag. 290.

- 22. Phthisie vermineuse; VAN DEN BOCH; loc. cit., pag. 248.
- 23. Boulimie vermineuse; SAUV., cl. VIII, ord. 11, gen. VIII, esp. 3.
- 24. Céphalalgie vermineuse; VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 322.
- 25. Pleurodyne vermineuse; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. XI, esp. 2.
- 26. Cardialgie vermineuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 10, var.
- 27. Cholerée vermineuse; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XV, esp. 9.
- 28. Iléose vermineux; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIV, esp. 12. VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 110, 138, 159.
- 29. Colique vermineuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 4.— Ludwig, de lumbricis intestină perforantibus; Lips. 1762.
- 30. Paralysie vermineuse; VAN DEN BOSCH; loc. cit., pag. 163, 166. Dupau, journ. de médec., tom. LXXX, pag. 344.
- A. Paralysie vermineuse des muscles du côté gauche de la face; Consbruch, nova acta nat. curios., tom. v, art. XXIX, pag. 89.
- 31. Surdité ascaridique; Tissot, traité des nerfs, etc., tom. 11, part. 11, pag. 81, 85.
 - 32. Aphonie vermineuse; HANNES, nova

- act. nat. cur., tom. VI, art. LV, pag. 261.

 ZIEGLER, dissert. de aphonia à vermibus.
- 33. Aménorrhée vermineuse; MILLIN, journ. de médec., tom. LVI, pag. 458. Rosen, malad. des enf., pag. 394.
- 34. Diarrhée vermineuse; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 14. VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 338.
- 35. Lientérie vermineuse; VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 96.
- 36. Tympanite vermineuse; Sauv., cl. x, ord. III, gen. XVII, esp. 7. VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 148.
- 37. Erysipèle vermineux; VAN DEN BOSCH, loc. cit., pag. 199.
- 38. Rhumatisme vermineux; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. III, esp. 8.
- 39. Exhanthémie vermineuse; VAN DEN Bosch, loc. cit., pag. 96, 132, 189.
- 40. Ictère vermineux; Van den Bosch, loc. cit., pag. 121.
- 41. Claudication vermineuse; Rosen, malad. des enf., pag. 398.
 - §. 2. Les vers se trouvant hors des intestins.
- 42. Cystalgie vermineuse; PANZANI, malattia verminosa della vesica; Venise 1787. GERON,

journ. de médec., tom. LXXX, pag. 210.

43. Phlegmon vermineux.

A. Tumeur lombricale du coude; Berdot, acta helvetica, vol. VII, pag. 177, art. 17.

44. Étranglement vermineux dans les hernies; FAGES, réc. périod. de la soc. roy. de méd. de Paris, tom. v, pag. 222.

Esp. II. Helminthèse par l'ascaride vermiculaire.

Syn. Affections causées par l'ascaride vermiculaire (voy. pag. 93, note (a)), vulgairement connu sous le nom d'ascaride.

Car. Inquiétude plus ou moins grande avec une sensation de fourmillement très-incommode, qui a lieu principalement aux approches de la nuit, dans les parties qui sont le siége de ces petits vers, qu'on trouve communément sur les déjections, ou répandus à l'extérieur.

S-esp. I. Intestinale.

Le siège des ascarides étant dans le cœcum ou dans les environs du rectum.

Formes.

Sort. 1. Tenesme ascaridique; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XIX, esp. 4.

S-esp. II. Cystique.

Les ascarides se trouvant dans la vessie urinaire.

Rap. A. Pissement vermineux; HANNES, nova acta natur. curios., tom. v, pag. 107, obs. XXXIII.

Formes.

Sor. 1. Catalepsie ascaridique; Kuhn, diss. de ascaridibus per urinam emissis, adjunctă commentatione de vermium intestinalium generatione; Jena 1798.

Esp. III. Helminthèse par le dragoneau (a).

Car. Maladie occasionnée par la présence

La filaria medinensis habite les climats ardens des deux Indes; sa grandeur ordinaire est moins d'un mètre et il se loge dans le tissu cellulaire.

⁽a) Le dragoneau, gordius, filaria, comprenant la filaria intestinalis et la filaria medinensis ou veine de médine, genre de vers appartenant aux cylindracés, ressemble beaucoup à une corde à violon, pointu par les deux bouts, d'un blanc pâle, et montrant, à la partie antérieure, une bouche arrondie, ouverte en forme de concavité. Son corps est très-lisse et égal.

du dragoneau, plus connu sous le nom de veine de médine et de gordius.

S-esp. I. Intestinale.

Car. Le prurit du nez, le vomissement et la déjection d'une matière muqueuse, sur-tout au reveil; un aflux soudain de salive dans la bouche; des douleurs aux environs du foie et de la rate sont les signes qui passent pour annoncer le plus surement le gordius ou dragoneau intestinal.

Formes.

Sor. 1. Convulsions par le gordius; Rosen; malad. des enfans, pag. 389. — ROLANDSON MARTIN, kongl vetenshaps academiens hand-lingar for aar 1771, vol. XXXII, trim. 3, art. 10.

2. Colique laponique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 9.

S-esp. II. Cellulaire.

Bibl. G. F. C. Fuchs, comment. histor.

Le dragoneau intestinal, filaria intestinalis, ver court et très-grêle, vit dans le intestins; on le rencontre dans les climats froids et septentrionaux.

inedic. de dracunculo persarum sive vena mes dinensi arabum, etc.; Jena 1785.

Peré, mémoire sur le dragoneau; journs de medec., tom. XLII, pag; 121.

Car. Après des douleurs obtuses dans les chairs, il s'élève une tumeur phlegmoneuse de laquelle sort la pointe de la veine de médine dont on se saisit, roulant ensuite le ver sur un baton jusqu'à ce que son extraction soit parfaite.

Esp. IV. Helminthèse par le trichure (a).

Bibl. ROEDERER et WAGLER, de morbo

Le trichure ne se trouve guère que chez les personnes d'une constitution molle, et sur-tout chez les diarrhoïques.

⁽a) Le trichure, trisocephalus hominis, genre de vers de la famille des cylindracés, long de six à sept centimètres, a le corps sur-tout chez les mâles, souvent contourné en spirale. Son extrémité postérieure est grossie en forme de massue; mais l'antérieure, où est sa tête, est filiforme avec un petit nœud à la fin. Ce ver est très-finement strié dans sa partie antérieure, crênelé sur la longueur de son dos, et lisse en dessous. Il se tient ordinairement dans l'intestin cœcum, vit en troupes, et sa femelle, qui est plus mince et qui n'a pas cette trompe capillaire comme le mâle, est ovipare.

mucoso, cum præfatione de trichuridibus, novo vermium genere, édit. de WRISBERG; Gotting. 1783.

PALLAS, novi comment. acad. scient. imper. petropolit., tom. XIX, pro anno 1774, art. 18, pag. 449.

Car. Indéterminé.

Esp. V. Helminthèse par la douve (a).
Car. Indéterminé.

Esp. VI. Helminthèse par le tænia (b).

Bibl. GANDOLPHE, description du ver tænia,

⁽a) La douve humaine, fasciola humana, de la famille des vers plats, constitue un genre de ver applati, ordinairement ovale et muni presque toujours de deux ouvertures. Assez rare dans l'homme, il habite les intestins et même les conduits biliaires.

⁽b) Les tænias, autre genre de vers nombreux, de la famille des vers plats, ont des articulations dans toute leur longueur, le corps alongé, ordinairement déprimé, une tête à l'extrémité la plus étroite, armée de quatre suçoirs et quelquefois de crochets qui sont rétractiles.

A. Tænias à crochets.

^{1.}º Cucurbitain, tænia solium-

Ce ver a des anneaux plus longs que l'espèce sui-

etc.; acad. des sciences, ann. 1709, pag. 29 de l'hist.

vante n.º 2. Au milieu de chacun d'eux se trouvent des ovaires disposés en rosette, et sur leurs bords une ouverture solitaire. Les articulations se séparent facilement, et chaque anneau paroît articulé par une sorte d'arthrodie.

2.º Tænia court, tænia vulgaris.

Ce ver a des anneaux qui souvent ont autant de largeur que de longueur, et sont ridés transversalement; sur le milieu de chacun d'eux il y a un ovaire floriforme plus apparent que chez le précédent n.º r et plus bas un mamelon percé à son extrémité.

Les tænias à crochets vivent dans les intestins des hommes souvent en très-grand nombre, et sont dissiciles à expulser.

- B. Tænias nuds ou sans crochets.
- 3.º Tania large, tania lata.

Ce ver a des anneaux épais, extrêmement courts et larges, finement ridés transversalement et à une seule ouverture sur le milieu où sont leurs ovaires en forme de rosette.

4.9 Tænia dentelé, tænia dentata.

Ce ver, dont la partie antérieure est la plus large, dont la tête est pointue et ressemble en dessous à un cœur dont on auroit tronqué la base, a une ouverture marginale prééminente au milieu de chaque bord de ses anneaux, dont les plus grands ont des canelures transversales et moins de largeur que la précédente, et des evaires si petits qu'on ne peut les apercevoir à l'œil nu.

S. Ernst, de tæniå secundå Plateri; Basileæ 1743; et coll. de Haller, tom. III, pag. 439.

LINNÉ, tænia; Upsaliæ 1748; et amænit. acad., tom. 11, pag. 59.

BONNET, diss. sur le tænia ou ver solitaire; savans étrangers, tom. 1, 1750, pag. 478; et coll. compl. des œuvres, tom. 111, pag. 96, tom. x, pag. 282.

A. Cocchi, dei vermi cucurbitini dell uomo; in Pisa 1753.

J. G. ROEDERER, de tæniå, Gotting. 1760. ROSEN, des vers et sur-tout du tænia; coll. académ., tom. XI, pag. 304.

C. F. KALTSCHMID, de tæniå; Jenæ 1766.

S. S. BEDDEY, de verme tænia dicto; Vienn. 1767.

Andrée, de tæniā; Gotting. 1769.

Cusson, remarques pratiques sur le tænia; assembl. publ. de la soc. roy. des scienc. de Montp. pour l'ann. 1781; Montpell. 1782, pag. 97; et séparément, Montpellier 1783.

BUTINI, mém. sur le tænia à anneaux courts; hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Par., ann. 1782--83, pag. 285 de l'hist.

A. GLEICHEN, obs. anatomiques et microscopiques sur le tænia large et les vers cucura bitains, etc.; act.s des amis de la société de Berlin, etc. (en allem.), vol. IV, art. X, pag. 203.

Car. On se sent gonflé; on est mal le matin à jeun; assez souvent on distingue soit une espèce de succion dans le bas-ventre, soit une sorte d'agitation onduleuse qui finit par la sensation d'une boule qui se fixe. Les déjections sont quelquefois chargées de quelques portions annulaires ou de quelques fragmens du tænia.

Formes.

Sor. 1. Nausée tæniaire; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XII, esp. 1.

- 2. Epilepsie tæniaire; LECOMTE, journ. de médec., tom. LXXXIV, pag. 40.
- 3. Boulimie vermineuse; SAUV., cl. VIII, ord. 11, gen. VIII, esp. 3.
- 4. Cardialgie vermineuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 10, var.

Esp. VII. Helminthèse par l'hydatide (a).

Bibl. J. GRASHUIS, de colicá pictonum ten-

⁽a) Il y a deux espèces d'hydatide.

A. L'hydatide viscérale, hydatis visceralis-

Ce ver a la forme d'un sphéroïde alongé, obtus

tamen; accedit de natură, sede et origine hydatidum disquisitio; Amstelod. 1752.

Pallas, miscellanea zoologica, etc.; Hag. Comit., 1766, pag. 157.

DE HAEN, de hydatidibus; rat. medend.; Paris, tom. 111, pag. 308.

CAMPER, hydatides, hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris, ann. 1784--85, pag. 92 des mém.

Leske, von den drehen der schafe und blasenband wurme in gehirne derselben, etc. 1780.

antérieurement et pointu à sa partie postérieure; sa tête paroît renfermée dans sa vessie, ou du moins elle n'en est pas distinctement séparée.

Ces vers, rarement solitaires, souvent très-nombreux, se rencontrent communément dans les sinus de la masse cérébrale, dans certaines tumeurs, dans les duplicatures du péritoine, dans le foie, les moles, le placenta, le tissu cellulaire des hydropiques, etc.

B. L'hydatide celluleuse, hydatis cellulosa.

Ce ver, long d'environ trois centimètres, de forme ovale, avec une vessie à des parois très-dures, se prolonge postérieurement en deux espèces de queue. Sa tête se voit aussi difficilement que dans la précédente, et paroît renfermée aussi; les crochets dont elle est armée sont de même moins pointus.

Ce ver, assez rare, habite le tissu cellulaire qui se trouve entre les muscles de l'homme. Fischer, teniæ hydatigenæ in plexu choroidæo, etc.; Leips. 1789.

Car. Indéterminé.

Formes.

Sor. 1. Pneumorragie hydatidique. Obs. Une femme d'Uzés vint me consulter pour une maladie de poitrine de laquelle on la traitoit; il y avoit une crachement de sang qui duroit depuis plus de vingt jours, avec dyspnée et picotement dans l'intérieur du thorax. Mais un phénomène particulier, c'est que le sang, rendu par les crachats, étoit souvent très-délayé, et que la malade expectoroit de temps en temps ce qu'elle appeloit des lambeaux de peaux blanches appartenant à ses poumons. Ces lambeaux n'étoient que des hydatides ouvertes ou des fragmens d'hydatides. Un usage un peu soutenu de muriate de mercure, procura une expulsion abondante d'hydatides, arrêta la pneumorragie et guérit radicalement la malade.

2. Hydrothorax (a) hydatidique; SAUV., cl. V, ord. 11, gen. XIII, esp. 5.

⁽a) Dans le journal de médecine, publié sous le nom

- 3. Hydromètre hydatidique; SAUV., cl. x, ord. 111, gen. xv, esp. 4.
- 4. Métrorrhée hydatidique; Zeller, neves magazin, fur aerzte; Zelmter Band, pag. 345.
 - 5. Proctorrhée hydatidique; Zeller, ibid:
- 6. Démence hydatidique; Sauv., cl. VIII, ord. III, gen. XVIII, esp. 5.
- 7. Goître hydatidique; DE HAEN, loc. cit., pag. 322, §. IV.
- 8. Epilepsie hydatidique; Lysons, practical essays upon intermitting, dropsies, diseases of the liver the epilepsy, etc.; Lond. 1772.
- 9. Toux hydatidique; Collet, medical transactions, etc., vol. 11, pag. 486, art. 22.
- 10. Dyspnée hydatidique; SAUV., cl. v, ord.
 11, gen. VII, esp. 4.
- 11. Cholerée hydatidique; BALME, journ. de médec., tom. LXXXIV, pag. 334.
 - 12. Ischurie hydatidique ou hydatides ren-

de MM. Corvisard, Boyer et Leroux, tom. II, pag. 195, on trouve l'histoire d'une maladie singulière de la poitrine, assez bien constatée pour qu'on eût pu lui assigner le caractère qu'elle offre véritablement. On ne peut la lire avec un peu d'attention, sans voir qu'elle n'est autre chose qu'une vomique-lymphatique occasionnée par un amas d'hydatides.

dues avec les urines; LETTSOM, memoirs of the medical society of london, vol. 11; Lond. 1789, art. 111. — RUSSEL, medical observations and inquiries, etc., vol. 111, art. 16, pag. 146.

Obs. Un citoyen, confié à mes soins, souffroit beaucoup de la vessie, et tout portoit à croire qu'il avoit un calcul dans l'intérieur de cet organe. On se décidoit à l'opération, lorsqu'un soupçon de maladie syphillitique et un engorgement reconnu de la prostate firent administrer, à titre de médicament préparatoire, le muriate de mercure. Au bout de quelques jours, il parut dans les urines, qui déposèrent de plus en plus, une matière muqueuse, puriforme; des lambeaux d'hydatides : cette évacuation fut très-prolongée, et la guérison solide.

13. Diarrhée hydatidique; BERTHELOT, obs., sur des tænias hydatigènes; journ. de médec., tom. LXXXIV, pag. 48.

14. Physconie hydatidique.

A. Mésentérique; Sauv., cl. x, ord. 11, gen. IX, esp. 5. — Cullen, cl. 111, ord. 11, sect. IV, gen. LXXXII, esp. 6, var. A.

B. Hépatique; Cullen, loc. cit., esp. 1, var. c. — DE HAEN, de hydatidibus; loc. cit. pag. 318, §. 11.

Tom. II.

- C. Polysplachnique; Cullen, loc. cit., esp. 9, var. D.
 - D. Externe; Cullen, loc. cit., esp. 13.
- E. Fausse grossesse; WILMER, obs. sur une masse considérable d'hydatides rendues par l'utérus; journ. de médec., tom. LXXVI, pag. 456.
- 15. Oschéocèle hydatidique; SAUV., cl. 1, ord. v, gen. XLI, esp. 13.
- 16. Hernie hydatidique; (les hydatides en imposant pour une hernie); DE HAEN, loc. cit., pag. 328, §. VI.
- 17. Tumeur testiculiforme (hydatide prise pour un troisième testicule); Screiber, nove comment. acad. scient. imper petropol., tom. 111, pag. 403.
- 18. Cancer mammo-hydatidique (tumeur du sein, occasionnée par des hydatides et simulant le cancer); DE HAEN, loc. cit., pag. 321, §. 111.

Esp. VIII. Helminthèse par le bicorne rude (a).

Bibl. CH. SULTZER, dissert. sur un ver du

⁽a) Corps de couleur brune, ovale, transversalement applati, renfermé dans une membrané transparente, d'un

canal intestinal, nouvellement découvert et décrit sous le nom de bicorne rude; Strash. 1801.

Car. Indéterminé.

Esp. IX. Helminthèse par la furie infernale (a).

Car. Porté dans l'air, il entre dans le corps humain avec une vive douleur, et des symptômes analogues à ceux d'une maladie pestilentielle; causant la mort en vingt-quatre heures. On voit ce ver sur-tout depuis le solstice d'été jusqu'à celui d'hiver.

blanc sale, lâche et légèrement plissée, surmonté de deux cornes cylindriques, rudes, nées d'une racine commune, qui s'élève en grossissant dans la partie supérieure du corps, dans la direction duquel elles sont placées, droites, ondulées ou courbées en différens sens; de l'épaisseur d'un crin à leur origine, plus mince de moitié à l'extrémité opposée qui est droite et quelquefois courbée en manière de crochet, d'une longueur égale à celle du corps qui n'excède pas avec elles six millimètres.

⁽a) Ver linéaire, filiforme, long de deux centimètres environ, cilié de chaque côté d'une rangée de soies pointues et recourbées. Sa couleur est jaunâtre ou rougeâtre, souvent noire à son extrémité antérieure.

Causeroit-il des charbons, des anthrax chez les gens de la campagne, dans les pays bas et humides?

Esp. X. Helminthèse par la mite psorique (a).

Syn. Psore, psora; Linné, cl. XI, vices; ord. IV, gales; gen. CCLXVI. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. VIII, dyalises; gen. CXLIX.

Gale, scabies; SAUVAGES, cl. x, cachexies; ord. v, impetiginés ou maladies cutanées; gen. XXX. — VOGEL, cl. x, vices; ord. IV, pustules; gen. CCCCXLIV. — SAGAR, cl. III, cachexies; ord. v, impetiginés; gen. XXXI.

Gale vermineuse; LINCK, nova acta nature curios., etc., vol. iv.

Bibl. M. E. ETMULLER, de scabie; Lips. 1731; et coll. de HALLER, tom. VI, pag. 56.

LINNÉ, exanthemata viva; Upsal. 1757; et amænit acad., tom. v, pag. 95. (Voy. par opposition E. G. BALDINGER; exanthemata non a vermibus oriri; coll. de Gruner, tom. 11, pag. 89.)

⁽a) Elle est plus petite que le siron, est blanche et à pieds rousseâtres et velus.

- G. A. LANGGUTH, de scabie vivâ; Witeb. 1767.
- C. C. KRAUSE, de scabie corporis humani; Lips. 1779.

Remède du sieur Quiret pour guérir la maladie de la gale, et rapport de la société roy. de médec.; Paris 1787.

Wichmann, aitiologie der krætze, etc.; Hannover 1791.

Von Lobes, bertrachtungen uber die krætze, etc.; Prague 1791.

LARIBEAU, mém. sur une nouvelle théorie de la gale, etc. in-8.°

- J. J. Poux, sur la gale, sur les dangers qui suivent son long séjour à la peau, et sa repercussion; Montpellier, an IX.
- Car. Éruption prurigineuse qui se fait dans l'interstice des doigts, vers le pli du poignet, vers celui du coude et de l'aisselle, sur le dos, la poitrine, le bas ventre, vers l'aîne, à l'intérieur des cuisses; au pli du jarret et autour du talon.

Les pustules qui la caractérisent ont une base ferme au tact, point douloureuse lorsqu'elle n'est pas irritée, et la pointe se termine par une vésicule crystalline et très-petite. La démangeaison dont cette maladie est accompagnée, augmente par la chaleur du lit. La gale est contagieuse.

Var. A. Gale épidémique; LINCK, gazet. salut., ann. 1773, n.º LI.

S-esp. I. Gale miliaire.

La vésicule, en se crevant, soit d'elle-même, soit quand on l'a grattée, reste seule et noircit; les boutons, assez petits, se grouppent souvent, mais se confondent rarement; ils causent une démangeaison plus vive et plus insupportable.

Rap. A. Gale canine (gale sèche, gratelle, petite gale); SAUV., loc. cit., esp. 3.

- B. Gale indienne; SAUV., loc. cit., esp. 6.
- C. Gale dartreuse; SAUV., loc. cit., esp. 4.

S-esp. II. Gale boutonnée.

Le bout de la vésicule, en se crevant, reste vif et fournit un suintement assez considérable qui quelquefois forme une croûte large sous laquelle s'accumule de nouvelle eau, et enfin assez souvent de la suppuration. Les boutons sont larges, souvent rouges, fort animés et quelquefois confluens, c'est-à-dire, que plusieurs se confondent en une seule tumeur,

dont les sommets réunis font des exulcérations plus larges et des croûtes étendues.

Rap. A. Gale humide (gale commune ou boutonnée); SAUV., loc. cit., esp. 1. — VON LOBES, loc. cit., esp. 1.

Gale benigne d'HOFFMAN.

Formes.

- Sor. 1. Hématemèse vénénique (suite d'une application de feuilles de tabac sur des pustules de gale); SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. IV, esp. 14.
- 2. Anasarque exanthématique; SAUV., cl. x, ord. II, gen. VII, esp. 3.
- 3. Hydrothorax psorique; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. XIII, esp. 9.
- 4. Ascite exanthématique; SAUV., cl. x, ord. III, gen. XIV, esp. 8.
- 5. Syncope exanthématique (par une gale repercutée); SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 19.
- 6. Tierce psorique; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. x, esp. 11.
- 7. Démence psorique; LANDAIS, journ. de médec., tom. XLI, pag. 21.
- 8. Vertige psorique; HERZ, loco citato; esp. 6.

- 9. Manie métastatique; SAUV., cl. VIII, ord. 111, gen. XX, esp. 4.
- ord. v, gen. xxx, esp. 18.
- 11. Épilepsie psorique; Wanters, journ. de méd., tom. LVI, pag. 126.
- ord. 1, gen. v, esp. 20.
- 13. Asthme exanthématique; SAUV., cl. V, ord. 11, gen. VIII, esp. 11.
- 14. Phthisie psorique; QUARIN, tentam. de cicuta, cas. XI, pag. 15.
- 15. Gastrodynie métastatique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 19.
- 16. Hémiplégie exanthématique; SAUV., cl. VI, ord. 111, gen. XIX, esp. 6.
- 17. Amaurose exanthématique; SAUV., cl. VI, ord. 1, gen. IV, esp. 11.
- A. Amaurose et paralysie psoriques; BAL-DINGER, gazet. salut., ann. 1790, n.º XLVII.
- 18. Tumeur au cou psorique; BARATE, journ. de médec., tom. XVIII, pag. 169.
- 19. Fungus psorique; BRAMBILLA, actes de l'acad. médico-chirurg. de Vienne, tom. 1, pag. 44.
- 20. Ophtalmie métastatique; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. 24.

- I, gen. 111, esp. 15.
- 22. Ulcères psoriques; BŒCKING, disserts sur l'opiniâtreté de certains ulcères vénériens compliqués de levain psorique; actes de l'acad. méd.-chir. de Vienne, tom. 1; Montpellier 1792, pag. 313.

Esp. XI. Helminthèse par le pou (a).

Syn. Phthiriase; Sauvages; cl. x, cachexies; ord. vII, anomales; gen. XXXVI. — SAGAR, cl. III, cachexies; ord. VII; anomales; gen. XXXVII.

Car. Il se forme, en différentes parties du corps, des ulcérations d'où sortent des poux, avec des démangeaisons cuisantes suivies de maigreur.

Var. A. Phthiriase interne; SAUV., loc. cit., esp. 2.

B. Phthiriase de la vessie; TRILLER, de phthiriasi vesicæ; Vitteb. 1750; et oper. med., tom. 1, p. 413.

⁽a) Insecte parasite à six pieds égaux; ayant l'abdomen ovale et crênelé sur les côtés; ses antennes filiformes et courtes.

C. Phthiriase pédiculaire; SAUV., loc. cit., esp. 1.

D. Phthiriase inguinal; Sauv., loc. cit., esp. 3. — J. H. Kniphof, de pediculis inguinalibus, insectis et vermibus homini molestis; Erfurt 1759.

Esp. XII. Helminthèse par le crinon (a).

Bibl. PATUNA, comment. de crinonibus; Goriz 1785; et giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo; tom. III, pag. 190.

Wolf, diss. med. de comedonibus; Lips. 1789.

Car. Démangeaisons et cuisons plus ou moins marquées, suivies d'un dépérissement progressif.

Rap. A. Hecticie crinonique; Wolf, loc. cit.

Esp. XIII. Helminthèse par le pou du bois (b).

⁽a) Ce ver a la plus grande analogie avec le dragonneau, s'il n'est une espèce du même genre.

⁽b) Tique brune, couleur brune, dos lisse et luisant à antennes alongées, un peu en masses.

Car. Ampoules très-grosses, douloureuses et prurientes qui laissent après elles des ulcères rebelles. N. VALLOT, observ. sur les effets de la piqure d'un insecte, connu vulgairement dans le département de la Côte-d'Or sous le nom de pou du bois; rec. périod. de la soc. de médec. de Paris, tom. XI, pag. 264.

Esp. XIV. Helminthèse par la sangsue (a).

Car. La sangsue se bornant à faire une plaie pour se gorger de sang, il résulte une hémorragie qui pour lors est toujours passive.

Rap. A. Hémorragie hirudineuse; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. I, esp. 7.

B. Hémoptysie vermineuse (occasionnée par des sangsues avalées et fixées dans le gosier); Sauv., cl. IX, ord. I, gen. II, esp. 13.

⁽a) Ver au corps alongé, plus ou moins applati horizontalement, divisé par beaucoup de rides annulaires, sans soies ni tentacules, mais pourvu, à chaque extrémité, d'un disque charnu qui exerce une force de succion considérable, et ayant à son extrémité antérieure une bouche à trois petites dents; à son extrémité opposée, un anus. La sangsue médicinale est étroite, noirâtre, a six raies jaunes variées de noir en dessus, et est tachetée de jaunâtre en dessous.

B. Hématemèse vermineux (causé par une sangsue arrêtée et fixée dans l'œsophage ou dans l'estomac); SAUV., cl. IX, ord. I, gen. IV, esp. 4.

Esp. XV. Helminthèse par des larves ou par des vers indéterminés.

S-esp. I. Vers dans le cerveau.

A. Tremblement vertigineux ou céphalalgie causée par un ver dans le cerveau; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 7.

S-esp. II. Vers dans les sinus frontaux.

Bibl. J. A. Wohlfart, obs. de vermibus per nares excretis; Halæ-Magdeb. 1768; et nova acta phys. med. acad. cæsar. leop. carol. natur. curios., tom. IV, pag. 277, art. 57.

A. Manie hémicranique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 3.

B. Nystagme (resserrement spasmodique de la paupière) vermineux; Tissot, traité des nerfs, etc., tom. 11, part. 11, pag. 46.

C. Migraine insectique; SAUV., cl. VII, ord. 11, gen. v, esp. 5.

D. Anosmie vermineuse; SAUV., cl. VI, ord.

1, gen. XIII, esp. 8.

E. Synoque céphalalgique; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. 11, esp. 8.

S-esp. III. Vers dans les oreilles.

A. Otalgie vermineuse; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XV, esp. 2 et esp. 4. — FILLEAU, journ. de médec., tom. LXXVI, pag. 439.

S-esp. IV. Vers dans les dents.

Bibl. C. CH. SCHAEFFER, die eingebildeten wurmer in zahnen, etc.; Regensburg. 1757. M. SCHAEFFER ne croit point à l'existence de ces vers dentaires.

S-esp. V. Vers dans les poumons.

A. Toux vermineuse; SAUV., cl. v; ord. I, gen. v, esp. 21, var.

S-esp. VI. Vers dans l'estomac ou dans. les intestins.

A. Maladie nerveuse ou violemment spasmodique dans une jeune femme de Saint-Geniez-de-Malgloire, terminée au bout de trois mois de souffrances les plus variées par un ver, dont l'apparence extérieure est quasi celle du bombix dominula du dictionnaire encyclop.; planches d'hist natur., XII.º part., insectes, planche 83, fig. 4, n.º 2. Obs. communiquée à l'institut de santé et de salubrité du Gard, par le citoyen Fontaines, médecin, membre de l'institut de santé, en lui envoyant l'insecte dans l'alcohol.

B. Cardialgie vermineuse (occasionnée par des vers particuliers rendus par l'anus); Odhe-Lius, journ. de médec., tom. LXXXVI, pag. 197. — Boenneken, frankische sammlungen, etc.; Vierter band; Nurnberg 1759, pag. 61, n.º IV.

S-esp. VII. Vers dans les organes urinaires.

A. Hématurie vermineuse; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. V, esp. 15.

B. Lombagie sympathique; SAUV., cl. VII, ord. v, gen. XXX, esp. 13.

C. Dysurie insectique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXVII, esp. 15.

D. Ischurie. A. -- Néphrelmintique; Sauv., cl. x, ord. III, gen. XIX, esp. 6. — B. -- Urétrelmintique; Sauv., ib., esp. 27.

S-esp. VIII. Vers dans la peau.

A. Vers de la lèpre; J. A. Murray, de vermibus in leprá obviis, etc.; Gotting. 1769.

B. Vers sortis des pustules de petite vérole;

RAZOUX, tables nosologiques, etc., pag. 262 (c'étoit des larves de la mouche).

Gen. XIX. STUPORISME.

Eth. de stupor, mot latin signifiant stupeur, engourdissement.

Dénomination employée pour désigner un genre de maladie occasionné par un poison ou par des miasmes vénéfiques stupéfians.

Car. Stupeur avec tendance plus ou moins rapide vers la résolution des forces, l'asphyxie ou l'apoplexie. Dans certains cas, fièvre spéciale; dans d'autres, menace de défaillances et mort plus ou moins rapide.

Esp. I. Stuporisme (apnéique) par la soustraction de l'air vital.

Car. La respiration devient pénible, embarrassée, foible, nulle.

S-esp. I. Par le gaz hidrogène.

Bibl. HALLÉ, recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance; Paris 1785.

BEDDOES et WAT, considérations on the

medicinal use and on the productions of factitious airs, etc.; Bristol 1795.

CAVALLO, an essay on the medicinal properties of factitious airs, etc.; London 1798.

Car. Au bout d'une minute ou d'une minute et demie, le pouls devient foible et fréquent, en même temps que le visage, les lèvres et les extrémités prennent une couleur bleuâtre et livide; ensuite la respiration devient graduellement difficile, laborieuse et convulsive; le sentiment et le mouvement se perdent; l'asphyxie est générale et mortelle: le sang, ainsi que toutes les parties, ont une teinte brunâtre.

Rap. A. Asphyxie latrinaire; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 11.

B. Amaurose latrinaire; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 9.

S-esp. II. Par le gaz hidrogène sulfuré.

Car. L'asphyxie est presque instantanée. Le sang, toutes les parties et sur-tout le foie ont une couleur noirâtre très-foncée.

Vapeurs mortelles du Vésuve; D. BARTA-LONI, atti dell'academia delle scienze di Siena; etc.; in Siena 1771, tom. IV; art. 8, pag. 201. S-esp. III. S-esp. III. Par le gaz azote.

Car. Les accidens sont ceux de la première sous espèce; l'asphyxie est moins prompte.

S-esp. IV. Par le gaz acide carbonique.

Bibl. SPIELMAN, historia aeris factitii; Argent. 1776--77; et coll. de WITWER, tom. IV, pag. 36 et 110.

BASSIANI CARMINATI, de animalium ex mephitibus et noxiis halitibus interitu, etc.; Laude-Pompeiá 1777.

EMMET, de aere fixo, sive acido aereo; Edinb. 1784; et coll. d'Edimbourg, tom. IV, pag. 464.

PORTAL, obs. sur les effets des vapeurs méphitiques dans l'homme, etc.; sixième édition, Paris 1787.

BUCQUET, mémoire sur la manière dont les animaux sont affectés par différens fluides aériformes méphitiques, etc.; Paris 1788; et hist. et mém. de la soc. roy. de médec. de Paris, ann. 1776, pag. 177.

Car. Les animaux plongés dans ce gaz y périssent en peu de secondes avec des efforts convulsifs qui sont sur-tout très-marqués dans

Tom. II.

la respiration; leurs muscles sont dans le plus grand affaissement; leur sang est peu coagulé, il a une couleur obscure, brunâtre, de même que toutes les parties de leur corps; souvent aussi les poumons sont si contractés, qu'ils se précipitent au fond de l'eau.

Rap. A. Asphyxie méphitique; Sauv., cl. v1, ord. 1v, gen. XXXIv, esp. 9.

A. Asphyxie carbonique; SAUV., ib., esp. 16.

E. Asphyxie par le moût; SAUV., ibid, esp. 3.

B. Catalepsie méphitique; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXV, esp. 3.

C. Apoplexie méphitique; SAUV., cl. vI, ord. v, gen. XXXI, esp. 14.

S-esp. V. Par le gaz carboneux.

Bibl. CHAUSSIER, précis d'expériences et d'observations sur les effets de quelques gaz, et particulièrement du gaz carboneux, sur les animaux; rec. périod. de la soc. de médec. de Paris, tom. XII, pag. 354.

Car. Les animaux périssent moins promptement que dans la sous-espèce précédente; leurs muscles restent encore un peu susceptibles de contraction par différens irritans; leur sang, ainsi que toutes les parties du corps ont une teinte écarlate, vermeille, très-différente de cette couleur brunâtre que l'on voit dans ceux qui ont été asphyxiés par l'acide carbonique.

S-esp. VI. Par la fumée.

Car. La respiration est promptement entrecoupée; on suffoque avec larmoyement et anxiété.

Rap. A. Asphyxie par la fumée; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 2.

B. Catalepsie par la fumée; SAUV., cl. VI, ord. v, gen. XXV, esp. 3.

S-esp. VII. Par un arome, savoir.

- A. Du comocladiá dentatá; LINN., triand, monog.
- B. Du safran oriental, crocus sativus; LINN. idem.
- c. De diverses espèces de chèvre-feuille, lonicera; LINN., pent. monog.
- D. Du laurier-rose, nerium oleander; LINN., idem.
 - E. De la datura strammonium; LINN., id.
- F. De la dentelaire, plumbago europæa; LINN., idem.

Rap. A. Carus par la dentelaire; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXX, esp. 10.

G. Du lis, lilium candidum; LINN., hexand. monog.

H. Du polianthes tuberosa; LINN., idem.

1. De l'adenanthera pavonica; LINN., idem.

K. De la rose de provins, rosa centifolia; LINN., icosand. polyg.

L. Du mancenilier, hippomane mancenilla; LINN., monœc. monad. Voy. encycl. méthod., dictionn. botanique, art. mancenilier.

M. De l'upa (a) des malais, des javanais; ipù des macassarais. Voy. Puichn, mater. medic. venen. regni vegetab., art. 277, pag. 177.

⁽a) VALMONT DE BOMARE avoit annoncé, sur la foi des voyageurs, que les exhalaisons de cet arbre qui ne croissoit que dans une île déserte, étoit aussi funeste aux productions de la nature qu'aux animaux et à l'espèce humaine. Le docteur DARWIN, botanic garden, tom. 11, édité en hollandais par N. P. FOERSCH, voyabiblioth. britann., scienc. et arts, tom. XIII, pag. 88, a renchéri sur tous les détails publiés sur les propriétés virulentes du bohon upas (description of the poison tree, etc.). Mais tout ce qui concerne l'histoire de cet arbre est fabuleux. C'est ce qu'attestent des détails consignés dans la gazette salutaire, ann. 1793, pag. 356, et dans le bulletin des sciences, ann. IV.

Car. Il se déclare d'abord un affoiblissement suivi d'un soulèvement d'estomac et d'une lassitude générale. Viennent ensuite la perte de la parole, la sueur froide, le vertige, l'asphyxie mortelle.

Esp. II. Stuporisme (synéqué) par l'action du miasme marécageux ou cloacal.

Bibl. Lancisi, de noxiis paludum effluviis, libri duo; Romæ 1717.

PLATNER, de morbis ex immunditiis; Lips. 1731; et opuscul. medic., tom. 1, pag. 70. — De pestiferis aquarum putrescentium expirationibus; Lips. 1747; et opuscul. medic., tom. 11, pag. 238.

- J. L. Schilling, de causis cur febres in locis paludosis sint frequentiores et pernicio-siores? Altorf 1753.
- S. Pellet, de palustrium locorum insalubritate à miasmate oriundă; Edinb. 1779.

Rapport concernant les marres qui sont au bas de la ville de Château-Thierry; Paris 1782.

ORLANDI, de exsiccandarum paludum pontinarum utilitate, deque infirmitatibus quæ ab aquis stagnantibus oriundis; Romæ 1783. FERNANDES, sobre las enfermedades que podian producir las copiosas iluvias e inundaciones de aquel anno, etc.; Madrid 1787.

Van Marum et Paest Van Troostwyk, dissert. couronnée par la société batave de Rotterdam, sur la nature des différentes vapeurs qui s'élèvent des terreins marécageux, des fanges, des latrines, des cloaques, etc.; verhandelingen van het batadfsch genootschap, etc., vol. VIII; Rotterd. 1787, art. I.

BAUMES, mémoire couronné par la société royale de médecine de Paris, sur les maladies qui résultent des émanations des eaux stagnantes, etc.; Nismes 1789.

BIKKER, mémoire couronné par la société batave de Rotterdam, sur le dessèchement des marais et les maladies qui en proviennent; verhandelingen, etc., vol. IX; Rotterd. 1790, art. 1.

Car. Après un état de débilité plus ou moins sensible, il se déclare une série d'accès que caractérisent pour l'ordinaire le froid, le chaud et la sueur, qui reviennent d'une manière régulière ou erratique, et que séparent une intermission ou une rémission. Dans quelques

cas, la subintrance des accès donne à cette maladie fébrile une apparence continue.

Rap. A. Fièvres intermittentes.

Syn. Fièvres intermittentes; Sauvages, cl. II, fièvres; ord. III. — LINNÉ, cl. II, critiques; ord. II. — VOGEL, cl. I, fièvres; ord. I. — Cullen, cl. I, pyrexies; ord. I, fièvres; sect. I. — Sagar, cl. XII, fièvres; ord. III. — Macbride, cl. I, universelles; ord. I, fièvres; gen. II. — VITET, cl. I, fièvres; ord. IV.

- Bibl. J. F. CARTHEUSER, de febribus intermittentibus epidemicis; Francof. ad Viadrum 1749; et coll. de Haller, tom. v, pag. 83.

 De febrium intermittentium vulgarium et epidemicarum differentia; Francof. ad Viad. 1751.
- C. T. Reinhard, carmen de febribus intermittentibus spuriis seu epidemicis ann. 1747 à 1752; Dresdæ 1752; Glogoviæ 1759.
- M. Alberti, de febre intermittente senibus lethiferá; Magdeb. 1754.
- J. G. GMFLIN, de innocuo atque egregio corticis peruviani in febribus intermittentibus usu; Tubing. 1754.

- J. Ph. Nonne, de febribus intermittentibus; Erford 1754.
- C. F. KALTSCHMID, de febribus intermittentibus et ex earum genere continuis; Venetiis 1757.

De recondită febrium intermittentium tum remittentium natură et de earum curatione, etc. (auct. Bouvard); Amstelodami 1759.

J. FLEURY, de febris intermittentis natură in genere; Edinb. 1760.

N. F. COLINY, tractatus de febribus intermittentibus cognoscendis et eurandis, etc.; Argent. 1760.

A. NIETZKY, de sebrium intermittentium symptomatibus quibusdam acutis; Halæ 1763.

A. FOTHERGILL, de febre intermittente; Edinb. 1763.

G. ROWLAND, de febre intermittente; Edinb. 1763.

DE REYNAL; essai sur la méthode de guérir les fièvres putrides, malignes, intermittentes, etc.; Paris 1763.

M. M. MARTINI, de nimio et improvido corticis peruviani in febribus intermittentibus usu; Bucephaliæ 1763.

I. Smyth, de febribus intérmittentibus; Edinb.

- CH. FR. KOCH, dissert. sistens considerationem pathologico-practicam febrium intermittentium; Halæ 1764.
- E. A. NICOLAI, de methodo febres intermittentes curandi; Jenæ 1766.
- A. E. BUCHNER, de méthodo medendi febribus intermittentibus; Halæ 1768.
- J. LIND, an essay on diseases incidental to europeans, etc. an appendix concerning intermittent fevers, etc.; Lond. 1768.
- A. E. Buchner, de primis viis morborum periodicorum sede frequentissimá; Halæ 1768.
- J. G. GIBSON, a treatise on continual, intermitting, eruptive, and inflammatory fevers, etc.; London 1769.
- L. S. Koreff, de causis febrium intermittentium autumnalium; Halæ ad Salam. 1769.
- G. Penni, de motu febrium periodico; Edinb. 1769.
- J. BRANDRETH, de febribus intermittentibus; Edinb. 1770; et coll. de Webster, tom. I, pag. 352.
- F. Ch. Juncker, de causă proximă febrium intermittentium, naturæ horroris, doloris, caloris ex rationibus physico-chimicis deductæ superstructa; Halæ 1770.

LINNÉ, febrium intermittentium curatio va-

ria; Upsal. 1771; et coll. de LINNÉ, tome.
IX, pag. 143.

D. LYSONS, practical essays upon intermitting fevers, etc.; Lond. 1772.

PH. A. BOEHMER, de curatione febrium intermittentium ex æstuantia infida et nociva; Halæ 1774.

W. TRNKA, historia febrium intermittentium; etc.; Vindobonæ 1775.

Th. Bowdler, de febrium intermittentium natura et indole; Edinb. 1775.

G. F. Teissier, ergo à febre vulgari intermittente cito compescenda, abstinentia; Paris 1775.

LINNÉ, de febrium intermittentium causă; Upsaliæ 1777; et coll. de LINNÉ, tom. X, pag. I.

L. C. SEGER, de febribus intermittentibus sub finem æstatis loco dyssenteriæ grassantibus; Helmstad. 1777.

G. Brown, de usu corticis peruviani in febribus intermittentibus; Edinb. 1779.

DUCHANOY, mém. sur l'usage des narcotiques dans les fièvres intermittentes, etc.; Paris 1780.

S. M. CASSEL, de febribus intermittentibus; Giessæ 1781. De febribus intermittentibus, typho et synocho, coll. de WEBSTER, 1781, tom. I, pag. 506.

W. SAUNDERS, observ. on the superior efficacy of the red peruvian barck in the cure of agues and other fevers, etc., third. edit. Lond. 1782--83.

J. J. Schaertlich, de usu opii in febribus intermittentibus; Gotting. 1783; et coll. de Franck, tom. 1, pag. 203.

ED. RIGBY, an essay of the use on the red peruvian barck in the cure of intermittens, etc.; Lond. 1783.

F. Buchanhan, de febribus intermittentibus medendis; Edinb. 1783; et dissertat. medic. Edinburg., art. 21.

J. CH. FIDLER, tractatus de febribus intermittentibus; Pragæ et Viennæ 1784.

CH. CH. MELART, de tempore exhibendi emetica in febribus intermittentibus, etc.; Gott. 1784.

- J. COLLIER, de febribus intermittentibus complectens; Edinb. 1784; et dissert. medic. Edinb., art. 18.
- C. STRACK, observat. medicin. de febribus intermittentibus et qua ratione eisdem medendum sit; Offenbach 1785.

J. H. NAUHEIMER, de febribus intermittentibus; Mogunt. 1785.

VOULLONE, mém. couronné par l'académie de Dijon, sur le caractère des fièvres intermittentes, etc.; Avignon 1786.

TH. FOWLER, medical reports of the effects of arsenic in the cure of agnes remitting fevers and periodic headachs, etc.; Lond. 1786.

DURAND, mémoire sur les fièvres intermittentes; Paris 1788.

F. G. VON HOVEN, versuch uber das væchselfieber und scine heilung besonders durch chinarinde, etc.; Wintherthur 1789.

CH. E. A. NEUNES, dissert. sistens quædam momenta de cortice peruviano ejusque usu in febribus intermittentibus; Jena 1789.

Bouffey, essai sur les fièvres intermittentes, etc.; Paris 1797, an VI.

Car. Les accès sont terminés par une intermission véritable; et lorsque ces accès ont une extension telle, que l'intermission n'est pas sensible; le caractère se trouve principalement dans le changement de l'état du malade de bien en mal et de mal en bien, comparé avec la briéveté du temps dans lequel ce changement s'est opéré. Ce caractère est également propre à la fièvre rémittente.

Rap. B. Fièvres rémittentes.

Syn. Fièvres rémittentes; Sauvages, cl. 11, fièvres; ord. 11. — Sagar, cl. XII, fièvres; ord. 11.

Fièvres exacerbantes; LINNÉ, cl. 11, critiques; ord. 111. — VITET, cl. 1, fièvres; ord. 11.

Fièvres continues; Vogel, cl. 1, fièvres; ord. 11, continues; sect. 1, simples.

Syneches des grecs; B. CASTELLI, lexicum medicum; Genevæ 1746, pag. 702 et 213.

Fièvres continues périodiques; Sennert, de febribus libri quatuor; Wittebergæ 1619-1653, lib. 11, cap. 13.

Fièvres continentes; R. MORTON, exercitationes de morbis universalibus acutis; Londini 1692, exerc. 11.

Fièvres continues rémittentes, proportionnées; F. Torti, therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas inopinato ac repente lethales; Mutinæ 1709-30; Venetiis 1743; Lips. 1756.

Fièvres continues rémittentes; Boerhaave,

aphorismi de cognoscendis et curandis morbis; Lugd-Batav. 1709-42; Lovanii 1751; aph. 727.

Fièvres composées d'une période aiguë; Juncker, tab. LXXXII.

Fièvres intermittentes dégénérées, et fièvre tierce autumnale; LEROY, mém. sur les fièvres aiguës; 1771, pag. 7 et 8.

Fièvres rémittentes; John Millar; observesur les maladies qui règnent le plus fréquemment en Angleterre, etc.; Londres 1780-83 (en anglais). Voy. rec. périod. de la soc. de méd. de Paris, tom. 1, pag. 69.

Bibl. F. Home, de febre remittente; Edinb. 1750; et coll. d'Edimbourg, tom. 1, pag. 435.

H. CH. HOERLE, de febribus continuis paroxyzantibus seu intermittentibus extensis; Argentor. 1771.

C. STRACK, observationes medicinales de diversa febris continuæ remittentis causa; Francof. et Mogunt. 1789.

BAUMES, mém. couronné, sur l'usage du quinquina dans les fièvres rémittentes; Nismes 1790.

J. L. ALIBERT, diss. sur les sièvres perni-

cieuses ou ataxatiques intermittentes; Paris, an VIII et an IX--1801.

J. B. Ch. Desains, diss. sur la fièvre meningo-gastrique (bilieuse) rémittente; Paris, an IX-1801.

Car. A la chûte des accès, les symptômes principaux disparoissent ou s'amandent; mais il reste toujours quelques phénomènes morbifiques jusques à l'entière guérison.

S-esp. I. Fièvre quotidienne.

Syn. Quotidienne; Cullen, cl. 1 pyrexies; ord. 1, fièvres; sect. 1, intermittentes; gen. 111.

Bibl. CH. FR. BLAUBERG, diss. med. sistens quædam ad febrem quotidianam spectantia; Jena 1791.

Car. Accès analogues qui reviennent chaque vingt-quatre heures et, pour l'ordinaire, le matin ou pendant la nuit.

Var. A. Intermittente.

Les accès reparoissant après un intervalle lucide.

Syn. Quotidienne; SAUVAGES, cl. 11, sièvres;

ord. 111, intermittentes; gen. IX. — LINNÉ, cl. 11, critiques; ord. 11, intermittentes; gen. XV. — VOGEL, cl. 1, fièvres; ord. 1; intermittentes; gen. I. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. 111, intermittentes; gen. IX. — VITET, cl. 1, fièvres; ord. IV, intermittentes; gen. 1. — PINEL, cl. 1, fièvres; ord. 111, adeno-meningées; gen. VI.

Bibl. S. Munck, de febre quotidiana intermittente; Argentor. 1754.

Rap. A. Quotidienne simple; SAUV., loc. cit., esp. 1.—Quotidienne légitime; SENNERT, HOFFMAN, tom. 11, pag. 34.

B. Quotidienne partielle (n'affectant qu'une des extrémités supérieures); SAUV., loc. cit. esp. 10.

C. Quotidienne sciatique; SAUV., loc. cit., esp. 5.

v, gen. XXXI, esp. 1.

D. Quotidienne épileptique; SAUV., loc. cit. esp. 4.

E. Quotidienne céphalalgique; SAUV., loc. eit., esp. 6.

Céphalalgie intermittente; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XI, esp. 7.

Céphalée

Céphalée fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XII, esp. 4.

F. Quotidienne néphralgique; Sauv., loc. cit., esp. 7.

Néphralgie fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXV, esp. 13.

G. Quotidienne strangurieuse; SAUV., loc. cit., esp. 11.

H. Hystéralgie fiévreuse; Sauv., loc. cit., esp. 9.

I. Ophtalmie fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord.
II, gen. XIV, esp. 23.

Quotidienne ophtalmique; Cullen, loc. cit., esp. 1, var. B.

Var. B. Rémittente.

Point d'apyrexie dans l'intervalle des accès. Syn. Amphimerine; Sauvages, cl. 11, fièvres; ord. 11, rémittentes; gen. VI. — LINNÉ, cl. 11, critiques; ord. 111, exacerbantes; gen. XX. — Sagar, cl. XII, fièvres; ord. 11, rémittentes; gen. VI. — VITET, cl. 1, fievres; ord. 11, exacerbantes; gen. VI. — VITET, cl. 1, fievres; ord. 11, exacerbantes; gen. I.

Quotidienne continue; Vogel, cl. 1, fièvres; ord. 11, continues; gen. XV.

Fièvre (a) phlegmatique périodique; Avi-

⁽a) Cette sièvre et la suivante, généralement pour-Tom. II.

CENNE, quarti canonis sen prima de sebribus; Patavii 1659, cap. 46.

Fièvre lymphatique première; ETTMULLER, oper; Genev. 1736, tom. 11; colleg. consult., cas. XXXI, pag. 1459.

Rap. A. Amphimerine singultueuse; SAUV., loc. cit., esp. 13.

Lyngode; Vogel, loc. cit., esp. XXVI.

S-esp. II. Fièvre tierce.

Syn. Tierce; Cullen, cl. 1, pyrexies; ord.

1, fièvres; sect. 1, intermittentes; gen. 1.

Bibl. STAHL, de tertianá febri genium universum manifestante; Halæ 1706; et coll. de HALLER, tom. V, pag. 1.

Car. Accès semblables qui reviennent périodiquement aux environs de midi; ou en devançant, pour l'ordinaire, de deux heures les uns sur les autres: après quarante-huit heures de l'invasion de l'accès précédent.

Var. A. Intermittente.

être les sièvres quotidiennes, sont plutôt des formes de blennose pyrétique, que de vraies sous-espèces de sièvres intermittentes ou rémittentes.

Syn. Tierce; SAUV.; cl. 11, fièvres; ord.
111, intermittentes; gen. X. — LINNÉ, cl. 11,
critiques; ord. 11, intermittentes; gen. XVI.
— VOGEL, cl. 1, fièvres; ord. 1, intermittentes; gen. 11. — SAGAR, cl. XII, fièvres;
ord. 111, intermittentes; gen. X. — VITET,
cl. 1, fièvres; ord. IV, intermittentes; gen. II.

- Bibl. H. G. KASTENHOLTZ, consectaria theor.-pract. ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium depromptā; Altorf 1745; et coll. de HALLER, tom. v, pag. 61.
- J. G. Duising, de methodo medendi febribus intermittentibus tertianis; Marburg. 1753.
- G. GRIEVE, de febribus tertianis intermittentibus; Edinb. 1770.
- I. F. Delius, de malignitate circa febres tertianas; Erlang. 1786; et adversar. argum. physic. medic. fascicul. v, diss. XXIII.

Car. Apyrexie parfaite qui termine les accès et en sépare les intervalles.

Rap. A. Tierce limitée; les accès se terminant en douze heures.

Tierce légitime; SAUV., loc. cit., esp. 12.
Tierce accidentelle; SAUV., loc. cit., esp. 12.

B. Tierce étendue; les accès durant plus de douze heures.

Tierce bâtarde; SAUV., loc. cit., esp. 2.

Tierce incomplète; VITET, loc. cit., esp. XI.

C. Tierce doublée; avec deux accès dans le même jour; et ces accès se correspondant alternativement lorsqu'ils sont inégaux.

Var. B. Rémittente.

Syn. Tritæophye; SAUVAGES, cl. 11, sièvres; ord. 11, rémittentes; gen. VII. — SAGAR, cl. XII, sièvres; ord. 11, rémittentes; gen. VII.

Tritée; LINNÉ, cl. II, critiques; ord. III, exacerbantes; gen. XXI.

Tierce continue; VITET, cl. I, sièvres; ord. II, exacerbantes; gen. II.

Fièvre rémittente; 1.º adéno-meningée (a);
PINEL, cl. 1, fièvres; ord. 111, adéno-meningées; gen. VIII. — 2.º Adynamique; PINEL aib. ord. IV, adynamiques; gen. x. — 3.º Fièvre rémittente ou intermittente ataxique; PINEL ib. ord. V, ataxiques; gen. XIV.

Fièvres périodiques pernicieuses; Torti, loc. cit.

⁽a) Voyez ci-dessus, pag. 31, S-esp. III.

Bibl. Pujati, de morbo narroniano; Feltriæ 1747.

- J. GRAINGER, historia febris anomalæ batavæ annorum 1746 à 1748; Edinburgensis 1753.
- A. E. BUCHNER, de febris intermittentis complicatione cum maligná casu quodam il-lustratá; Halæ 1757.
- P. A. SCHMIDT, de febrium mali moris continuarum et intermittentium circa autumnum anno 1757, epidemicè sævientium, origine, indole, causis, præservatione ac curatione; Jenæ 1759.
- J. G. ROEDERER, de febre ex intermittente continuâ; Gotting. 1760.

LAUTTER, historia medica biennalis morborum ruralium qui..... Laxemburgi... doniinati sunt, etc. Vindobonæ 1761.

Rapport sur l'épidémie de Villeneuve-lez-Avignon; hist. de la soc. roy. de médec. de Paris, ann. 1776, pag. 213.

P. VAN FLSACKER, specimen med. pract. febrem remittentem continuam bilioso-putridam anno 1772 Antuerpiæ, etc.; Antuerpiæ 1779.

GARDEIL, mémoire sur une épidémie qui a régné à Toulouse pendant l'automne de l'année 1772; histoire et mém. de la société royale

de médec. de Paris; Paris 1779, pag. 14 des mém.

N. RIGLER, constitutio epidemica annorum 1775-76-78-79; Vratislaviæ 1780.

Car. L'intervalle des paroxismes n'est marqué que par une rémission.

Rap. A. Lipyrie (avec froid des parties extérieures et chaleur interne); VOGEL, cl. 1, ord 11, gen. XXIV.

Tritæophye lipyrique; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VII, esp. 8.

B. Tierce algide, avec sentiment de froid, croissant pendant l'accès, pour l'ordinaire glacial, quelquefois accompagné de soif et de chaleur douce au tact.

Tierce algide; Torti, loc. cit., pag. 138.

— ALIBERT, diss. sur les sièv. pern. ou atax.
intermit., 2.º édit., pag. 18.

Frisson fébrique; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVII, esp. 7.

Fièvre pétéchiale algidique; ACREL, kongl. vetenskaps academiens handlingar for aor 1767, vol. XXVIII; Stockolm 1767, art. 9, pag. 320.

C. Tierce sub-sanglante ou atrabilaire; avec

flux de ventre semblable à de la lavure de chair); Torti, de febr. period. pernic., pag. 136. — ALIBERT, loc. cit., pag. 7.

Hépatirrhée intermittente; Sauv., cl. 1x, ord. 11, sect. 1, gen. VIII, esp. 7.

D. Tierce syncopale (l'accès étant caractérisé par des défaillances); Torti, loc. cit., pag. 138. — ALIBERT, loc. cit., pag. 16.

Tierce syncopale; SAUV., loc. cit., esp. 1. Syncope fébrique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 17.

E. Peste intermittente; PARIS, mém. sur la peste, esp. 5.

F. Tierce hystérique; Sauv., cl. 11, ord. 111, gen. x, esp. 8.

Hystérie fiévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XX, esp. 8.

G. Fièvre intermittente ataxique délirante; ALIBERT, diss. sur les fièv. pernic. ou atax. interm., pag. 31, §. XI.

Tierce maniaque ou avec manie convulsive; Geoffroy, constit. du printemps de l'année 1792; journ. de médec., tom. LXXXVII, pag. 188.

H. Tétanos fiévreux; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. 10.

I. Tierce carotique.

Voy. G. F. Sigwart, de febre tertiana intermittente soporosa ut plurimum funesta, feliciter tamen curanda; Tubing. 1757.

A. E. BUCHNER, de febre tertiană, intermittente epidemică, soporosă, apoplexiam mentiente; Halæ 1763.

Tierce léthargique; TORTI, loc. cit., pag. 138. — Carotique; SAUV., loc. cit., esp. 10. — Soporeuse; ALIBERT, loc. cit., pag. 21, §. X.

Tritæophye carotique; SAUV., loc. cit., esp. 6.

Parapoplexie; CH. PISON, select. observat. et consil., etc., pag. 78.

Apoplexie fébrique; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXXI, esp. 9.

K. Tierce épileptique; SAUV., loc. cit., esp. 16,

Fièvre intermittente ataxique, épileptique; ALIBERT, loc. cit., pag. 45, §. XV.

Fièvre intermittente ataxique, convulsive; ALIBERT, ibid, pag. 46, §. XVI.

L. Tierce avec coqueluche; BJÆRALUND, gazett. salut., ann. 1788, n.º XLVII.

M. Tierce asthmatique; Sauv., loc. cit., esp. 6.

Tierce catarrale; MORAND, de quibusdam tertianis perniciosis comment.; cap. 3.

Fièvre intermittente ataxique, dyspnéique; ALIBERT, loc. cit., pag. 47, §. XVIII.

Asthme fiévreux; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. VIII, esp. 20.

N. Fièvre intermittente ataxique céphalal-gique; ALIBERT, loc. cit., pag. 46, §. XVII.

O. Tierce cardialgique,

Tierce cardiaque; Torti, loc. cit., pag. 137. — Alibert, loc. cit., pag. 9, §. vi.

Cardialgie fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 4.

Gastrodynie fiévreuse; Sauv., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 17.

P. Assode (avec des anxiétés soutenues); Vogel, cl. 1, ord. 11, gen. XXVII.

Tritæophye assode; Sauv., cl. 11, ord.
11, gen. VII, esp. 5. — L. Heister, diss.
sistens theoriam atque therapiam molesti febrium essentialium symptomatis cujus signum
est anxietas; Helmst. 1755. — J. F. FASEL,
de anxietate, speciatim febrili; Jenæ 1763.

Q. Tierce cholérique (avec vomissement bilieux et déjection bilieuse pendant l'accès);
TORTI, loc. cit., pag. 135. — ALIBERT, loc. cit., pag. 5, \$\infty\$. IV.

Cholérée intermittente; SAUV., cl. IX, ord. II, sect. II, gen. XV, esp. 5.

Tierce émétique; SAUV., loc. cit., esp. 7.

R. Tierce avec colique; Morton, de proteiform. febr. intermit. genio, histor. 16, 17, 18.

Colique fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 21.

Rachialgie fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. V, gen. XXIX, esp. 2.

- S. Fièvre intermittente ataxique hydrophobique; ALIBERT, loc. cit., pag. 49, §. XIX.
- T. Tierce hémiplégique; Sauv., loc. cit., esp. 20.
- U. Tierce avec aveuglement; Morand, de quibusdam tertianis perniciosis comment. cap. 3.

Amaurose intermittente; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 13.

V. Fièvre ataxique intermittente néphrétique; ALIBFRT, loc. cit., pag. 43, §. XIV.

X. Tierce diaphorétique (avec sueur aussitôt après le froid, sans calme sensible pendant l'accès); Torti, loc. cit., pag. 137. — Ali-Bert, loc. cit., pag. 12, §. VII.

Tritæophye élode (typhode de quelques auteurs); Sauv., loc. cit., esp. 4. Elode; Vogel, cl. 1, ord. 11, gen. XXI. Ephidrose fiévreuse; SAUV., cl. 1X, ord. 111, gen. XX, esp. 7.

Y. Tierce inflammatoire.

Fièvre rémittente inflammatoire ardente; MACBRIDE, cl. I, ord. I, gen. III, esp. I, var. c.

Fièvre de Lausanne; Tissot, de febre Lausannesi, pag. 116, 135.

Fièvre rémittente bilieuse inflammatoire; Selle, pyretol, ord. 11, gen. 1.

Fièvre rémittente des camps (remitting fever of the camp) pringle observat. on the diseases of the army, 1765, pag. 105, 157.

Z. Tierce rémittente inflammatoire péripneumonique; MACBRIDE, cl. 1, ord. 1, gen. 111, esp. 1, var. B.

Fièvre intermittente ataxique péripneumonique; ALIBET, loc. cit., pag. 37, §. XII.

AA. Causus ou kausos; avec chaleur ardente.

Bibl. Réflexions sur la nature de la constitution estivale de 1781, dans une partie de la France, par la soc. roy. de médec., lues le 18 septembre 1781.

B. Rusch, sur la sièvre bilieuse rémittente

qui a régné à Philadelphie pendant l'été de 1780. Medical inquiries, etc.; Philadelph. 1791.

Tritæophye causus; SAUV., loc. cit., esp. 2. Tritæophye américaine; SAUV., ib., esp. 12.

BB. Tierce pleurétique; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. x, esp. 4.

Pleurésie périodique; SAUV., cl. 111, ord. 11, gen. XIII, esp. 14.

Tierce pleurétique; Morton, loc. cit., hist. 21.

Pleurodynie fébrique; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. XI, esp. 15.

Fièvres intermittentes de Vienne en 1790; FERRO, ephemerides medicæ; Viennæ 1792.

CC. Tierce dyssentérique; GALEATI, comment. acad. Bononiens., tom. V, part. 11, pag. 221 et 222.

Tierce demi-dyssenterique; Burseri, inst. med. pract.; Neapol. 1790, vol. 1, pag. 256.

Voy. J. ROLLO, observations on the acute dyssentery, etc.; Edinb. 1786.

DD. Tierce pétéchiale; SAUV, cl. 11, ord. 111, gen. X, esp. 3.

Tierce pétéchizante; MORAND, loc. cit., cap. 3.

EE. Tierce miliaire, SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. x, esp. 21.

FF. Tierce ortiaire; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. X, esp. 22.

GG. Tierce puerpérale; OSIANDER, beo-bachtungen und erfahrungen, etc.; Tubing. 1787.

HH. Tierce scorbutique; MORAND, loc. cit., cap. 3. — BURSERI, loc. cit., pag. 271.

II. Tierce arthritique; Morton, loc. cit., hist. 12 et 22. — Burseri, loc. cit., tom. 1, pag. 267. — Strack, loc. cit., pag. 143.

KK. Fièvre rémittente accompagnée d'accidens graves et de l'éruption d'une humeur terreuse par tout le corps; Jemois, journ. de médec., tom. LXXIX, pag. 337.

S-esp. III. Double-tierce.

Car. Dans une période de vingt-quatre heures, il y a deux accès pour l'ordinaire inégaux, mais se correspondant à jours alternatifs.

Var. A. Intermittente.

Intermission manifeste dans l'intervalle des accès.

Rap. A. Double-tierce; SAUVAGES, cl. II,

fièvres; ord. III, intermittentes; gen. x, esp. 13.—LINNÉ, cl. II, critiques; ord. II, intermittentes; gen. xvIII.—SAGAR, cl. XII, ord. III, intermittentes; gen. x, esp. 19.

B. Tierce doublée (les deux accès qui caractérisent la double tierce ayant lieu dans le même jour; et le second jour étant apyrexique); SAUV., loc. cit., esp. 13. — SAG., loc. cit., esp. 20.

Double-tierce intermittente syncopale; LE-CHEVEREL, rec. périod. de la soc. de méd. de Paris, tom. XI, pag. 391.

Var. B. Rémittente.

Syn. Hémitritée des grecs, de CELSE.

Bibl. G. Fanois, de morbo epidemico hactenus inaudito, præteritā æstate anni 1669, Lugduni-Batavorum vicinisque locis grassante; Leydæ 1671.

I. A. FISCHER, de hepatitide pegaviæ in circulo Lipsiensi epidemicè grassante; Erford 1718; et coll. de Haller, tom. v, pag. 143.

I. DE KOKER, de morbo epidemico anni 1719; et coll. de HALLER, tom. v.

H. W. ARNOLD, de febre stomachali epi-

demica; Marburg. 1727; et coll. de HALLER, tom. v, pag. 129.

G. DETHARDING, de febribus eyderostadiensibus epidemicis vulgo stoppelfieber; Hafniæ 1735.

F. I. Molitor, de febre continuâ malignâ et intermittente tertianâ utrâque ad Rhenum ann. 1734 et 1735, epidemica et castrensi; Heidelberg. 1736; et coll. de Haller, tom. v, pag. 263.

I. G. WAGNER, de febre quâdam acută in tractu Germaniæ mari baltico ac præsertim Lubecæ observată; Lubec. 1737; et coll. de HALLER, tom. II, pag. 167.

P. Gobb, diss. amplectens historiam et curam epidemicæ febris quæ...... tergestes incolas vexavit; Viennæ 1754; et coll. de HALLER, tom. VII, pag. 829.

LINNÉ, febris Upsaliensis; Upsal. 1757; et coll. de LINNÉ, tom. v, pag. 18.

S. Aurivill, de febribus intermittentibus malignis; Upsal. 1765; et coll. de Baldin-Ger, tom. I, pag. I.

J. RAYMOND, diss. exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quot annis Mittelburgi..... grassantium; Duisburgi 1767; et coll. de BALDINGER, tom. 1, pag. 28.

- J. LIND, de febre remittente putrida paludum quæ grassabantur in Bengalia, A. D. 1762; Edinb. 1768; et coll. d'Edimbourg, tom. 111., pag. 116.
- J. GILCHRIST, de febre anomală inter dunfrisienses epidemică 1767; Edinb. 1774.
- R. JACKSON, a treatise on the fevers of Jamaica, etc.; London 1781.
- J. M. STORCK, hæmitritæ a CELSI et GA-LENI; Vindobonæ 1782; et coll. de WASSER-BERG, tom. I, pag. 234.

AASKOW, descriptio et methodus medendi febris tertianæ duplicis periculosissimæ anno 1779 Hafniæ grassantis; acta reg. soc. med. Hauniens.; Hauniæ 1783, pag. 150.

J. Rollo, observations on the diseases which appearet in the army on St-Lucia en 1778 et 1779; London 1781.

Réflexions sur la nature et le traitement des épidémies qui ont régné en différentes provinces de la France pendant le printemps de 1785; Paris 1785.

F. Balfour, a treatise on putrid intestinal remittent fevers, etc.; Lond. 1790.

Car. Les accès, seulement séparés par une rémission plus ou moins courte, obscure, sont

en général accompagnés de symptômes graves.

Rap. A. Amphimérine hémitritée; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 8.

Amphimérine fausse hémitritée (fièvre continue avec une tierce doublée); Sauv., ib., esp. 9.

B. Hémitritée de GALIEN, ayant deux accès de tierce doublée dans un jour, et un accès de quotidienne continue le jour suivant.

Semi-tierce de SPIGEL, de semi-tertiană libri quatuor; Francof. 1624.

Tierce triple; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. x, esp. 15.

C. Tierce subintrante; les accès double-tierces rentrant les uns dans les autres.

Quotidienne insidieuse; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. IX, esp. 2.

Tierce subcontinue; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. X, esp. 19.

Amphimérine demi-quinte; SAUV, cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 24.

Tritæophye insidieuse; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VII, esp. 9.

D. Phricode (avec froid horrifique); Vogel, cl. 1, ord. 11, sect. 1, gen. xxv.

Tom. II.

Amphimérine phricode; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 7.

E. Épiale, avec des sensations simultanées de froid et de chaud.

Amphimérine épiale; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 3.

F. Syncopale (avec défaillances pendant l'accès; Vogel, cl. 1, ord. 11, gen. XXIX.

Amphimérine syncopale; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 4.

Amphimérine humorale; SAUV., ib., esp. 6. Amphimérine cardiaque; SAUV., ib., esp. 5.

- G. Quotidienne soporeuse; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. XIX, esp. 8.
- H. Fièvre maligne avec redoublemens soporeux ou fièvre maligne des vieillards; Leroy, mém. sur les fièvr. aig., pag. 16.
- I. Quotidienne épileptique; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. 1x, esp. 4.

Eclampsie siévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 15.

Fièvre hémiplégique; LEROY, mém. sur les sièvr. aig., pag. 26.

K. Tierce putride avec abattement, septicité

des excrétions, saleté de la langue et des dents, etc.

Amphimerine paludique; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 19.

Amphimerine bilieuse; SAUV., ib., esp. 21, Fièvre rémittente putride bilieuse; MAC-BRIDE, cl. 1, ord. 1, gen. 111; esp. 2, var. A.—Fièvre rémittente putride paludique; MAC-BRIDE, var. C.

Fièvre rémittente et intermittente; PRIN-GLE, observations on the diseases of the army, etc. the fifh edition; London 1765, pag. 183.

Fièvre rémittente des pays humides et chauds; LIND, an essay on diseases incidental to Europeans in hos climates, etc.; London 1768, pag. 19, 32, 62, 90, etc.— J. Hunter, observations on the diseases of the army in Jamaica; London 1788.— R. Jackson, a treatise on the fevers of Jamaica, etc.; London 1791.

Fièvre rémittente bilieuse putride; Selle, pyretolog., ord. 11, gen. 11.

Fièvre de Smyrne; GARDINER, observations on the animal economy, etc.; London 1785.

Fièvres pestilentielles de la baie d'Atongil au Madagascar ; l'abbé Rochon, voyage à Madagascar et aux Indes orientales. L. Peste rémittente; SAUV., cl. III, ord. I, gen. I, esp. 9.

S-esp. IV. Fièvre quarte.

Syn. Quarte; Cullen, cl. 1, pyrexies; ord. 1, sièvres; sect. 1, intermittentes, gen. 11.

Bibl. H. Schulze, de mercurialium usu in febre quartană curandă; Halæ 1742; et coll. de Haller, tom. v, pag. 101.

J. FELLINGA, de febre quartană; Groning. 1784.

L. Q. BENARD, diss. sur la fièvre quarte; Paris, an x.

Car. Fièvre débutant après-midi avec des accès qui reviennent après soixante et douze heures, ou chaque troisième jour. Le froid est long, et la chaleur qui lui succède a des accroissemens lents.

Rap. A. Claquement des dents (trismus crepitans); Sauv., cl. IV, ord. I, gen. II.— Hamberger, de frigore morbifico; Jenæ 1725.

Var. A. Intermittente.

Syn. Quarte; SAUVAGES, cl. II, sièvres;

ord. III, intermittentes; gen. XI. — LINNÉ, cl. II, critiques; ord. II, intermittentes; gen. XVII. — VOGEL, cl. I, fièvres; ord. I, intermittentes; sect. I, simples; gen. III. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. III, intermittentes; gen. XI. — MACBRIDE, cl. I, universelles; gen. III, fièvre intermittente; esp. 4. — VITET, cl. I, fièvres; ord. IV, intermittentes; gen. III. — PINEL, cl. I, fièvres; ord. III, adénoméningées; gen. VII.

Bibl. C. F. KALTSCHMID, de febre quartana intermittente; Jena 1757.

Car. Fièvre intermittente avec apyrexie parfaite entre les accès.

Rapports typiques.

A. Quarte (ordinaire) avec un accès reparoissant chaque quatrième jour inclusivement, et laissant deux jours d'intervalle.

Quarte légitime; SAUV., loc. cit., esp. 1. Quarte autumnale; VITET, loc. cit., esp. 1.11.

Quarte gastrique; VITET, loc. cit., esp. 1.

B. Quarte (doublée) avec deux accès le jour paroxistique.

Quarte doublée; SAUV., loc. cit., esp. 4.

C. Quarte (triplée) avec trois accès le jour paroxistique.

Quarte triplée; SAUV., loc. cit., esp. 16.

D. Double-quarte (avec un accès le premier jour, correspondant avec celui du quatrième; un accès le second jour, correspondant avec celui du cinquième; le troisième et le sixième jours étant libres); Sauv., loc. cit., esp. 3.

E. Triple-quarte (avec un accès pendant trois jours de suite; le premier correspondant au quatrième; le second, au cinquième; le troisième, au sixième); Sauv., loc. cit., esp. 5.

Rapports symptômatiques.

F. Quarte hystérique; SAUV., loc. cit., esp. 10.

G. Quarte délirante; VITET; loc. cit., esp. IV.

H. Quarte cataleptique; SAUV., loc. cit., esp. 7.

I. Quarte comateuse; SAUV., loc. cit., esp. 15.

K. Quarte épileptique; SAUV., loc. cit., esp. 8.

L. Quarte néphralgique; SAUV., loc. cit. esp. 9.

M. Quarte métastatique; Sauv., loc. cit., esp. 17.

N. Quarte scorbutique; SAUV., loc. cit., esp. 14.

O. Quarte arthritique; SAUV., loc. cit.; esp. 11.

Goutte fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. I, esp. 10.

Var. B. Rémittente.

Syn. Tetartophye; Sauv., cl. 11, fièvres; ord. 11, rémittentes; gen. VIII. — LINNÉ, cl. 11, critiques; ord. 111, exacerbantes; gen. XXII. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. 11, rémittentes; gen. XIII.

Fièvre quarte continue; VITET, cl. 1, fièvres; ord. 11, exacerbantes; gen. 111.

Bibl. C. H. Rose, de febre quartana continua; Argent. 1758.

Rap. A. Tétartophye simple; Sauv., loc. cit., esp. 1.

Amphimérine semi-quarte; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 23.

B. Tétartophye maligne; SAUV., loc. cit., esp. 6.

Voy. P. G. ARNOLD, de febre biliosa perversa methodo tractata ac in febrem quartatanam, tandemque in hydropem ascitem degenarata; Griphiswald 1766. C. Amphimérine spasmodique; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 16.

Fièvre quarte continue maligne, avec spasme; VITET, loc. cit., esp. 11.

D. Tétartophye carotique; SAUV., loc. cit., esp. 4.

Fièvre quarte continue soporeuse; VITET, loc. cit., esp. 1.

E. Tétartophye; A. avec cécité; B. avec amaurose; New, diss. inaug. medic. exhibens observationes medico-practicas et chirurgicas; Gotting. 1778.

S-esp. V. Fièvre erratique.

Syn. Erratique; SAUVAGES, cl. II, fièvres; ord. III, intermittentes; gen. XII. — LINNÉ, cl. II, critiques; ord. II, intermittentes; gen. XIX. — CULLEN, synops. nosol. meth., tom. II, Venet. 1787, pag. 16. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. III, intermittentes; gen. XII. — MACBRIDE, cl. I, universelles; ord. I, fièvres; gen. II, intermittentes; esp. 4. — VITET, cl. I, fièvres; ord. IV, intermittentes; gen. IV.

Car. Accès dont les retours égaux ou iné-

gaux reviennent après un intervalle de quatre jours.

Var. A. Quinte.

Caractérisée par des accès qui reviennent chaque cinquième jour; Vogel, loc. cit., esp. IV.

Erratique quinte; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Sextaine.

Se reproduisant chaque sixième jour; Vogel, loc. cit., esp. v.

C. Septaine.

Les accès revenant après un intervalle de six jours; VOGEL, loc. cit., esp. VI.

Erratique septaine; SAUV., loc. cit., esp. 2. Hebdomadaire de SCHENCKIUS.

Septimane de Morgagni, epistol. XLIX, art. 36.

D. Octaine.

Avec des accès dont le retour a lieu chaque huitième jour; VOGEL, loc. cit., esp. VII.

Erratique octaine; Sauv., loc. cit., esp. 3.

E. Nonaine.

Ayant des accès qui reparoissent après huit jours d'intervalle; Voget, loc. cit., esp. VIII.

Erratique nonaine; SAUV., loc. cit., esp. 4.

F. Décimaine.

Le retour des accès tombant chaque dixième jour; Vogel, loc. cit., esp. 1x.

Erratique décimaine; SAUV., loc. cit., esp. 5.

G. Vague.

Les accès revenant sans règle; Vogel, loc. cit., esp. x.

Erratique vague; SAUV., loc. cit., esp. 6.

Formes de sièvre intermittente.

Voyez A. E. Buchner, de morbo periodico generatim; Halæ-Magdeb. 1754.

A. NIETZKI, de motibus febrilibus febrium intermittentium indoli analogis; Halæ 1763.

- F. C. MEDICUS, etc. geschichte periodischer krankheiten, etc.; Carlsruhe 1764; en français par LEFEBVRE de VILLEBRUNE; Paris 1790.
- J. F. HIMMELREICH, de morbis intermittentibus topicis; Utrecht 1789.
- Sor. 1. Hémorragie fébrile; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. 1, esp. 3.
- 2. Vomissement fiévreux; SAUV., cl. IX, ord. 11, §. 11, gen. XIII, esp. 12., var. A. STRACK, loc. cit., pag. 137.

- 3. Chorée intermittente; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XXI, esp. 4.
- 4. Cochemar tiercenaire; SAUV., cl. v, ord. I, gen. I, esp. 5.
- 5. Passion hystérique, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit.; pag. 145.
- 6. Délire fiévreux; SAUV., cl. VIII, ord. III, esp. XVII, gen. 10.
- 7. Tétanos fiévreux; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. 10.
- 8. Carus, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 110.
- 9. Eclampsie fiévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 15.
- 10. Epilepsie fiévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 9.
- 11. Convulsion, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 150.
- 12. Frisson tiercenaire; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVII, esp. 6.
- 13. Palpitation fiévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XV, esp. 15.
- 14. Toux sèche, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 133.
- 15. Asthme, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 134.

- 16. Orthopnée fiévreuse; SAUV., cl. v, ord.
 11, gen. IX, esp. 20.
- 17. Phthisie pulmonaire, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 154. Phthisie fiévreuse (elle complique plutôt qu'elle n'accompagne essentiellement les fièvres intermittentes); SAUV., cl. X, ord. 1, gen. 11, esp. 13.
- 18. Céphalalgie, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 105.
- 19. Cholerée, sièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 141.
- 20. Colique, sièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 139.
- 21. Hémiplégie intermittente; SAUV., cl. VI, ord. 111, gen. XIX, esp. 8.
- 22. Paraplexie intermittente; SAUV., cl. VI, ord. 111, gen. XX, esp. 6.
- 23. Diarrhée fiévreuse; SAUV., cl. IX, ord. 11, sect. 2, gen. XVI, esp. 20.
- 24. Ophtalmie, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 114.
- 25. Pleurésie, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 115.
- 26. Catarre, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 128.
- 27. Rhumatisme fiévreux; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. III, esp. 9.

- 28. Jaunisse fiévreuse; SAUV., cl. X, ord. VI, gen. XXXII, esp. 8.
- 29. Goutte, fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 143.
- 30. Gonflement épigastrique, à la suite des fièvres intermittentes supprimées mal-à-propos; BUEKING, rec. périod. de littér. méd. étrang., tom. 1, pag. 223.
 - Esp. III. Stuporisme (synoqué) par l'action du miasme animal ou humain.
- Bibl. A. P. Nahuys, verhandeling over de schadelike hoedanigheid der lugt in de gasthuysen en gevangenissen benevens deszelvs hulpmiddelen, etc.; the Haarlem 1770.
- I. L. GERICKE, diss. sistens miasmatologiam generalem; Gotting. 1775.
- I. F. Delius, vicinia morbifica, etc.; Erlang 1788; et advers. argum. phys. med. fascic. sextus. diss. XXVII.

EHMSEM, de aere corrupto, ejusque remediis; Gotting. 1788.

GUYTON-MORVEAU, traité des moyens de désinfecter l'air; Paris, an IX-1801.

Car. Maladie fébrile continue avec asthénie profonde et contagion.

Rap. A. Fièvre putrido-sanguine.

Syn. Typhus; SAUVAGES, cl. 11, fièvres; ord. 11, continues; gen. IV. — Cullen, cl. 1, pyrexies; ord. 1, fièvres; gen. v. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. 1, continues; gen. IV.

Fièvre continue putride; MACBRIDE, cl. 1, universelles; ord. 1, sièvres; esp. 4.

Fièvre continue maligne; VITET, cl. 1, fièvres; ord. 1, continues simples; gen. IV.

Fièvres adynamiques; PINEL, cl. 1, fièvres; ord. v.

Fièvre continente putride; SELLE, pyretol., ord. 1, gen. 11.

Fièvre putride; Quarin, method. medend. febrium, cap. IV.

Fièvre putride sanguine; BAUMES, ann. mé-dicin., 1.re part.

Fièvre putride primitive; HERZIG, cl. 1, ord. 1, sect. 1, sous-sect. 11, gen. 1.

Bibl. VAN DER MYE, de morbis et symptomatibus popularibus bredanis, etc.; Antuerp. 1627, 1629; édit. de Gruner; Jena 1792.

G. LAURIE; de malignitate et de peste; Edinb. 1744.

I. G. BRENDEL, de cognatione paraphre-

mitidis et febrium malignarum; Gotting. 1752.

DE MEZEREY, méthode aisée et peu coûteuse de traiter avec succès plusieurs maladies épidémiques, etc.; nouv. édit.; Paris 1753.

A. NIETZKY, de febribus complicatis in genere; Halæ 1753.

A. E. BUCHNER, de gradibus malignitatis in morbis malignis; Halæ-Magdeb. 1755.

J. Juncker, de motuum antipraxia in febribus malignis materia maligna sæpius maligniore; Halæ-Magdeb. 1755.

S. T. QUEMALZ, de exhalationum putridarum ex cadaveribus bello trucidatorum suppressione; Lipsiæ 1757.

G. R. BOEHMER, de crocidismo et carpologià, signo in morbis acutis plerumque lethali; Vittebergæ 1757.

L. A. VERBEK, de synocho putridâ epidemica hujus et elapsi anni vermibus stipata; Pragæ 1758.

Traité des fièvres malignes et pourprées; Montpel. 1763.

PH. A. BOEHMER, de transitu febrium benignarum in malignas, præsertim in frisiå orientali; Halæ 1764.

I. M. KRAHMER, diss. sistens meditationes circa febrem malignam, topicam biliosam vel

cholericam putrem recentiorum, ejusque medelam; Argentor. 1765.

J. H. RIEPENHAUSEN, morbi epidemii statim ab initio proximi belli usque ad ejus finem scilicet ab anno 1757, usque ad 1762 Goettingæ et circa eam grassati; Halæ 1765.

A. BAECK, tal om farsoter, som mase haria ibland rikets allmoge; Stockolm 1765.

- C. H. CARGER, diss. curationem febrium continuarum putridarum spectans; Gryphiswald 1766.
- F. PENROSE, a dissertation on the inflammatory, gangrenous and putrid sore throat also on the putrid fever, etc.; Oxford 1766.
- O. NERUCCI, historia febris epidemicæ senensis 1766 et 1767, etc.; Senis 1767.
- I. E. H. SCHROEDER, de putridis febribus; Harderovici 1767.
- E. A. NICOLAI, de notione morbi maligni; Jena 1767.
- G. F. Sigwart, febris malignæ pathologia; Tubing. 1768.
- P. Schroeder, diss. sistens febrium putridarum differentias; Gotting. 1768; et opusc. medic., tom. 11, pag. 147.
 - E. A. NICOLAI, de putredine; Jena 1769. Ludwig, morbi epidemici sub finem anni

1757 et initium 1758 Lipsiæ grassantis, etc., advers. med. pract.; Lipsiæ 1770, vol. 1; pars 1, art. 1, pag. 21.

- Meletemata de putredine animali et morbis putrid., ib., pag. 189, 382.

I. F. GRIMM, historia febris malignæ, quæ in urbe et agro isenacensi annis 1769, 1770 et 1771 epidemiæ grassata fuit; nova acta natur. curios., tom. III, in append., art. 4, pag. 145.

I. G. HOPMANN, de febre continua putrida;
Argent. 1771.

X. FAUKEN, das in wien im jahre 1771 und 1772, sehr viele menchen anfallende faulungs sieber? Wien 1772.

PH. A. BOEHMER, de notione malignitatis morbis adscriptæ; Halæ 1772.

F. MIGLIORI; trattato delle febre maligne e delle perniciose, etc.; Perugia 1772.

E. A. NICOLAI, de febribus malignis; Jena

I. CH. POHL, de febribus continuis putri= dis; Lipsiæ 1772.

W. FORDYCE, a new inquiry in to the causes, symptomes and cure of putrid and inflammatory fevers, etc.; Lond. 1773.

Tom. II.

- M. C. STAHLMANN, diss. sistens examen remediorum in febribus putridis adhiberi solitorum; Gotting. 1773.
- J. SIMS, observations on epidemic disorders with remarks on nervous and malignant fewers; Lond. 1773, en français 1779.
- A. F. Settagast, apitome historiæ febrium putridarum anno 1754 nascentium in 1773 perseverantium, genesis, etc.; Bonnæ 1774.
- T. Kirby, de febre putrida libellus, etc.; Lugd-Batav. 1774

FRIDSCH, de febri putrida in diocæsi Ripensi epidemice grassante ab anno 1770 ad 1774; soc. med. haun. collect.; Hauniæ 1775, vol. 11, pag. 213.

MARET, mémoire pour servir au traitement d'une sièvre épidémique, etc.; Dijon. 1775.

- J. PANZANI, raggionamento critico sull'uso interne degli agli nelle febre grave sull'ordinario trattamento delle putride e biliose afferzioni, etc.; Venezia 1775.
- W. J. N. LANGSVERT, historia medica morbi epidemici sive febris putridæ ann. 1771 et 1772; Pragæ 1775.
 - D. J. WEIRAUCH, de limitandis laudibus

vomitoriorum ad curandas febres malignas; Gryphisw 1775.

OVERCAMP, de febribus putridis; Halæ 1775.

FOURNIER, observat. sur les fièvres putrides et malignes, etc.; Dijon 1775.

- C. A. EICHELBERG, de causis phænomenorum quæ observantur in progressione morborum epidemicorum, lente progredientium, præsertim pestilentiæ hominum, etc.; Nymagen 1776.
- A. NIETZKY, diss. casum notabilem febris malignæ continens; Halæ 1776.
- J. ROGERS, de curatione febrium a contagione; Edinb. 1778.

BANG, tractatus de febre putrida; acta hauniensia, vol. 11, pag. 156.

- G. JEARNE, de typho; Edinb. 1778.
- C. DE MERTENS, observ. med. de febribus putridis, de peste, etc.; Vindob. 1778.
- H. OSTOICH, de duabus constitutionibus epidemicis dalmaticis; Vindob. 1778.
- J. B. (JEAN BANAU) observations sur les moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes, et à préserver de leur contagion; Amsterdam 1778, Paris 1785.

- P. J. VASTAPANI, de china china in synochis putridis; Taurini 1779.
- J. CLARK, de putredine in typho coercenda; Edinb. 1779.
- CH. L. MURSINNA, beobachtungen uber die ruhr, nebst einem anhange von den faulsiebern; Berlin 1780.
- J. CLARKE, observations on fever, etc.; Lond. 1780.
- W. E. RUDOLPH, de sanguinis missione in febribus putridis; Gotting. 1780.
- F. MILMAN, an inquiry in tho the source from whence the symptoms of the scurvy and of putrid fevers arise, etc.; Lond. 1782, en français, par M. VIGAROUS; Paris 1786.
- J. U. BILGUER, versuche und erfahrungen uber die faulsieber und ruhren, dem hausigen sterben bey den armeen, etc.; Berlin 1782.
- J. A. UNZER, einleitung zur allgemeinen pathologie der ansteckenden krankheiten; Leipzig 1782.

HEYNE, de febribus epidemicis Romæ falso in pestium censum relatis; Gotting. 1783.

- F. VACCA BERLINGHIERI, considerazioni intorno alle malattie dette volgarmente putride, etc.; Lucques 1783.
 - H. OWEN, de contagione; Edinburg. 1783;

et dissertat. medic. Edinburg., ann. 1783, n.º 6.

TH. WALLER, de typho; Edinb. 1783; et dissertat. medic. Edinburg., ann. 1783; n.º 10.

FERRIS, de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine; Edinburg. 1784; et coll. d'Edimbourg, tom. IV, pag. 480.

D. CAMPBELL, med. observ. on the thyphus, or low contagious fever and on the
means of preventing the production and communication of this disease; Lancaster 1785.

Th. W. Schroeder, historia febris biliosopituitoso-putridæ quæ mense decembri 1783, etc. epidemicè grassata est; Gotting. 1785.

- A. Th. Gemeiner, de verâ febrium putridarum notione; Erlang. 1786.
- J. J. VERNISCHEK, frage woher emstehen die vielen faulsieber, etc.; Vienne 1786.
- G. H. C. Mehlis, de excitantium usu in febribus potissimum putridis; Gotting. 1787.
- E. G. F. Baldinger, malignitas in morbis ex mente Hippocratis, per recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem illustrată; opuscomed. Gotting. 1787, art. 5, pag. 114.
- K. A. ZWIERLING; histoire d'une sièvre putride qui a régné, en 1784 et 1785, à Ham-

melbourg dans le pays de Fulde; vermischte medinische schriften, etc.; Heidelb. et Leips. 1788, art. 1.

VAN BAGEVEM, verhandeling over de rotkoorts en roodeloop, etc. (traité sur les fièvres putrides et la dyssenterie); Dendermonde et Amsterdam 1790.

G. FORDYCE, a letter to sir John Sinclair, concerning the virtues of the muriatic acid, etc.; Lond. 1790.

GATTENHOF, de febre epidemică putridă (de nature un peu bilieuse); coll. dissert. et program. Heibelberg., vol. 1; Hidelbergæ 1791, pag. 104.

F. SAALMAN, descriptio febrium malignarum in genere, etc.; Munster et Strasbourg 1791.

A. OLMI, de febribus synoco-putrido-biliosis quæ more epidemico in nosocomio florentino, annis 1791-92 grassatæ sunt, tractatus; Florence 1792.

A. B. DESAINS, dissert, sur les fièvres ataxique, sporadique et adynamique continue, (maligne et putride), etc.; Paris, an IX-1801.

Car. Pouls mou et fréquent; chaleur en apparence moyenne, mais affectant la main

d'une sorte de picottement; urine trouble; fétidité de l'haleine et des excrétions, et lésion progressive des fonctions mentales.

Rap. A. Hémorragie insalubre; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. I, esp. 5.

B. Tremblement typhode; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 19.

C. Tremblement tendineux, soubresauts des tendons; SAUV., ibid, esp. 10.

D. Trisme fébrile; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. II, esp. 10.

E. Carus fébrile; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXX, esp. 2.

S-esp. I. Fièvre putride.

Syn. Typhus modéré; Cullen, loc. cit., esp. 1, var. 1.

Peste de Siam; SAUV., cl. 111, ord. 1, gen. 1, esp. 8.

Rap. A. Fièvre maligne hectique; WILLIS, de morb. conv., cap. 8.

B. Fièvre pestilentielle; FRACASTOR, de morbis contag., lib. 11, cap. 4.

C. Fièvre pestilentielle sans venin; Forestus (Pierre Van Foreest), lib. vi, observat. 26.

D. Fièvre hectique pestilentielle (a); Fo-RESTUS, lib. VI, obs. 32.

E. Nouvelle sièvre de 1085; SYDENHAM, schedula monitoria, etc.

F. Fièvre putride nerveuse des années 1720-21; WINTRINGHAN; comment. nosolog.

G. Fièvre lente nerveuse; Huxham, on fevers chap. 8. — Edinb. medic. essays, vol. 11, art. 18; vol. 1v, art. 23; vol. v, art. 48.

H. Fièvre contagieuse; LIND, on fevers and infection.

I. Typhus nerveux; SAUV., loc. cit., esp. 2.

K. Typhus comateux; SAUV., loc. cit.,

L. Trytæophye typhode; Sauv., loc. cit., esp.

M. Fièvre putride épidémique en 1770 et 1774; FRIDSCH, soc. med. Haun. coll., vol. 11; Haun. 1775, art. 25, pag. 213.

S-esp, II. Fièvre maligne.

Syn. Typhus grave; Cullen, loc. cit., esp. 1, var. 11.

gastrique maligne, tom. 1, pag. 381.

Rap. A. Fièvre pestilentielle; Pierre Salius Diversus, de febre pestilent.

B. Fièvre pestilentielle des Égyptiens; Pros-PER ALPIN, de medic. Ægyption, lib. 1, cap. 14.

Typhus ægyptiacus; SAUV., loc. cit., esp. 6. Cephalitis épidémique de 1510; SAUV., cl. 111, ord. 111, gen. XIX, esp. 6.

C. Fièvre pestilentielle maligne; SENNERT, de febribus, lib. IV, cap. 10.

Fièvre maligne pestilentielle; RIVIERE, lib. XVII, sect. III, cap. 1.

Fièvre pestilentielle maligne de 1643; WIL-LIS, de febribus, cap. 14.

- D. Fièvre du Sénégal; London medical observat., obs. 11, 21.
- E. Fièvre putride bilieuse de 1769; DE MERTENS, loc. cit., cap. 11.
- F. Fièvre putride nerveuse de 1770; DE MERTENS, ib., cap. 111.
- G. Fièvre putride épidémique de Riga; FRIDSCH, soc. med. Haun. collectan., tom. 11., pag. 213.
- H. Fièvre putride de 1779 et 1780; CAL-LISEN, acta reg. soc. med. Haun., vol. 1, pag. 353.

I. Synoque très-putride de Bielitz en Silésie; N. RIGLER, constitutio epidemica annorum 1775 à 1779; Breslaw 1780.

Fièvre synoque atrabilieuse du Sénégal, en 1778; T. P. SCHOTTE, a treatise on the synochus atrabiliosa, etc; Lond. 1782; en français, Paris 1785.

Fièvres épidémiques de Novi, en 1783; P. CAPURRI, historia delle febri epidemiche che carsero nella cita di novi l'anno 1783; Milan 1786.

Epidémie de Grenoble en l'an VIII; TROUS-SET, histoire de la fièvre qui a régné épidémiquement à Grenoble, etc.; Grenoble, an VIII.

Fièvre putride maligne du département des Basses-Alpes; M. BOUTEILLE, mémoire sur l'épidémie régnante dans le département des Basses-Alpes; Marseille.

Var. A. Fièvre d'hôpital.

Voy. E. FOSTER, de nosocomiis; Edinb. 1767.

W. GRANT, essay on the pestilential fever of sydenham, commonly called the gool, hospital, ship, and camp fever; London 1775.

Fièvre putride contagieuse de 1742; HUXHAM, de aere et morbis epidemicis; édit. de REI-CHEL, tom. I, pag. 268.

Fièvre des prisons et des hôpitaux; PRINGLE, observat. on the diseases of the army, etc.; Lond. 1765, pag. 287. — ROBERT ROBERTSON, observations on the jail, hospital, or sip fever, etc.; Lond. 1783.

Fièvre d'hôpital de la campagne de 1792; Chamseru, journ. de méd. chir. et pharm., par M. Bacher, tom. 1, pag. 173.

Opinion de l'école de médecine de Montpellier, sur la nature.... de la fièvre observée dans les hôpitaux de cette commune, en l'an VIII.

Fièvre nosocomiale; CERA, de febri nosocomică; Mediol. 1789.

Miliaire pourprée; SAUV., cl. III, ord. I, gen. v, var. H.

Var. B. Fièvre de prison.

Voy. PRINGLE, observations on the nature and cure of hopital and jail fevers, 1750; et observat. on the diseases of the army, 1752.

I. HEISHAM, an account of the jail fever,

or typhus carcerum: as it appareat at carelisle in the year 1781; London 1782.

RUETTE, observations cliniques sur une maladie épidémique qui a régné cette année à l'hospice du nord; Paris an IX.

Fièvre continue affectant le cerveau, les nerfs et les humeurs avec douleur obtuse de la tête, tremblement des mains dès le commencement et nausées.

Typhus des prisons; SAUV., cl. 11, ord.

1, gen. IV, esp. 1.

Var. C. Fièvre de vaisseau.

Voy. La fièvre des vaisseaux pestilentielle en 1740; Huxham, oper. physic. med., édit. de Reichel, Lipsiæ 1773, tom. 1, pag. 240.

Relatio epidemiæ bilioso-nervoso-putridæ in classe regiā ac nosocomio nautico grassantis, etc.; Callisen, act. reg. societ. med. Haun., vol. 1, Hauniæ 1783, pag. 407.

Maladie épidémique qui a régné dans les vaisseaux, parmi les troupes de France à leur débarquement à Algesire; Thion de LA Chaume, journ. de médec., avril 1790, tom. LXXXIII, pag. 34.

G. RENWICK, an inquiry in to the nature and causes of sickness in ships of var, etc.; Lond. 1792.

Miliaire nautique; SAUV., cl. 111, ord. 1, gen. v, var G.

Var. D. Fièvre des camps.

Voy. H. MAI, de febre castrensi quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant; Rinth. 1691; et coll. de HALLER, tom. v, pag. 341.

M. ALBERTI, de morbo hungariæ hagimas, etc.; Halæ 1726; et coll. de HALLER, tom. v, pag. 361.

Juncker, de febre hungarica seu castrensi, consp. med.; Halæ 1734, tab. LXXIV, pag. 604.

J. CSAPO de febre hungarica; Basil. 1759.

Typhus des camps; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. IV, esp. 5.

Conf. J. Ch. J. Wolf., entwurf zur verminderung der lagersieber, etc.; Francs.-surle-Mein 1791.

Nota bene. Ces variétés constituent des maladies tellement identiques, que Burseri, inst. medic., tom. 1, pag. 380, n'a pas hésité de dire que le typhus nervosus, SAUV., esp. 2; la miliaris nautica, SAUV., esp. 9; la miliaris purpurata, SAUV., esp. 4; le typhus castrensis, SAUV., esp. 5; et le typhus ægyptiacus, SAUV., esp. 6, sont plutôt des synonymes que des variétés.

S-esp. III. Fièvre pétéchiale (a).

Bibl. G. PATON, de typho graviore peterchiali; Edinb. 1782.

Car. Aux symptômes propres à l'espèce se joignent, à la fin de la première période ou au commencement de la seconde, des taches de pourpre ou de miliaire.

Pourpre malin; SAUV., cl. 111, ord. 1, gen. VI, esp. 2.

Fièvre putride pétéchiale, par la puanteur des poissons salés et putréfiés; AASKOW, soc. med. haun. collect., vol. 11; Haun. 1775, art 8, pag. 82.

⁽a) Monro (diseases of military hospitals, pag. 1.) et Burseri (loc. cit.) ont avancé que la fièvre pétéchiale est la même que la nosocomiale; s'il y a de la différence, elle n'existe que dans le degré ou par les circonstances.

- Rap. A. Fièvre lenticulaire, puncticulaire ou péticulaire; FRACASTOR, de morb. contag., lib. 11, cap. 6.
- B. Fièvre péticulaire de Trente en 1591; ROBORET, de febre peticul.
- C. Fièvre pétéchiale épidémique de Cologne de 1672; Donckers, idea febris petechialis.
- D. Fièvre pétéchiale épidémique de Presbourg en 1683; C. F. LOEU, act. natur. curios., vol. II, in append.
- E. Fièvre pétéchiale épidémique de Modène en 1692; RAMAZZINI, constitut. mutin. oper., pag. 187.
- F. Fièvre maligne pétéchizante de 1698; HOFFMAN oper., tom. II, pag. 80.
- G. Fièvre pétéchiale de Breslaw en 1699; HELWICH ephem. german., dec. III, ann. VII et VIII, obs. 132, pag. 616.
- H. Fièvre épidémique de Leipsick en 1718; M. ADOLPH, act. natur. curios., vol. 111, obs. 131, pag. 296.
- I. Fièvre endémique et épidémique de Corck en 1708, 1718 et suiv.; ROGERS, essay on epidemie diseases.
- K. Fièvre continue épidémique de Corck en 1719; M. O. Connel, observ. de morbis.
 - L. Fièvre pétéchiale épidémique de Cre-

mone en 1734; VALCHARENGI, medic. rat. 5
sect. 111.

M. Fièvre pétéchizante de Petersbourg en 1735; WEITBRECHT, de febrili constitutione petechizante petropoli ann. 1735 grassante; Regiom. 1736; et coll. de HALLER, tom. V, pag. 395.

N. Fièvre pétéchiale de 1740, 1741, dans la Hesse; RITTER, act. natur. curios., vol. VII, obs. 4.

O. Fièvre pétéchiale épidémique de quelques endroits d'Angleterre; WALL's, works pag. 337.

P. Fièvre maligne pétéchiale de Rintel en 1741; FURSTENAU, act. natur. curios., vol. VII, obs. 5

Q. Fièvre maligne du camp français en Bohème; I. A. I. SCRINC, de febri maligna castrensi gallorum, etc.; Pragæ 1743; et coll. de HALLER, tom. v, pag. 385.

R. Fièvre de camp pétéchiale épidémique; BRANDHORST, historia febris castrensis petechialis epidemica; Leidæ 1746; et coll. de HALLER, tom. v, pag. 421:

S. Epidémie maligne de Breslaw; HAHN, journ. de méd., déc. 1757. — Tritæophye de Breslaw; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VII, esp. 3.

Fièvre

Fièvre putride maligne de la Chatellenie de Lille en Flandre, en 1758; BOUCHER, journ. de médec., tom. X, pag. 442 et 5236

T: Fièvre pétéchiale épidémique de Vienne, en 1757; HASENOEHRL, hist. med. morbi epidémici sivè febris petechialis, etc.; Vind. 1760.

U. Fièvre pétéchiale épidémique en Allemagne, pendant les années 1760 et suivantes; STRACK, obs. medicin. de morbo cum petechiis, etc.; Carolsruhæ 1766.

V. Fièvres malignes pétéchiales épidémiques de Stockolm; P. J. BERGIUS, kongl. vetens-kaps academiens handlingar, etc.; vol. XXVIII; Stock. 1767, trim. 4, art. 10, pag. 326.

X. Fièvre maligne pétéchiale de la Bourgogne, en 1761 et 1762; MARET, mém. dé l'acad. de Dijon; vol. 1, Dijon 1769, pag. 125.

Y. Fièvre pétéchiale épidémique de Leypsick; en 1757; Ludwig, advers. medic. pract.; Lips. 1770, tom. 1, pag. 21.

Z. Fièvre pétéchiale nerveuse de Dijon, en 1760-61; MARET, mém. pour servir au traitement d'une fièvre épidémique; Dijon 1775

AA. Fièvre maligne épidémique à Coutances, en 1772-73; BONTÉ, hist, et mém. de Tom. II. la soc. roy. de médec.; ann. 1776; Paris 1779, pag. 23 des mém.

Fièvre putride maligne pétéchiale épidémique et contagieuse, etc.; Robin de Keriavalle, hist. et mém. de la soc. roy. de méd., ann. 1778--79; Paris 1780, pag. 53 des mém.

Epidémie du cercle d'Iglaw, en 1771--72; J. B. M. SAGAR, historia morbi epidemici, etc.; Leips. 1780.

BB. Epidémie des troupes françaises après le siége de Gibraltar; Burel le jeune, journ. de médecine milit., tom. VII; Paris 1788, pag. 32.

Fièvre nerveuse pétéchiale de Schelestat, en 1790--91; COZE, journ. de medec., mai 1792, tom. XCI, pag. 3.

Epidémie de Jena, en 1791; Ph. I. HART-LAUB, dissert. med. sistens descriptionem constitutionis epidemicæ sub fine præteriti anni Jænæ grassatæ, etc.; Jena 1792.

Rose épidémique; HARMAND-MONTGARNY, précis médical et curatif de la rose épidémique qui règne dans le département de la Meuse; juin 1793.

S-esp. IV. Fièvre jaune.

Car. A la fin de la première période ou

au commencement de la seconde, les symptômes de l'espèce se compliquent de jaunisse.

Rap. A. Typhus ictéreux; SAUV., loc. cit. esp. 7.

- B. Fièvre jaune des Indes occidentales; WAREN, malignant fever of barbadoes. - J. Moultrie, de febre maligna biliosa America flavă; Edinb. 1749; et coll. de BALDINGER, tom. 1, pag. 163. - J. WILSON, de febre biliosa India occidentalis; etc.; Edinb. 1750. - HILLARY, observations on the changes of the dir and the concomitant epidemical diseases in the island of barbados; Lond. 1759, pag. 143. - LINNING; essays and observations, physical and litterari, etc.; vol. 11, art. 29, pag. 370. - J. MAKITTRICH, de febre Indiæ occidentalis malignā flavā; Edinb. 1766. -TH. M'. FARQUHAR, de typhi flavi symptomatis et causis; Edinb. 1777. - S. CURTIN, de febre flavá Indiæ occidentalis; Edinh. 1778. - Moseley, a treatise on tropical diseases, etc.; Lond. 1788;
- C. Fièvre jaune d'Espagne; HALLÉ, journ. de médec. de CORVISARD, etc., tom. 1, pag. 292, 305; et rec. périod. de la soc. de méd. de Paris, tom. IX, pag. 266. R. G. Sou-

Paris, tom. x, pag. 264.

S-esp. V. Fièvre suette.

Car. Une sueur générale domine parmi les symptômes de l'espèce.

Rap. A. Ephémère suette; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. 1, esp. 7.

B. Ephémère britannique; CAIUS, de ephemera britannica, liber unus; Lovanii, 1756.

Sueur anglaise; Sennert, lib. IV, cap. 15. Hydronose; Forestus, lib. VI, obs. 8.

S-esp. VI. Fièvre dyssenterique.

Bibl. C. Douglass, de dyssenteria putrida; Edinb. 1766.

B. CLIFTON, de dyssenteria epidemica; Edinb 1766.

I. F. GRIMM, historia dyssenteriæ malignæ annorum 1770--71, etc.; nova acta natur. curios., tom. III; Norimb. 1767, in append. art. 5, pag. 172.

A. WARDROP, de dyssenteria contagiosa; Edinb. 1775; et coll. de WEBSTER, t. 1, p. 476.

J. MILLAR, obs. sur les maladies qui règnent

en Angleterre; Lond. 1783, chap. VIII, de la dyssenterie.

Car. Des déjections tormineuses, sanguinolentes et putrides constituent le symptôme général de cette sous espèce.

Rap. A. Dyssenterie des camps; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. X, esp. 7.

Dyssenterie de la campagne de 1792; CHAM-SERU, journ. de méd. chir. et pharm., par BACHER, tom. 1, pag. 27.

Dyssenterie atrabilaire; SAUV., ib., esp. 5.

- B. Dyssenterie bilioso-contagieuse de Nimegue, en 1736; I. H. DEGNER, historia medic. de dyssenteria bilioso-contagiosa, etc. Traject. ad Rhen. 1738, 1754.
- C. Fièvre dyssenterique; L. GRUBER, de febre acutá epidemicá exanthematico-dyssente-ricá; Basil. 1747; et coll. de HALLER, tom. III, pag. 385.
- D. Dyssenterie épidémique; A. VATER, de dyssenteria epidémica, maxime contagiosa et maligna; Witteb. 1747; et coll. de HALLER, tom. III, pag. 399.
- E. Dyssenterie des Indes; A. E. BUCHNER, de singulari quadam Indorum orientalium dyssenteria, etc.; Halæ 1752; et coll. de HALLER, tom. III, pag. 421.

F. Dyssenterie autumnale de Newcastle; A. WILSON, an essay on the autumnal dyssentery; Lond, 1761,

Fièvre dyssenterique putride maligne; I. G. ZIMMERMAN, von der ruhr unter dem volke im Jahre 1765, etc.; Zurch 1767, pag. 10, 354, 359, 369.

- G. Dyssenterie épidémique de Tyrnaw; P. I. RODTSPERGERGER, de dyssenteria Tyrnaviensi, anno 1775 epidemica; Tyrnaw 1775.
- H. Dyssenterie de la province du Maine, en 1779; VETILLARD, histoire médicale des maladies dyssenteriques, etc.; Au Mans 1779.
- I. Epidémie dyssenterique de 1779; CAILLE, hist. et mém. de la soc. roy. de médec. de Paris, ann. 1779, pag. 32 des mém. Journ. de médec. milit., tom. 1V; Paris 1785, pag. 423.
- K. Dyssenterie autumnale du pays de Zell; TAUBE, dans neves magazin fur aerzte, etc., par E. G. BALDINGER, vol. 11, Leips. 1780, pag. 1.
- L. Maladie dyssenterique de Noyers, en 1779; MARET, journ. de méd., février 1780, tom, 1111, pag. 153.

- M. Epidémie dyssenterique de 1779; Du-RAND, hist. et mém. de la soc. roy. de méd. Paris, ann. 1780--81, pag. 84 des mém.—Roussel, recherches sur la petite vérole...... et sur la dyssenterie de 1779, etc.; Caen 1781.
- N. Epidémie dyssenterique; F. Geach, some observations on the present epidemic dyssentery; Lond. 1781.
- O. Dyssenterie des Indes; B. Moseley, observations on the dyssentery of the west Indies, etc.; Lond. 1781.
- P. Dyssenterie de Manheim, en 1778--79-80; F. H. BIRNSTIEL, de dyssenteriâ liber, etc.; Manhemii 1786.

S-esp. VII. Fièvre colliquative.

Car. Il y a une fonte générale d'humeurs qui s'échappent par les selles, avec amaigrissement rapide, et prostration absolue des forces.

Rap. A. Fièvre colliquative de Quesnay; traité des fièvres, tom. 11, pag. 371.

Fièvre colliquative primitive ou essentielle;

Burseri, institut. med. pract., vol. 1; Mg-diolani 1785, pag. 436.

S-esp. VIII. Peste.

Syn. Peste; Juncker, tab. LXXVIII.—
SAUVAGES, cl. III, phlegmasies; ord. I, exanthématiques; gen. I.— LINNÉ, cl. I, exanthématiques; ord. I, contagieuses; gen. II.
— Cullen, cl. I, pyrexies; ord. I, fièvres; ord. III, exanthèmes; gen. XXX.— SAGAR, cl. X, exanthèmes; ord. I, contagieux; gen. I.— Macbride, cl. I, universelles; ord. I, fièvres; gen. IV, fièvre exanthématique; esp. 8.— VITET, cl. I, fièvres; ord. III, exanthématiques; gen. V.

Fièvre pestilentielle; VOGEL, cl. I, fièvres; ord. II, continues; sect. I, simples; gen. XXXIII. — PINEL, cl. I, fièvres; ord. VI, adéno-méningées; gen. XV.

Bibl. ASTRUC, dissertation sur la contagion de la peste; Toulouse 1725.

CHICHOYNEAU, traité des causes, des accidens et de la cure de la peste; Paris 1744.

ST. WESPREM, de inoculanda peste; Pannon. 1755:

A. CHENOT, tractatus de peste; Vindob.

DE HAEN, de peste, etc.; rat. medend., pars XIV; Viennæ 1770, pag. 211.

W. Brownrigg, considerations on the means of preverting the communications of pestilential contagion, etc.; Lond. 1771.

B. THOMAS, de peste; Edinb. 1775; et coll. de Webster, tom. 1; Edimb. 1781, pag. 436,

Paris, mémoire sur la peste; Avignon, Marseille, Paris 1778.

C. DE MERTENS, observ. med. de febribus putridis, de peste, etc.; Vindobon. 1778.

SAMOILOWITZ, 1.º lettre sur les expériences des frictions glaciales pour la guérison de la peste; Paris 1781, Strasb. 1783. 2.º Mém. sur l'inoculation de la peste; Strasb. 1782. 3.º Lettre à l'académie de Dijon au sujet de l'inoculation de la peste; Paris 1783.

- P. J. FERRO, næhere, untersuchung der pestans teckung, etc. (considérations ultérieures sur la contagion de la peste); Vienne 1787.
- P. Von Vonsel, mémoire sur la peste; St-Pétersb. 1788.
- G. CH. REIL, de la fièvre en général, de la rage, de la fièvre jaune et de la peste,

etc.; Metz, an IX--1800. — Mémoire sur la peste, etc., Metz, an--IX--1801.

Car. Avec les symptômes de l'espèce, portés au plus haut degré de foiblesse et de stupeur, il y a des bubons, des charbons et des anthrax.

Rap. A. Peste benigne; SAUV., loc. cit., esp. 2.

- B. Peste vulgaire; SAUV., loc. cit., esp. 1.
- C. Peste interne; SAUV., loc. cit., esp. 3.
 - D. Peste d'Égypte; SAUV., loc. cit., esp. 11.
 - E. Peste de Siam; SAUV., loc. cit., esp. 8.
- F. Peste de Venise et de Padoue; MER-CURIALI, de pestilentià in universum, præsertim vero de Venetà et Patavinà; Venetiis 1577-1580; Leidæ 1623. — CAPIVACCIO, oper. medic.
- G. Peste de Milan; L. SETTALA (Septalius) de peste et pestiferis affectibus; Mediolani 1622.
- H. Peste de Nimegue; I. de DIEMERBROECK, de peste arenaci 1644; Amstelod. 1665.
- I. Peste de Marseille, en 1721; CHYCOI-NEAU, observat. et réfl. touchant la nature.... de la peste de Marseille; Lyon et Paris 1721. — ASTRUC, dissert. sur la peste de Provence; Montpell. 1722.

K. Peste du duché d'Holsace, W. U. WALD-SCHMIDT, de singularibus quibusdam pestis Holsaticæ; Kiliæ 1721; et coll. de HALLER, tom. V, pag. 547.

L. Peste de Bologne; L. A. MURATORI, del governo della peste; Brescia 1721.

M. Peste de l'Ukraine, en 1738--39; I. F. Screiberg, observationes et cogitata de pestilentià quæ ann. 1738--39 in Ukranià grassata est; edit. nov. petrop. 1750.

N. Peste de Constantinople; 1.º M. MAC-KENSIE, dans philosoph. transact., vol. XLVII, 1751-52--53, pag. 384, 514, art. 63, 87. -2.º D. SESTINI, della peste di Costantinopoli; Florence 1779.

O. Peste d'Alep, en 1760-61-62; A. Russell, the natural history of Aleppo, etc.; Lond. 1756; et a treatise of the plague, etc.; Lond. 1791. — Th. Dawes, dans philosophical transact., etc.; vol. LIII, Lond. 1764, art. 12, pag. 39.

P. Peste d'Orient; berlinische sammlungen, vol. VII; Berlin 1775, pag. 118.

Q. Peste des Russes et des Turcs; KLINT, dans neves magazin for aertze; vol. 1; Leips. 1779, pag. 193.

R. Peste de la Syrie; l'abbé MARITI, voya-

ges dans l'île de Chypre, la Syrie et la Palestine, tom. 1.

S. Peste de Moscou, en 1771; 1.º Samoi-Lowitz, mémoire sur la peste qui, en 1771, ravagea l'empire de Russie et Moscou, etc.; Paris, Moscou 1783. — 2.º De Mertens, traité de la peste, contenant l'histoire de celle qui a régné à Moscou en 1771; Vienne et Strasb. 1784.

T. Peste de Spalatro; P. PINELLI, giornale per servire alla storia ragionata della medicina di quæsto secolo, tom. III; Venet, 1786, art. 20, pag. 215.

U. Peste de la Dalmatie, en 1783--84; J. BAJAMONTI, storia della peste che regno in Dalmatia, etc.; Venise 1786.

V. Peste de la Transylvanie, en 1786; M. LANGE, rudimenta doctrinæ de peste; Vienn. 1784, Offenbach 1791.

X. Peste des armées russes, depuis 1769 jusqu'en 1774; J. M. Moderer, abermal ein beytrag zur kentniss und keilund der pest, etc.; Riga 1790. — Comment. de peste, etc.; Jena 1791.

Formes.

Sor. 1. Syncope vénénique (occasionnée par

- les vapeurs putrides d'hôpital, etc.); SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 10.
- vapeurs putrides; MORAND, hist. de l'acad, roy. des sciences, ann. 1766, pag. 315 des mémoires.
- 3. Fièvre avec charbon; LEROY, mém. sur les fièvr. aig., pag. 32.
- 4. Fièvre inflammatoire putride; maladie putride débutant par l'inflammation ou masquée sous les apparences de l'inflammation.
- Voy. J. A. GLYCKERR, de febre inflammatorià mesenterio-intestinali; Argent. 1757.
 - 5. Angine putride maligne.
- A. Squinancie maligne; SAUV., cl. III, ord.

e , 1

- B. Squinancie purpuro-parotidée; SAUV., ibid, esp. 15.
- C. Amphimérine angineuse; SAUV., cl. 11, ord. 11, gen. VI, esp. 14.
 - D. Squinancie ulcéreuse; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XX, esp. 3, var. A.
- E. Squinancie gangreneuse; SAUV., ibid, var. B.
 - Voy. J. Johnstons, de angina maligna; Edinb. 1773.

I. TAYLOUR, de cynanche gangrenosa; Edinbe

grenosa epidemica e contagiosa; Turin 1777.

- J. JOHNSTONE, a treatise on the malignant angina or putrid and ulcerous, etc.; Lond. 1779.
- J. DANIEL, de cynanche typho; Edinburg.
 - 6. Pneumonie putride maligne.
- A. Péripneumonie putride; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XXII, esp. 2.
- B. Péripneumonie maligne; Sauv., ibid, esp. 4.
- C. Pleuro-péripneumonie érysipélateuse maligne à Eplechin dans le Tournesis; Planchon, journ. de médec., juillet 1776, tom. XLVI, pag. 24.
 - D. Pleurésie pestilentielle; SAUV., cl. 111, ord. 11, gen. XIII, esp. 16.

Voy. G. A. JAQUES, an peripneumoniæ putridæ vomitoria? Paris 1752.

A. E. Buchner, de peripneumonia notha; Halæ 1757.

BOUILLET, mém. sur les pleuro-pneumonies épidémiques, etc.; Beziers 1759

- G. Fr. SIGWART, historia pneumonitidis malignæ; Tubing. 1763.
- I. TYMKOWSKI, de peripneumonia notha; 1765.
 - 7. Variole putride, maligne.
- A. Variole confluente cohérente; Sauv., cl. III, ord. I, gen. II, esp. II.
- B. Variole confluente à placards; SAUV., ibid, esp. 13. Variole confluente maligne, 4. espèce d'HELVETIUS.
 - C. Variole confluente noire; SAUV., ibid, esp. 12. Variole confluente maligne, 3.° espèce d'Helvelius. Variole sanguine de MEAD. Varioles sanguinolentes; G. Lund, kongl. vetenskaps academiens handlingar, etc. vol. XXXI; Stockh. 1770, pag. 29, art. 5.

Hémoptysie varioleuse; Sauv., cl. ix, ord. 1, gen. 11, esp. 7.

Hématurie exanthémateuse; Sauv., cl. 1x, ord. 1, gen. v, esp. 6.

- D. Variole confluente crystalline; SAUV., ib., esp. 10. Variole japonaise de Wepfer. Vésicules de la déesse Barbara. Variole confluente maligne, espèce 2 d'HELVETIUS.
- E. Variole discrète vésiculaire; SAUV., ib., esp. 5. Variole discrète crystalline de MEAD.

F. Variole discrète siliqueuse; SAUV., ib., esp. 7.

G. Variole discrète miliaire; SAUV., ibid, esp. 8.

H. Variole discrète verruqueuse; SAUV., ib., esp. 6.

8. Fièvre érysipélateuse.

Voy. Ph. G. Schroeder, de febribus erysipelatosis; Gotting. 1771; et opusc. medica tom. 1, pag. 175.

Voglers, handbung der practischen arzneywissenschafft, etc.; Stendal 1788, chap. XI.

9. Pleurésie putride maligne.

Pleurésie pestilentielle; SAUV., cl. III, ord. II, gen. XIII, esp. 16.

Voy. A. E. BUCHNER, de pleuritide spuria; Halæ 1760.

10. Catarre putride malin; sièvre catarrale putride maligne.

Phrénesie synoco-pleurétique; SAUV., cl. III, ord. II, gen. XI, esp. 2.

Fièvre catarrale maligne de la Franconie;
HIRSCHING, franckische sammlungen, etc.;
Nurnberg 1759, vol. 1v, art. 7, pag. 177.
Fièvre

Fièvre catarrale putride de 1768; De Mere Tens, obs. med. de febr. putrid., de peste, etc., cap. 1. — Burseri, tom. 1, pag. 341; rapporte cette maladie à la gastrique maligne compliquée de catarre. — M. U. Willich; de frequenti catarrhorum ex primis viis origine; Gotting. 1776.

Voy. H. P. Juch, de febre catarrhali epidemica, etc.; Erford 1743; et coll. de HAL-LER, tom. v, pag. 295.

J. TH. ELLER, obs. de cognosc. et curande morb.; Regiom. et Lips. 1762, cap. de castarrhali maligna.

PH. A. BOEHMER, de febre catarrhali maligna epidemica, angina gangrænosa stipata; Halæ 1768.

11. Fièvre scarlatine putride maligne.

Synoque puttide ou fièvre continente avec exanthèmes; Forestus, de feb. ephem., lib, 1, obs. XVII.

Scarlatine angineuse; SAUV., cl. 111, ord.

1, gen. VIII, esp. 6.

Scarlatine squinancique; Cullen, cl. 13 ord. III, gen. XXIX, esp. II.

Voy. G. F. H. BRUNICH, constitutio epidemica essendiensis anni 1769--70 sistens his= Tom. II. toriam febris scarlatino-miliaris anginosæ 3 Wesel et Leips. 1771.

J. M. LUTHER, de scarlatina maligna; Erford 1777.

12. Rougeole putride, maligne.

Rougeole anomale; SAUV., cl. III, ord. I, gen. IV, esp. 2.

Rougeoles putrides de Londres en 1763 et 1768; G. WATSON, medical observations and inquiries, etc., vol. IV; Lond. 1771, art. 11, pag. 132.

Voy. A. MATTHIEU, diss. sistens febris malignæ morbillosæ anno 1766-67; in inferiore Alsatia epidemicæ historiam; Argentorati 1768.

Aphte malin; SAUV., cl. III, ord. I, gen. x, esp. 3.

14. Fièvre phlycténique.

Pemphigue des camps; Sauv., cl. III, ord. 1, gen. III, esp. 2.

Pemphigue helvétien; Sauv., ib., esp. 3.

Morta; LINNÉ, cl. 1, gen. 1. Phlyctènes répandues en petit nombre sur le bas-ventre ou sur lès extrémités, de la grosseur d'une aveline, avec une sièvre éphémère très-maligne; très-suneste.

Fièvre bulleuse (bullosa); Vogel, cl. 1; ord. 11, sect. 11, gen. XLI.

Voy. Fièvre pemphygode; ephem. german. dec. 1, an. VIII, obs. 59.

Fièvre synèche avec des vésicules sur la poitrine et sur le cou; MORTON, append. ad exercit. 11.

Fièvre vésicatoriée; MACBRIDE, a methodical introduct., etc., cl. 1, gen. IV, esp. 7. Pemphigue indien; SAUV., loc. cit., esp. 4.

15. Gangrène du nez emphysématique; I. D. Busch, neves magazin furt aerzte, etc., zenhter band; Leips. 1788, pag. 230. Cette gangrène fut l'effet de la matière putride provenant d'un animal mort d'une angine suppurée.

Esp. IV. Stuporèsme (lipothymique) par l'action d'un venin (a) introduit dans le corps par la morsure ou par la piqure d'un animal.

Syn. Morsure des serpens; PINEL, classe non déterminée, gen. LXXXIV.

⁽a) On peut distinguer le venin d'avec le poison

Bibl. D. BROGIANI, de veneno animantium naturali et acquisito tractatus; Florenz. 1752.

J. L. AMOREUX, de noxá animalium; Avenione 1762.

LINNÉ, morsura serpentum; Upsal. 1762; amæn. academ., tom. v1, 1764, pag. 197.

Morsure des serpens; C. F. HOFFTER, kongle swenska vetenskaps academiens handlingar, etc., vol. XXIX; Stock. 1778, trim. 11, art. 1, pag. 85.

Car. Le pouls se déprime; il survient quelquefois des enflures considérables avec soif, des foiblesses, une difficulté de respirer, des sueurs froides et abondantes; la mort.

S-esp. I. (Crotalique) par la morsure d'un serpent du genre des crotales.

proprement dit, en ce que le premier n'agit que lorsqu'il est mêlé avec le sang par une plaie quelconque; au lieu que le poison ne peut nuire que lorsqu'il est avalé et qu'il s'est répandu dans les organes de la digestion. Enfin il y a une troisième et dernière sorte de substances mal-faisantes, qu'on peut nommer poisons vénimeux: telles sont toutes celles qui nuisent également lorsqu'elles sont appliquées sur la peau, ou avatées, ou mêlées avec le sang. Hist. natur. des reptiles; par Daudin, tom. 1, pag. 131. Crotale; LATREILLE, méthode d'herpétologie; 1801, divis. II, gen. XIX. Dessous du corps et de la queue, garnis d'une suite de plaques et de bandes transversales; des crochets à venin; queue renfermée à son extrémité dans une ou plusieurs pièces d'une consistance écailleuse, mobiles et bruyantes.

- A. Morsure du boiquira, mortelle en cinq minutes; l'abbé BONNATERRE, tableau méthodique et encyclopédique des trois règnes de la nature; ophiologie; Paris 1790, esp. 2.
- B. Du dryinas, mortelle en un ou deux jours; l'abbé Bonnaterre, ib., esp. 3.
- C. Du millet; très-dangereuse, mais pas toujours mortelle à cause de la petitesse du serpent; l'abbé BONNATERRE, ib., esp. 1.
 - S-esp. II. (Scytalique) par la morsure d'un serpent du genre des scytales.

Scytale; LATREILLE, ib., gen. XVIII. Dessous du corps et de la queue garnis d'une suite de plaques ou de bandes traversales; des crochets à venin; queue nue.

A. Morsure du piscivore; seulement dangereuse; l'abbé Bonnaterre, ib., esp. 5. S-esp. III. (Couleuvrique) par la morsure d'un serpent du genre des couleuvres.

Couleuvre; LATREILLE, ib., gen. XXII. Dessous du corps garni de plaques ou d'une suite
de pièces transversales; dessous de la queue
en ayant des rangées de petites': tête petite sans
cou distinct, presque toujours couverte en dessus
de petites plaques ou d'écailles beaucoup plus
grandes que celles du dos, et au nombre de
neuf: écaille verticale et antérieure de l'extrémité de la mâchoire supérieure, plus large
que haute, presque demi-circulaire: point de
crochets à venin ou de dents tubulées percées
d'un ou de deux trous, plus grandes que les
dents ordinaires, et renfermées dans une capsule à la branche extérieure de la mâchoire
supérieure; dents égales ou presque égales.

- A. Morsure du serpent poison, mortelle en moins de deux minutes; l'abbé Bonnaterre, ib., esp, 170.
- B. Du bæten; produit une enslure considérable, et donne la mort à l'instant; l'abbé Bon-NATERRE, ib., esp. 174.
- C. De l'ammodyte; mortelle en trois heures; l'abbé Bonnaterre, ib., esp. 151.

D. Du serpent à lunettes; mortelle dans l'espace de quelques heures; l'abbé Bonna-Terre, ib., esp. 46.

E. Du chersée; mortelle et sans antidote; l'abbé Bonnaterre, ib., esp. 81.

A. De l'aspic; l'abbé Bonnaterre, ib., esp. 71.

F. Du lebetin; mortelle avec un sommeil léthargique; l'abbé BONNATERRE, ib., esp. 101.

Esp. V. Stuporisme (narcotique) par l'action de quelque poison végétal.

Syn. Narcotisme; PINEL, cl. IV, névroses; ord. IV, affections soporeuses; gen. XLII.

Bibl. G. RICHTER, assuetudo venena ferendi, etc.; Gotting. 1744; et opusc. med., tom. III, pag. 118.

Sproegel, experimenta circa venena in vivis animalibus; Gotting. 1753; coll. de Haller, tom. VI, pag. 543.

Rossi, de nonnullis plantis quæ pro veneratis habentur; Pisis 1762.

I. I. PICCARD, de venenis et antidotis 1764.

G. F. Sigwart, venenorum discrimina summatim excussa; Tubing. 1765.

- PH. F. GMELIN, de materia toxicorum hominis vegetabilium simplicium in medicamentum convertenda; Tubing. 1765.
- I. R. SPIELMANN, de vegetabilibus venenatis alsatiæ; Argent. 1766.
- G. 1. GRAETER, diss. tradens doctriname de venenis in genere; Argent. 1767.
- J. F. ISENFLAMM, de remediis suspectis et venenatis; Erlang. 1767.
- J. B. FISCHER, assertiones de venenis; Pragæ 1768.
- G. A. LANGGUTH, de plantarum venenatarum arcendo scelere; Viteb. 1770.
- C, DRAYTON, de venenis; Edinb. 1770. LUTHER, diss, de venenis eorumque differentià et actione; Erford 1773.
 - G. HERVEY, de venenis; Edinb. 1774.

PRESTWICH'S, dissertation on mineral animal, and vegetable poisons, containing a description of poisons in general, etc.; London 1775.

J. F. GMELINS, der arzneyk dokt, etc., abhandlung von den giftigen gervachsen, etc. Ulm. 1775. Plantes vénéneuses de l'Allemagne et de la Suède.

VICAT, histoire des plantes vénéneuses de la Suisse; Yverdun 1776.

- I. F. GMELINS, allgemeine geschichte der gifte; 1 theil, Leipsig. 1776. Histoire générale des poisons,
- I. F. GMELINS, allgemeine geschishte der pflanzengifte; Nurnberg 1777. Histoire universelle des poisons végétaux.

Bulliard, plantes vénéneuses et suspectes de la France; 1779 et suiv.

B. WILMER, observations on the poisons vegetables, etc.; Lond. 1781.

LOGAN, de venenis; Edinb.; et coll. de Webster, tom. III, Edinb. 1781, art. 9, pag. 214.

EHRMANN, de veneficio doloso; Argentor. 1781. — De veneficio culposo; Argentor. 1782; et coll. de Schlegel, tom. 111, pag. 99, 188.

BERGERET, phytonomatotechnie universelle, etc.; Paris 1782.

BRUGMANS, de plantis venenatis, etc.; Groning. 1783.

HALLE, die deutschen gisipflanzen, etc.; Berlin 1784. Plantes vénéneuses de l'Allemagne.

TH. HOULSTON, observations on poison, etc.; Lond. 1784.

J. J. PLENCK, toxicologia seu de venenis et antidotis; Viennæ 1785. Puinn, materia venenaria regni vegețabilis; Lips. 1785.

Schulze, toxicologia veterum plantas venenatas exhibens, etc.; Halæ 1788.

DOELTZ, neve versuche und erfahrungen uber einige pflanzengiste, etc.; Nurnberg 1792, Essais et expériences sur quelques poisons du règne végétal.

J. H. HEINZE, de veneni effectu; Erlang.

Car. Langueur ou stupeur souvent spasmodico-convulsive, quelquefois avec délire, vertiges, altération profonde des humeurs; dégénérant en accablement, profond assoupissement et apoplexie mortelle, ordinairement sans douleurs ni inflammation vive.

§. I.er Produits simples.

S-esp. I. Par des plantes tirées de la Diandrie; cl. II, LIN.

A. Poivre à large feuille, piper latifolium; LIN., racine.

Éruption des taches, tantôt rouges, tantôt d'un vert jaune, donnant quelquefois lieu à des ulcères qui serpentent sous la peau, de

viennent fongueux et ichoreux; Puihn, loc. cit., gen, 2, pag. 21.

S-esp. II. Par des plantes de la Triandrie; cl. III, LIN.

- A. Safran, crocus sativus; Lin., stigmates. Assoupissement, ris sordonique, délire; Puihn, ib,, gen. 4, pag. 23.
- B. Ivraie, lolium tumulentum; LIN., graines. Assoupissement phantasmique, difficulté d'avaler et de parler; paralysie; Puihn, gen. 10, pag. 28.
- C. Seigle, secale cereale; LIN., excroissance morbifique connue sous le nom d'ergot. Convulsions, spasmes, émoussement des

Convulsions, spasmes, émoussement des sens, paralysie ou nécrose.

A. Raphanie (contraction spastique des articulations avec agitation convulsive, douleur extrême, périodique); LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. II, agitatoires, gen. CXLV.—

CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; sect. I, dans les fonctions animales; gen. LII.— Heuvell, part. III, sect. II, ord. II, gen. III, esp. 3, pag. 92.— Puihn, gen. II, esp. 29.

Voy. LINNÉ, raphania; Upsal. 1763; et amænit. academ., tom. v1, diss. 123, pag. 430. — A. M. Wahlin, kongl. vetenskaps academiens hadlingar for aar, 1771, vol. XXXII, trim. 1, art. 2, pag. 14, et trim. 11, art. 6, pag. 153. — Marcard, medicinische versuche, etc.; Leipsic 1780. — M. Ryaw de raphania; Edinb. 1784, et dissert. medic. Edinburgenses, 1784, n.º 9.

Kriebel krankeit, voy. J. G. Leidenfrost, de morbo convulsivo epidemico, germanorum caritatis annonæ comite, vulgo die kriebel krankheit; Duisburg. 1771. — Taube, geschichte der kriebel krankheit, etc.; Gotting. 1782.

Maladie varene; voy. CRAMER, diss. sistens casum morbi vareni, etc.; Duisbourg 1782.

- B. Eclampsie typhode; Sauv., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. I.
- c. Convulsion ergotique; SAUV., cl. IV, ord. 111, gen. XIII, esp. 13.
 - D. Convulsion suédoise; SAUV., ib., esp. 7.
- E. Rhumatisme nécrosique; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. III, esp. 14.
- F. Nécrose ergotique; SAUV., cl. x, ord. VII, gen. XLI, esp. I.

Mal des ardens; MEZERAI, hist. de France, ann. 1090.

S-esp. III. Par des plantes de la Tétrandrie; cl. IV, LIN.

A. Hypecoum procumbens; LIN., suc jaunâtre et opiforme.

Des effets analogues à ceux de l'opium; Puihn, gen. 15, pag. 31.

S-esp. IV. Par des plantes de la Pentrandrie; cl. v, LIN.

A. Spigelia, 1.º anthelmia, 2.º marylan-dica; Lin., plante.

Assoupissement, fixité des yeux, scintillation et dilatation de la pupille.

B. Azalea pontica; LIN., fleur.

Nausée, vertige, céphalalgie, stupeur; Puihn, gen. 21, pag. 35.

C. Chèvre-feuille vulgaire, lonicera caprifolium; LIN., ses feuilles et ses sommités.

Engourdissement, stupeur, état catalepsiforme; Chaussier, flore de Bourgogne; Dijon 1782.

D. Datura, 1.º ferox, 2.º strammonium, 3.º metel; Lin.

Sécheresse de la bouche et du gozier, obscurcissement de la vue avec dilatation de la pupille; abolition de la mémoire; Puihn, gen. 30, pag. 38. — A. SWAINE, essays and observations, physical and litterary, etc., vol. II; Edimb. 1756, art. 11, pag. 247.

A. Démence daturique; SAUV., cl. VIII, ord. 111, gen. XVIII, esp. 3.

B. Délire daturique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 2. — Magique; SAUV., ib., esp. 5.

c. Manie daturique; SAUV., cl. VIII, ord.

D. Amaurose narcotique; Sauv., cl. v1, ord. 1, gen. IV, esp. 12.

E. Mutite narcotique; SAUV., cl. VI, ord.
HII, gen. XIV, esp. 3.

F. Dysphagie daturique; SAUV., cl. VII, ord. III, gen XVII, esp. II.

E. Jusquiame, hyosciamus, 1.º noire, 2.º blanche, 3.º physaloide; Lin., toute la plante.

Délire querelleur, vue microscopique, sommeil quelquefois suivi d'éruptions gangreneuses aux cuisses et aux jambes; Puihn, gen. 33, pag. 41.— A. PITCARN, essays observations physical and litterary, etc., vol. 11; Edimb.

1756, art. 10, pag. 143. — Costa, journ. de méd., janvier 1769, tom. XXX, pag. 134.

A. Vertige vénénique; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. I, esp. 6.

B. Délire jusquiamique; SAUV., cl. VIII, ord. 111, gen. XVII, esp. 13. — Temulent, SAUV. ib., esp. 1.

c. Dysphagie siccative; SAUV., cl. VII, ord. 111, gen. XVII, esp. 18.

F. Tabac, nicotiana, 1.º tabacum, 2.º fructicosa, 3.º rustica, 4.º paniculata, 5.º glutinosa; LIN.

Etourdissement vertigineux, ivresse, affoiblissement de la mémoire; Puihn, gen. 38, pag. 43.

A. Hématemèse vénénique; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. IV, esp. 14.

B. Dyspepsie nicotianique; TRILLER, de tabaci ptarmici abusu; opusc. medic., tom. 1, pag. 220.

c. Dysphagie sèche, difficulté d'avaler causée par la sécheresse du gozier à l'occasion de la fumée du tabac; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 18.

G. Atropa, 1.º mandragora, 2.º belladona; LIN., leur racine et leurs baies. Stupéfaction vertigineuse, sécheresse de la gorge, dilatation de la pupille, gangrène universelle; Puihn, gen. 43, pag. 45.

A. Délire belladonique; Ch. Fr. S. GIRAUDY, le délire causé par la belladone a-t-il un caractère qui lui soit propre? Paris an x.

B. Manie belladonique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 5.

c. Convulsions belladoniques; acad. des sc. ann. 1703, art. botan. hist.

D. Dysphagie par sécheresse; SAUV., cl. vii, ord. 111, gen. XVII, esp. 18.

H. Physalis somnifera; LIN., racine et baies. Les effets de l'opium avec moins d'activité; Puihn, gen. 45, pag. 47.

I. Solanum, 1.º dulcamara, 2.º nigrum, 3.º mammosum, 4.º sodomeum, 5.º fœtidum; Lin., racine, baies et suc épaissi.

Étourdissement, vertige, délire, évacuations; Puihn, gen. 46, pag. 47.

K. Noix vomique, strychnos nux vomica; Lin., racine, écorce, feuilles et sur-tout fruit avec les graines.

Ivresse, angoisses, langueur subite, évacuations violentes; Puihn, gen. 52, pag. 50.

L. Fêve

L. Fêve de St-Ignace; ignatia amara; Lin.; baies.

Vertiges avec tremblement universel, défaillances, mouvemens convulsifs, sueurs froides, sentiment prurigineux ou de fournillement surtout à la tête; Puihn, gen. 54, pag. 52.

M. Cestrum, 1.º nocturnum; 2.º venenas tum, 3.º vespertinum; LIN., baies.

Extrêmement vénéneux; Puihn, gen. 55; pag. 52:

N. Cerbera, 1.º ahouai, 2.º manghas, 3.º thewetia; Lin., suc laiteux du tronc et des feuilles.

Extrêmement vénéneux; Puihn, gen. 61; pag. 54.

O. Chenopodium hybridum; Lin., feuilles. Vertige, trouble de la vue, foiblesse du pouls, relâchement de la pupille, lividité de la peau, des lèvres, de la langue, des ongles, ictère; Puihn, gen. 74, pag. 60.

P. Grande ciguë, conium maculatum; LIN., la plante, sur-tout fraîche.

Vomissemens, cardialgie, étourdissemens, perte de la vue, délire mortel; Puihn, gen. 76, pag. 61.

Tom. II.

Délire cicutique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 4.

Q. Angélique atro-purpurine, angelica atropurpurea; LIN.

Effets d'un poison indomptable; Puihn, gen. 77, gag. 63.

R. Sium latifolium; LIN., l'herbe.

Céphalalgie vertigineuse, délire, insensibilité; funeste sur-tout aux épileptiques; Puihn; gen. 78, pag. 64.

S. Enanthe, 1.º cenanthe aquatique, cenanthe fistulosa; Lin.; 2.º cenanthe safranée, cenanthe crocata; Lin.; 3.º phellandrium aquaticum; Lin., plante et sur-tout racine.

Langueur, évacuations, convulsions, lipothymie, chûte des cheveux et des ongles, rinorragie et mort; Puihn, gen. 79--81, pag. 64--65.

A. Syncope convulsive mortelle; VACHER, acta helvetica, vol. IV, art. II, pag. 69.

B. Eclampsie cenanthique; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 17.

c. Eclampsie phellandrique; SAUV. ib. esp. 18.

D. Convulsions mortelles après une extrême foiblesse des jambes et une cholerée; W. VAT-

son, philosophical transactions, vol. £, parts
11; Lond. 1759, art. 114, pag. 856.

T. Cicutaire aquatique, cicuta virosa; Lina la plante.

Voy. WEPFER, cicutæ aquaticæ historia et noxæ; Basil. 1679, 1716.

Ivresse, vertige, pente au sommeil, carus, stupeur, anxiétés, coliques dégénérant en inflammation, convulsions, pétéchies, sécheresse de la gorge; et après la mort, lividité affreuse, gonflement énorme du corps; Puihn, gen. 82, pag. 66.

Mort très-prompte, acad. des sciences, ann. 1715, art. botan.

U. Petite ciguë, œthusa cinapium; LIN., herbe et racine.

Voy. Buchhave, æthusæ cynapii in corpore humano effectus nocivus; acta hauniensia, tom. 1, pag. 51.

Effets analogues à ceux de la cicutaire aquatique; Puihn, gen. 84, pag. 67.

V. Coriandrium, r.º sativum, 2.º testiculatum; Lin., l'herbe fraîche.

Amblyopie, enrouement, stupeur, assoupissement; Puihn, gen. 85, pag. 68. X. Chærophyllum, 1.° temulentum, 2.° sylvestre, 3.° bulbosum; Lin., racine, plante et même semences.

Délire, étranglement, vertige; Puihn, gen. 87, pag. 68.

S-esp. V. Par des plantes de l'hexandrie; cl. VII, LIN.

A. Fritillaria imperialis; LIN., toute la plante.

Effets analogues à ceux de la grande ciguë; Puihn, gen. 101, pag. 77.

B. Gloriosa superba; LIN., racine.

La mort, même en petite quantité; Puihn, gen. 102, gag. 78.

S-esp. VI. Par des plantes de l'octandrie; cl. VIII, LIN.

A. Paris quadrifolia; Lin., plante et baies. Sécheresse à l'arrière bouche, anxiétés, vomissemens, sommeil; démonstr. élém. de botan., tom. 11, gen. 214; pag. 316.

S-esp. VII. Par des plantes de la décandrie; cl. X, LIN.

A. Ledum palustre; LIN.

Violente céphalalgie, vertige, narcose; et à forte dose peut être la mort; Puihn, geni 125, pag. 92.

B. Rhododendrum, 1.º ferrugineum, 2.º chrysanthum, 3.º ponticum; Lin., feuilles.

Vertige; ivresse, stupeur, ardeur et constriction de l'œsophage; foiblesse et froid des extrémités; Puihn, gen. 126, pag. 92.

S-esp. VIII. Par des plantes de l'icosandrie; cl. XII, LIN.

A. Laurier-cerise, prunus lauro-cerasus; Lin., eau distillée.

Vertige, douleurs des membres, irritabilité tantôt augmentée, tantôt diminuée, dissolution du sang, la mort; Puihn, gen. 152, pag. 104. — A. VATER, de lauro-cerasi indole venenata; Viteberg. 1737. — Penchienati, acad. des scienc. de Turin, ann. 1786 et 1787; Turin 1788, art. VIII, pag. 108. — Fontana, traité du venin de la vipère, tom. II, pag. 125, 137.

- B. Pêcher, amygdalus persica; Lin., eau distillée des noyaux.
 - C. Amandier, amygdalus communis; LIN.,

eau distillée des amandes amères; DARIES, epistola gratulatoria, de amygdalis et oleo amararum æthereo; Leips. 1776.

Convulsions, vomissement, étourdissement; Pièvre, bibliothèque germanique, tom. 1, pag. 107,

S-esp. IX. Par des plantes de la poliandrie; cl. XIII, LIN.

A. Actæa spicata; LIN., herbe, racine, semences.

Délire, mort, etc.; Puihn, gen. 154, pag. 205.

B. Pavot, papaver somniferum; LIN, extrait connu sous le nom d'opium.

Voy. WEDEL, opiologia; Jenæ 1674.
Younc, treatise an opium, etc.; London
1753.

TRALLES, usus opii salutaris et noxius; Breslaw 1757.

GARTSHORL, de papaveris usu tam noxio, etc.; Edinb. 1764.

BARD, de viribus opii; Edinb. 1765.

LINNÉ, opium; Upsal. 1775; et amænit. academ., tom. VIII, diss. CLXVIII, pag. 289.

WIRTENSOHN, dissertat, opium vires fibra-

rum cordis debilitari, etc.; Harderovici 1775; et HOFFMANNI opusc. latin., etc.; édit. de CHAVET, monast. Westph. 1789, art. X, pag. 205.

Bassiani Carminati, de animalium ex mephitibus, etc.; Laudepompeia 1777, lib. 111.

LEIGH, an experimental inquiry in to the properties of opium, etc.; London 1786.

De l'opium et de la manière d'agir chez les orientaux; gazette salutaire, ann. 1786, n.º XXXVIII.

Siebold, de effectibus opii in corpus animale, maxime respectu habito ad ejus analogiam cum vino, etc.; Gotting. 1790.

Gaité, délire, salacité, fureur, vertige, dissolution du sang, apoplexie mortelle.

Ou langueur, tristesse, sommeil paisible et agréable ou phantasmique, abolition des sens, sueur prurigineuse, carus mortel; Puihn, gen. 157, pag. 106.

- A. Démonomanie indienne; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XXI, esp. 7.
- B. Délire opiique; SAUV., cl. VIII, ord. 111, gen. XVII, esp. 3.

Délire mortel, acad. des sciences, ann. 1735, obs. de physique générale.

v, gen. XXX, esp. 14.

Léthargie narcotique; Sauv., cl. v, ord. v, gen. xxvIII, esp. 3.

C. Myristica fatua; LIN., fruit. Déraisonnement, délire.

D. Lecythis minor; LIN., sémence.

Nausée, anxiété, trouble de tête; Puihn, gen. 161, pag. 109.

E. Thé, thea bohea; LIN., feuilles récentes.

Voy. LINNÉ, potus theæ; Upsal. 1765; et amænit. academ., tom. VII, art. 133.

Nausée, spasme, gaité, cardialgie, hémoptysie, toux phthisique.

Vertige, foiblesse, tremblement, pusillanimité, aphonie, affoiblissement de la mémoire, paralysie, mort lente; Puihn, gen 164, pag. 111.

F. Nielle, nigella, 1.º damascena, 2.º sativa, 3.º arvensis, LIN., semence.

Convulsion nigellique; SAUV., cl. IV, ord. 111, gen. XIII, esp. 8.

S-esp. X. Par les plantes de la monadelphie; cl. XVI, LIN.

A. Sida asiatica; LIN., semence.

Sommeil soutenu; Puihn, gen. 202, pag. 131.

B. Baringtonia speciosa; LIN., noyaux, Ivresse; Puihn, gen. 203, pag. 131.

S-esp. XI. Par des plantes de la diadelphie; cl. XVII, LIN.

A. Ers, ervum ervilia; Lin., semences. Débilité des pieds, telle qu'on chancèle et qu'on ne peut se tenir débout; Puihn, pag. 135.

S-esp. XII. Par des plantes de la syngenésie.

A. Laitue, lactuca, 1.º scariola, 2.º virosa; Lin., la plante.

Les effets de l'opium, moins forts; Puihn, gen. 206, pag. 138.

S-esp. XIII. Par des plantes de la monœcie; cl. XXI, LIN.

A. Hêtre, fagus sylvatica; Lin., noix. Engourdissement, tristesse, imbécillité, céphalalgie, fièvre aiguë, hydrophobie mortelle; Puihn, gen. 225, pag. 148.

B. Bryone, bryonia alba; Lin., racine récente et bourgeons.

Vomissement, superpurgation, folie, stupeur, vertige avec obscurcissement de la vue, anxiété, peut-être la mort; Puihn, gen. 239, pag. 155.

S-esp. XIV. Par des plantes de la diœcie; cl. XXII, LIN.

A. Chanvre, cannabis sativa; LIN., sémences, écorce des feuilles, suc et sommités, et principalement la poussière fécondante.

Les esfets d'un narcotique; Puihn, gen. 241, pag. 157.

B. Mercuriale, mercurialis perennis; LIN., herbe.

Evacuations, ardeur de la tête, douleurs arthritiques, assoupissement, quelquefois la mort; Puihn, gen. 242, pag. 158.

C. Coriaria myrtifolia; Lin., feuilles, surtout les baies.

Convulsions générales, anesthésie mortelle; Puihn, gen. 243, pag. 158.

D. Menispermum cocculus; Lin., baies ou plutôt noyaux.

Spasmes, hémorragie, nausée, évacuations,

lipothymie, mort si ce n'est de l'homme, au moins des animaux; Puihn, gen. 244, pag. 159.

E. If, taxus baccata; LIN., feuilles, baies, semences.

Vomissement mortel, diarrhée, fièvre ardente, étranglement, froid universel; Puihn, gen, 245, pag. 160.

S-esp. XV. Par des plantes de la polygamie; cl. XXIII, LIN.

A. Sensitive, mimosa, 1.º sensitiva, 2.º pudica, 3.º fornesiana.

Mort plus ou moins prompte; acrimonie des humeurs, hecticie; narcose; Puihn, gen. 248.

B. Figuier, ficus, 1° caricæ, 2.° sycomori, 3.° toxicaria, 4.° grossularioides; Lin., suc en général, et fruit de l'espèce 3.

Effets vénéneux; Puihn, gen. 250-251, pag. 164.

S-esp. XVI. Par des plantes de la cryptogamie; cl. xxiv, Lin. Champignons (*). Voy. BATTARA, historia fungorum agri arimiensis; Faventiæ 1755.

- (*) Principaux champignons vénéneux de LAMARCK.
- A. Amanite poivrée; LAMARCK, esp. 1; agaricus piperatus; LIN,, esp. 8.
- B. Amanite pernicieuse; LAMARCK, esp. 4. Laiteuse; LAMARCK, esp. 2. Agaricus lactifluus; LIN. esp. 7. Sanguine; LAMARCK, esp. 3. Agaricus deliciosus; LIN., esp. 6.
 - C. Amanite vénéneuse; LAMARCK, esp. 5.
 - D. Amanite à zones; LAMARCK, esp. 6.
 - E. Amanite bronzée; LAMARCK, esp. 7.
- F. Amanite rouge; LAMARCK, esp. 8; agaricus integer, esp. 3.
- G. Amanite aranéeuse; LAMARCK, esp. 13; agaricus violaceus; LIN., esp. 11.
 - H. Amanite blanche; LAMARCK, esp. 24.
- I. Amanite glutineuse; LAMARCK, esp. 25; an agaricus viscidus; LIN., esp. 13.
- K. Amanite mouchetée; LAMARCK, esp. 45; agaricus muscarius; LIN., esp. 4.
 - L. Amanite printanière; LAMARCK, esp. 51.

Désignation des champignons véneneux par Puihn.

- A. Agaricus cantharellus, gen. 253, pag. 166.
- B. Agaricus integer, gen. 254, pag. 166.
- C. Agaricus muscarius, gen. 255, pag. 167.
- D. Agaricus necator, gen. 256, pag. 167.

Schaeffer, fungorum etc. icones; Ratisb. 1762--63.

- E. Agaricus pustulatus, gen. 257, pag. 168.
- F. Agaricus piperatus, gen. 258, pag. 168.
- G. Agaricus bulbosus vernus, gen. 259, pag. 168.
- H. Agaricus viscidus, gen. 260, pag. 168.
- I. Agaricus clypeatus, gen. 261, pag. 169.
- K. Agaricus fimetarius, gen. 262, pag. 169.
- L. Agaricus stypticus, gen. 263, pag. 169.
- M. Agaricus radicosus, gen. 264, pag. 169.
- N. Agaricus sanguineus, gen. 265, pag. 169.
- O. Agaricus pileo cucullato, etc., pag. 170.
- P. Agaricus pileo plano, etc., pag. 170.
- Q. Agaricus candidus et viscidus, etc., pag. 170.
- R. Amanita coniformis, etc., pag. 170.
- S. Agaricus globoso-viscida, etc., pag. 170.
- T. Boleius luieits, pag. 170.
- U. Hydnum repandum, pag. 170.
- V. Phallus impudicus, gen. 266, pag. 171.
- X. Phallus-mokusin, gen. 267, pag. 171.
- Y. Peziza auricula, pag. 171.
- Z. Lycoperdum bovista, gen. 268, pag. 172.
- AA. Lycoperdum stellatum, gen. 269, pag. 172.
- BB. Fungus phalloides, etc., gen. 270, pag. 173.
- CC. Fungus bulbosus, etc., gen. 271, pag. 173.

Champignons vénéneux indéterminés.

A. Agaric conique; Picco, hist. et mêm. de la soc. roy. de méd. de Paris, tom. IV, pag. 355, hist.

PAULET, mémoire sur un ordre particulier de champignons, etc.; hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris, ann. 1776, tom. 1, pag. 431 des mém.

CARTHEUSER, de fungorum venenatorum notis; Giessæ 1777.

DE NECKER, traité sur la mycitologie, etc.; Manhein 1783.

BATSCH, elenchus fungorum, etc.; Halæ 1783. – Elenchi fungorum continuatio prima; Halæ 1786.

ZEVIANI, sopra il veneno de funghi; etc.; mémorie della societa italiana, tom. 111; Verona 1786, pag. 471.

B. Boletus cancellatus; AYMEN, hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris, tom. 1, pag. 344.

C. Agaric champêtre, agaricus campestris; DARDANA, in agaricum campestrem veneno in patria infamen acta; à la suite de l'ouvrage de PICCO, melethemata inauguralia. L'auteur des démonsir. élém. de botan., Lyon, 3.º édit., 1787, tom. III, pag. 418, place sous le n.º 9 l'agaric champêtre de LINNE, et dit que c'est le plus usité comme aliment. Cet agaric est l'amanite comestible, LAMARCK, esp. 51, ou le champignon des couches. D'après les observations de DARDANA, on voit que le même champignon est esculent et a été mangé sans danger. Il y a donc une erreur dans l'observation qu'il cite, ou, parmi les champignons innocens, il s'en étoit trouvé de vénéneux.

Picco, de fungorum generatione, etc.; melethemata inaug. aug. Taurin. 1788, pag. 1, 105, 237, 265.

PAULET, tabula plantarum fungosarum;
Paris 1791.

Car. Coliques, évacuations, tremblement, délire, assoupissement, mort.

A. Orthopnée par les champignons; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. 1x, esp. 25.

B. Cholera sec par les champignons; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XV, esp. 2, var. A et B.

g. I I.

Produits de la fermentation.

S-esp. XVII. Par le produit fermenté de la vigne; vitis vinifera; LIN., pentand. monog.

Voy. T. G. HERNISEN, de caus à inebriandi spirituum vinosorum; Duisb. 1780.

Le vin, en excès, détermine la perte de la raison, le vertige, le balbutiement, le gonflement du visage et des yeux, la foiblesse des jambes, la perte des sens, le sommeil profond, l'apoplexie. A. Tremblement ébriétique; SAUV., cl. IV; ord. 111, gen. XIV, esp. 3.

Tremblement hydrocéphalique (effet de l'abus du vin); Sauv., ibid, esp. 8.

- B. Diplopie temulente; SAUV., cl. VIII; ord. 1, gen. 111, esp. 10.
- C. Délire temulent; SAUV., cl. VIII, ord.

Bachantisme; PAW, œuvr. philosoph., tom. VI, pag. 181.

- D. Apoplexie temulente; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXXI, esp. 3.
- E. Aphonie ébriétique; Sauv., cl. v1, ord.
 111, gen. xv, esp. 3.
- F. Diabetes vineux; SAUV., cl. 1X, ords
 111, gen. XXV, esp. 5.

S. III.

Plantes narcotiques indéterminées.

S-esp. XVIII. Par la Jatrops umbellata; Lin., la plante.

Approchées du nez, il en provient la céphalalgie, le vomissement, la diarrhée; Puihn, gen. 274, pag. 176.

Gen. XX.

Gen. XX. DÉMENCE.

Eth. du mot latin dementia, qui signifie perte de raison.

Syn. Démence; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XVIII. - LINNÉ, cl. v, mentales; ord. r, idéales; gen. LXVII. - Vogel, cl. ix, paranoies; gen. cccxxxvii. - Cullen, cl. 11, névroses; ord. IV, vésanies; gen. LXV. - SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. 111, délires; gen. XIX.

Vésanie; LINNÉ, cl. v., mentales; ord. I, idéales; gen. LXX.

Imbécillité, démence; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. IV, vices du jugement et de la mémoire; gen. 11.

- Bibl. CL. F. GRANDCLAS, an mente motis multum sanguinem detrahere conducat? Paris 1750.
 - I. H. KNIPHOF, de însaniâ; Erford 1753.
- C. A. KLOEKHOFF, de morbis animi ab infirmato tenore medullæ cerebri; Traject. ad Rhen. 1753.
- Z. PLATNER, prolusio qua medicos de insanis et furiosis audiendos esse ostendit; opuse. Tom. II.

Esp. II. Imbécillité.

Syn. Démence proprement dite, imbécillité, fatuité.

Stupidité; Vogel, cl. IX, paranoies; gen. cccxxxvi.

Car. Difficulté et souvent impossibilité de juger et d'imaginer.

S-esp. I. Incohérente.

Impossibilité de lier les idées et les mots. Folie incohérente; ARNOLD, loc. cit., gen. 1, esp. 2.

S-esp. II. Niaise.

Dépravation du jugement qui, par incapacité d'apprécier les objets, semble applaudir à tout par une expression sensible de joie et par une contenance naïve et ridicule.

Niaiserie; VITET, cl. v, ord. 11, gen. vII, esp. 1.

Folie inepte ; ARNOLD, loc. cit., gen. 11, esp. 3.

S-esp. III. Bête.

Dépravation du jugement qui, par défaut d'idées distinctes sur les objets et sur leurs rapports, fait agir et parler sans goût et sans justesse, pour l'ordinaire avec entêtement.

Bêtise; VITET, cl. v, ord. 11, gen. VII, esp. 11.

Folie impulsive; ARNOLD, loc. cit., gen. II, esp. 3.

Var. A. Démence à la suite d'une fièvre quarte; SAUV., loc. cit., esp. 11.

B. Démence par une maladie externe de la tête; SIBBERN, act. soc. med. Haun., vol. 1, pag. 86.

C. Démence sénile; SAUV., loc. cit., esp. 1.

Esp. III. Idiotisme.

Car. Impossibilité absolue de former des idées, avec un degré plus ou moins considérable de taciturnité, de stupeur et d'insensibilité.

Rap. A. Démense morosique; SAUV., loc. cit., esp. 8.

S-esp. I. Microcéphalique (par un excès de petitesse de la tête).

Démence microcéphalique; SAUV., loc. cit., esp. 6.

Esp. IV. Crétinisme.

Bibl. Tentamen de scrophulis et stupiditate in nonnullis provinciis eas comitante; Turin 1789.

ACKERMAN, uber die kretinen, etc.; Gotha

R. KLAYTON, sur les cretins du Vallais; memoirs of the litterary and philosophical society of manchester, etc., vol. 111; Lond. 1790, art. XIII.

FODERÉ, essai sur le goître et le crétinage; Turin 1792.

MALACARNE, giornale per servire alla storia ragionata della medicina di quæsto secolo, tom. VI, art. 529.

Saussure, des cretins et des albinos; voyages dans les Alpes, tom. IV, pag. 391.

Car. Abolition de toute intelligence pour l'ordinaire avec goître, surdité, muétisme, et un très-haut degré d'insensibilité.

Gen. XXI. GOITRE.

Eth. Mot formé par corruption du latin, guttur, qui veut dire gorge.

Syn. Bronchocèle; SAUVAGES, cl. 1, vices; ord. IV, excroissances; gen. XXVIII. — VOGEL, cl. X, vices; ord. II, tumeurs; gen. 369.

Trachelophyma, SAGAR, cl. 1, vices; ord.

IV, excroissances; gen. XXXIII.

Gongrona; Vogel, cl. x, vices; ord. 11, tumeurs; gen. 371.

Bibl. TH. PROSSER, an account and method. of cure of the bronchocele, etc.; Lond. 1769.

READ, mém. sur les bronchocèles du pays Messin; etc.; Nancy 1777.

Valentin, dissert. med. chirurg. de strumă, bronchocele dictă, et de hemeralopiā; Nancy 1787.

Foderé, essai sur le goître et le crétinage; Turin 1792.

J. GAUTIERI, tyrolensium, carynthiorum, styriorumque struma; Vindobon. 1794.

Car. Tumeur molle ou pâteuse, placée au devant de la gorge, souvent en forme de croissant.

Esp. I. Goître cellulaire.

Tumeur uniforme et d'une extension à peu près égale d'une oreille à l'autre.

S-esp. I. Séreux.

Principalement remarquable par l'empâtement de la tumeur, et même par un certain degré de fluctuation.

Rap. A. Bronchocèle aqueux; SAUV., loc. cit., esp. 4.

S-esp. II. Mellicérique.

Caractérisé par la rénitence de la tumeur.

S-esp. III. Stéatomatique.

Indiqué par une plus grande dureté de la tumeur.

Rap. A. Bronchocèle botique; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Bronchocèle adipeux; Gesscher, præve over de voornaamste langduccrige gezurellen, etc.; Amsterd. 1780, esp. 1.

Esp. II. Goître thyroïdien.

Car. La saillie de chaque côté du cou est beaucoup plus considérable; le gonflement est plus ou moins inégal; la rénitence est plus marquée.

Rap. A. Bronchocèle sarcome; Sauv., loc. cit., esp. 3.

B. Bronchocèle thyroïdien; Gesscher, loc. cit., esp. 3.

Gen. XXII. DYSCINIE.

Eth. de dys, difficilement; et kineo, je me meus.

Car. Les mouvemens volontaires sont pénibles, incomplets, désordonnés.

Esp. I. Tremblement.

Syn. Tremblement; Sauvages, cl. IV, spasmes; ord. III, cloniques partiels; gen. XIV. — LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. II, agitatoires; gen. CXXXI. — VOGEL, cl. V, gen. CLXXXIV. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. III, cloniques partiels; gen. XV.

Bibl. G. G. RICHTER, de tremore; Gotting. 1750.

A. E. BUCHNER, de tremore artuum ejusque causis; Halæ 1752.

G. E. HAMBERGER, de tremore; Jenæ 1754.

Car. Mouvement involontaire, de nature clonique, principalement lorsque la partie affectée perd son point d'appui. S-esp. I. Séreux.

Principalement remarquable par l'empâtement de la tumeur, et même par un certain degré de fluctuation.

Rap. A. Bronchocèle aqueux; SAUV., loc. cit., esp. 4.

S-esp. II. Mellicérique. Caractérisé par la rénitence de la tumeur.

S-esp. III. Stéatomatique.

Indiqué par une plus grande dureté de la tumeur.

Rap. A. Bronchocèle botique; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Bronchocèle adipeux; Gesscher, præve over de voornaamste langduccrige gezurellen, etc.; Amsterd. 1780, esp. 1.

Esp. II. Goître thyroidien.

Car. La saillie de chaque côté du cou est beaucoup plus considérable; le gonflement est plus ou moins inégal; la rénitence est plus marquée.

Rap. A. Bronchocèle sarcome; Sauv., loc. cit., esp. 3.

B. Bronchocèle thyroïdien; Gesscher, loc. cit., esp. 3.

Gen. XXII. DYSCINIE.

Eth. de dys, difficilement; et kineo, je me meus.

Car. Les mouvemens volontaires sont pénibles, incomplets, désordonnés.

Esp. I. Tremblement.

Syn. Tremblement; Sauvages, cl. IV, spasimes; ord. III, cloniques partiels; gen. XIV.

— LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. II, agitatoires; gen. CXXXI. — VOGEL, cl. V, gen. CLXXXIV. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. III, cloniques partiels; gen. XV.

Bibl. G. G. RICHTER, de tremore; Gotting. 1750.

A. E. BUCHNER, de tremore artuum ejusque causis; Halæ 1752.

G. E. HAMBERGER, de tremore; Jenæ 1754.

Car. Mouvement involontaire, de nature clonique, principalement lorsque la partie affectée perd son point d'appui. S-esp. I. Tremblement débilitique; SAUV., loc. cit., esp. 1.

S-esp. II. Tremblement palpitant; SAUV., loc. cit., esp. 16.

S-esp. III. Tremblement paralytodé; SAUV. loc. cit., esp. 11.

S-esp. IV. Tremblement sénile; SAUV., loc. cit., esp. 2.

Esp. II. Chorée.

Syn. Danse de Saint-Guy, de Saint-Weit. Scelotyrbe; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XXI. — SAGAR, cl. IV, spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XXII.

Chorée; LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. 11, agitatoires; gen. CXXXIX. — VOGEL, cl. V, spasmes; gen. CXCIII. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; gen. LI.

Bibl. J. H. Furstenau, de sancti-Viti saltu sive chorea, vulgo vits-tanz; Rinthel 1750.

G. CH. DETHARDING, de chorea sancti-Viti; Rostoch 1760.

J. B. M. Schwarz, de tarantismo et chorea

sancti-Viti, quantum scilicet inter sese hi morbe aut conveniant aut differant; Viennæ 1766.

C. P. BRUCKMANN, enarratio choreæ sancti-Viti et epilepsiæ quæ, per fontes medicatos et thermas embsenses curatæ sunt; Francof. ad Mæn. 1786.

Car. Mouvemens irréguliers et involontaires des extrémités, pour l'ordinaire dans une seule partie latérale du corps, et principalement lorsqu'il s'agit de saisir un corps ou de marcher, souvent avec contorsions du visage.

Rap. A. Scelotyrbe choréique; SAUV., loc. cit., esp. 1.

S-esp. I. Chorée tétanique; Marc, historia morbi rarioris spasmodici; Erlang. 1792.

Esp. III. Bériberi.

Nota bene. ZIMMERMAN, de l'expér. en méd. tom. II, pag. 34I, prétend que la maladie appelée dans les Indes beriberi, est véritablement l'opithotonos. PLATNER, dans son ars medendi, etc.; Leipsik 1765, avance que cette maladie n'est autre chose que la colique de Poitou; mais Bontius semble plutôt l'assimiler

au tremblement ou à la paralysie incomplète, ce qui l'a fait évidemment rentrer dans le genre dyscinie.

Car. L'action de marcher consiste dans une sorte d'élancement des genoux et des jambes, d'après l'allure naturelle de la brebis.

Rap. A. Faux beriberi; SAUV., loc. cit., esp. 2.

S-esp. I. Bériberi épileptiforme. Bériberi indien; Sauv., loc. cit., esp. 1.

Gen. XXIII. VÉSANIE (a).

Eth. de vesania, aliénation d'esprit.

Syn. Vésanie; LINNÉ, cl. v, mentales; ord. I, idéales; gen. LXX.

Car. Démence chronique partielle, tranquille, sans fièvre.

Esp. I. Mélancolie.

Eth. de melas, noir; et chole, bile.

⁽a) Dans le tableau des genres qui composent la sous-classe première de la deuxième classé, pag. 26, lign. dernière, on a mis mélancolie au lieu de vésanie, par erreur qu'on voudra bien rectifier.

Syn. Mélancolie; Juncker, tab. cxxII.—
Sauvages, cl. vIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XIX.— LINNÉ, cl. v, mentales;
ord. I, idéales; gen. LXXI.— VOGEL, cl. IX,
paranoies; gen. cccxxXII.— Cullen, cl. II,
névroses; ord. IV, vésanies; gen. LXVI.—
SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. III, délires;
gen. XX.— PINEL, cl. IV, névroses; ord. I,
vésanies ou égaremens d'esprit non fébriles,
gen. XLVI.

Bibl. MAC-MAHON, an in morbis melancholicis purgatio per inferiora? Paris. 1750.

E. DE MARQ, de melancholiá; Erford

LORRY, de melancholiá et morbis melancholicis; Lutet.-Paris. 1765; en allemand par KRAUSE, 1769.

B. FAWCET, observations on the nature, causes and cure of melancholy, especially of that, wich is commonly called religious melancholy; Schrewsbury 1780; en allemand par J. F. Lehzen, Lips. 1785.

I. E. Greding, vermischte medicinische und chirugische schriften; Altenb. 1781, pag. 128.

J. H. Munch, diss. sistens observationes practicas circa usum Belladonæ in melancholia, mania et epilepsia; Gotting. 1783.

J. Ph. Truckenmiller, specimen inaug. medic. sistens affectûs melancholici historiam cum epicrisi; Erl ngæ 1786.

ANDRY, recherches sur la mélancolie; hist. et mém. de la soc. roy. de médec. de Paris, ann. 1782--83, pag. 89 des mém.

Car. L'esprit est aliéné sur un objet particulier, sans fureur ni fièvre.

Rap. A. Démence illusoire, insania delusiva; ARNOLD, observat. on the nature, kinds, causes and prevention of insanity, etc., gen. 11, esp. 1.

B. Mélancolie dans les fièvres; BOUVIER, rec. périod. de la soc. de médec. de Paris, tom. 1V, pag. 343.

S-esp. I. Mélancolie illusoire.

Le malade s'abuse sur un danger imaginaire, sur la nature de son espèce, ou sur toute autre circonstance.

Var. A. Craintive.

Roulant sur la crainte d'un danger imaginaire: par exemple sur

- A. La crainte d'être empoisonné et inspirant le refus de prendre des alimens.
- B. La crainte de trop user ses habits, et portant au refus absolu de se vêtir.

- C. La crainte de procurér une inondation en pissant, et déterminant au refus obstiné de lâcher ses urines.
- D. La crainte qu'ATLAS ne dépose le monde sur ses épaules, et faisant naître une surveillance continuelle pour l'éviter.
- E. La crainte, se croyant toujours plongé dans une rivière jusques au nombril, d'être sur le point de se noyer. Mélancolie de Pas-CAL.

Mélancolie vulgaire; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Inanimique.

Dans laquelle le malade croit être mort ou avoir quelques parties du corps composées de substances inanimées.

- A. Avoir la tête de verre, de glace.
- B. Être une cruche.
- C. Avoir les jambes de paille.
- D. Être mort.

Mélancolie vulgaire; Sauv., loc. cit., esp. 1.

C. Morbidique.

Donnant l'idée d'une maladie existante ou de quelque cause supposée de maladie.

A. Mélancolie argante; SAUV., loc. cit., esp. 4. — Molière, comédie du malade imaginaire.

B. Mélancolie dans laquelle on croit avoir dans l'estomac des grenouilles;

Dans la tête, des lapins ou des clapiers, etc.

D. Religieuse.

Avec crainte superstitieuse des événemens futurs; SAUV., loc. cit., esp. 3.

- A. Austérité; disposition habituelle à se priver avec opiniâtreté des choses les plus essentielles à la vie, accompagnée de maigreur et de mélancolie; VITET, cl. v, ord. 11, gen. XXX.
- B. Abstinence; sentiment habituel qui porte à se priver avec opiniâtreté des alimens nécessaires, accompagné de maigreur, de dou-leur dans la région épigastrique, et de diminution plus ou moins considérable des forces; VITET, cl. V, ord. II, gen. XXX, esp. I.

E. Phrontique.

Dans laquelle on a peur de tout, on est inquiet, on fuit le jour et la compagnie, on fait des rèves effrayans, etc.; SAUV., loc. cit., esp. 14.

Panophobie phrontique; SAUV., cl. VIII, ord. II, gen. XII, esp. 3.

F. Stupéfactive.

Dans laquelle la domination de quelque crainte rend pensif et obstiné à ne point changer de place; SAUV.; loc. cit., esp. 6.

G. Zoantropique.

Déterminant la croyance d'être changé en quelque animal; SAUV., loc. cit., esp. 12.

- A: En chat; galéantropie.
- B. En chien; lycantropie.
- C. En lapin.
- D. En cheval, dans la métempsycose. Mé-lancolie hyppantropique; Sauv., loc. cit.; esp: 12.

E. En coq; SAUV:; loc: cit., esp. i.

H. Féminine.

Avec la ferme idée d'être changé en femme. Mélancolie scytique; SAUV., loc. cit.; esp. 108

I. Gaie.

Dans laquelle on se repaît de bonheur et de prospérité:

Mélancolie morique; SAUV., loc. cit.; esp. 5. Mélancolie inspirant l'idée d'être dieu, roi; prince, poëte; SAUV., ib. — D'assister à des représentations dramatiques; HORACE, épitr. liv. 11, épîtr. 2. — De voir un port de mer rempli de vaisseaux, et d'en être le proprié-

Tom. II.

taire; D'YVOIRY, essai de médec., tom. 11, esp. 185.

K. Plaintive.

Dans laquelle on s'afflige mal-à-propos sur la nature des événemens et l'état des circonstances.

Le plaintif; caractère toujours porté à être mécontent de ce qui arrive; VITET, cl. v, ord. 1, gen. 111, esp. IX.

L. Suicidique.

Portant le dégoût de la vie au point de faire desirer la mort et de déterminer à se la donner.

Mélancolie anglaise; SAUV., loc. cit., esp. 11. Spléen des Anglais, le suicide.

Dégoût de soi-même et des choses, qui rend la vie insupportable; VITET, cl. v, ord. I, gen. III, esp. VII.

GRESSET, comédie de Sydnei.

PATRAT, comédie de l'anglais ou le fou raisonnable.

M. Èrotomanique.

Avec un amour de vénération pour la personne aimée.

Mélancolie érotomanique; SAUV., loc. cit., esp. 2.

Rousseau, mélodrame de Pigmalion.

N. Nympholepsique.

Avec desir de s'égarer dans des solitudes.

Nympholepsie; accès mélancolique qui faisoit fuir les Grecs dans des endroits solitaires, propres aux rêveries profondes; PAW, œuvr. philosoph., tom. VI, pag. 121.

Formes.

Sort. 1. Pleurodynie flatueuse; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. XI, esp. 4.

- 2. Palpitation mélancolique; Sauv., cl. IV, ord. III, gen. XV, esp. 7. Cette sorte appartient, sous plusieurs rapports, au genre névrose.
- 3. Céphalée mélancolique; Sauv., cl. v11, ord. 11, gen. XII, esp. 5.
- 4. Goutte mélancolique; Sauv., cl. VII, ord. I, gen. I, esp. 6.

Esp. II. Nostalgie.

Eth. de nostein, retourner; et algeia, chagrin, tristesse.

Syn. Nostalgie; Juncker, tab. CXXVII. — SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. 11, mo-

rosités; gen. XI. — LINNÉ, cl. v, mentales; ord. III, pathétiques; gen. LXXXIII. — CUL-LEN, cl. IV, locales; ord. II, dysorexies; sect. I, appétits erronés; gen. CVI. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. XI.

Philopatridomanie; STOLL, diss. de nostalg.

SAUVAGES, gen. nostalgie.

Pothopatridalgie; STOLL, diss. de nostalg. Nostomanie; STOLL, ib. Maladie du pays.

Bibl. HARDER et HOFER, de nostalgia; Basil. 1678; et coll. de HALLER, tom. I pag. 181.

STOLL, de nostalgiá; dissert. medic.; colle D'EYEREL, tom. 111, pag. 205.

Car. Ardent desir des étrangers pour leux pays.

Rap. A. Nostalgie simple; SAUV., loc. cit., esp. i.

B. Nostalgie simulée; SAUV., loc. cit. 3.

S-esp. I. Nostalgie compliquée (d'une fièvre); Sauv., loc. cit., esp. 2.

Esp. III. Démonomanie.

Eth. de dæmo, démon; et mania, manie, folie.

Syn. démonomanie; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. III, délire; gen. XXI. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XXI.

- Bibl. A. DE HAEN, de magia liber, rat. medend., tom. VIII, pars 11; Paris 1777.
- De dæmoniacis; rat. medend., tom. VIII, pars 11, cap. IV, pag. 92.
- J. FERRIAR, sur l'illusion populaire, et particulièrement sur la démonologie médicale; memoirs of the litterary and philosophical society of manchester, etc.; vol. 111; Lond. 1790, art. 11.
- Car. Symptômes bizarres imputés à la possession du diable ou aux effets de la magie.
- Rap. A. Démonomanie sortilégique; SAUV., loc. cit., esp. 1.
- B. Démonomanie hystérique (fourberie de deux jeunes filles); SAUV., loc. cit., esp. 6.
 - C. Démonomanie vampirique (prétendue at-

tribution d'un pouvoir sur les morts); Sauv., loc. cit., esp. 2.

Voy. Don A. CALMET, traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, de Moravie, etc.; Paris 1751.

Sous - classe deuxième.

SUROXIGÉNÈSES.

Cette sous-classe, destinée aux maladies dans les quelles on a lieu de croire que l'oxigène est en excès dans les corps vivans, est extrêmement nombreuse. Faut-il s'en étonner, lorsque MM. Rollo, Beddoés, qui ont cru devoir diviser les maladies d'après une doctrine chimique, ont pensé qu'elles pouvoient être toutes comprises sous deux grandes divisions générales, les oxigénantes et les désoxigénantes? C'est qu'en effet les affections morbifiques où se trouve de la tension, de l'irritation, de l'inflammation, se rencontrent fréquemment dans l'exercice de la médecine; et c'est sous ce rapport que j'ai rangé dans cette sous-classe, à titre de genres,

XXIV. Le Phantasme.

XXV. La Physéose.

XXVI. Le Mentisme.

XXVII. L'Agrypnie.

XXVIII. La Névrose.

XXIX. La Paraphrynie.

XXX. Le Salacisme.

XXXI. Le Tonisme.

XXXII. La Narcose.

XXXIII. Le Clonisme.

XXXIV. La Toux.

XXXV. L'Asthme.

XXXVI. La Phthisie.

XXXVII. La Gastrorexie:

XXXVIII. L'Algie.

XXXIX. La Toxicose.

XL. La Paralysie.

XLI. L'Amaigrissement.

XLII. L'Épischésie.

XLIII. Le Spermatisme.

XLIV. La Diarrhée.

XLV. La Cénose.

XLVI. Le Diabète.

XLVII. La Grossesse.

XLVIII. L'Avortement.

XLIX. Le Calcul.

I. La Concrétion.

LI. Le Leucome.

LII. La Parectamie.

LIII. La Pneumatose.

LIV. L'Emphraxie.

LV. Le Polype.

LVI. La Phlegmose.

LVII. Le Phlegmon.

LVIII. La Phlegmonitie.

LIX. La Variole.

LX. La Vaccine.

Gen. XXIV. PHANTASME.

Eth. de phantasma, fantôme, spectre, vision. Mot adopté pour désigner un genre de maladie qui présente à l'esprit des objets imaginaires ou fantastiques.

LINNÉ s'est servi du mot phantasma; mais dans ce nosologiste, cette dénomination, a trop peu d'extension, parce qu'elle n'est synonyme qu'à vision mensongère.

Car. Illusion des sens.

Esp. I. Berlue.

Syn. Berlue, suffusio; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. 1, hallucinations; gen. 11.—SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. 1, hallucinations; gen. 11.

Phantasme; LINNÉ, cl. v, mentales; ord. II, imaginaires; gen. LXXIII. — VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses; gen. CCLXXXVII.

Pseudoblepsie; Cullen, cl. IV, locales; ord. I, dysæsthésies; gen. xcv.

Bibl. J. J. Fr. Delius, phantasmata ante oculos volitantia, oculorum adfectus singularis; Erlangæ 1751.

I. R. Kinke, de diplopia; Gotting. 1774.

Car. On voit des objets qui n'existent pas.

S-esp. I. Myode.

Dans laquelle on voit une tache noire ou une mouche qui vole.

Berlue myode; SAUV., loc. cit., esp. I.

S-esp. II. Réticulaire.

Dans laquelle on aperçoit des ombres minces et rameuses; des toiles d'araignée.

Berlue réticulaire; SAUV., loc. cit., esp. 2.

S-esp. III. Étincellante.

Dans laquelle on imagine voir des étincelles, des rayons.

Berlue scintillante; SAUV., loc. cit., esp. 3. Marmarige d'HIPPOCRATE.

Hæmalopie; Vogel, cl. vII, hyperæsthèses; gen. cclxxxIX.

S-esp. VI. Colorante.

Dans laquelle on voit les objets autrement colorés qu'ils ne le sont.

Berlue colorante; SAUV., loc. cit., esp. 4.

Esp. II. Bévue.

Syn. Bévue, diplopia; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. III.—Cullen, cl. IV, locales; ord. I, dysæsthésies; gen. xcv, esp. 2, var. D.—SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. III.

Dysopie; Vogel, cl. vii, hyperæsthèses; gen. ccxci.

Car. Les objets que l'on voit existent; mais ils sont aperçus avec des changemens quel-conques.

S-esp. I. Métamorphosique.

Dans laquelle les objets sont vus avec un changement de figure.

Berlue métamorphosique; SAUV., loc. cit.; esp. 5.

S-esp. II. Chancelante.

Dans laquelle on voit les objets chancelans et prêts à tomber ou à être renversés.

Berlue chancelante; SAUV., loc. cit., esp. 7.

S-esp. III. Diminutive.

Dans laquelle les objets paroissent plus petits. Berlue diminutive; Sauv., loc. cit., esp. 6.

S-esp. IV. Multiplicatives.

Dans laquelle les objets paroissent multipliés.

J. P. BUCHNER, de visione simplici et duplici, ex principiis opticis methodo euclidea deductus; Argent. 1753.

S-esp. V. Éloignée.

Dans laquelle les objets éloignés paroissent doubles, mais non ceux qui sont proches.

Bevue d'éloignement; SAUV., loc. cit., esp. 7.

S-esp. VI. Palpébrale.

Dans laquellé les objets ne paroissent multipliés que par une concrétion irrégulière des tarses des paupières.

Bevue anchyloblepharique; SAUV., loc. cit., esp. 4.

Esp. III. Vertige.

Eth. de vertigo, mouvement circulaire, tournoiement. Syn. Vertige; Juncker, tab. xxvII. — Sauvages; cl. vIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. I. — LINNÉ, cl. v, mentales; ord. II, imaginaires; gen. LXXIV. — VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses; gen. ccxcIII. — Sagar, cl. XIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. I.

Tournoiement de tête.

Bibl. E. A. NICOLAI, de genesi vertiginis;
Jenæ 1759.

HERZ, versuch uber den schwindel, etc.;
Berlin 1791.

Car. Les objets en repos paroissent se mouvoir et tournoyer autour de nous.

S-esp. I. Psychique.

Par un effet de l'action mentale; HERZ, loc. eit., esp. 8.

S-esp. II. Accidentel.

Arrivant après avoir pivoté quelque temps, après avoir regardé en bas d'un lieu élevé, etc.; SAUV., loc. cit., esp. 4.

S-esp. III. Traumatique.

Survenant à un coup, une commotion, etc.; SAUV., loc. cit., esp. 5. -- HERZ, loc. cit., esp. 1.

Esp. IV. Bourdonnement.

Syn. Bourdonnement, syrigmus; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. IV.—LINNÉ, cl. V, mentales; ord. II, imaginaires; gen. LXXII.—SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. I, hallucinations.

Bourdonnement, susurrus; Vogel, cl. VII, hyperæsthèses; gen. CCXCII.

Car. On entend des sons qui n'ont pas lieu.

Var. A. Sifflement d'oreilles, sibilus; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. IV, esp. 5.

B. Bruissement d'oreilles, susurrus; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. IV, esp. 5.— VOGEL, cl. VII, gen. CCXCII.

C. Coup de marteau, bombus; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. IV, esp. II.

S-esp. I. Oxicæique.

Par une trop grande subtilité de l'ouïe. Bourdonnement oxicæique; Sauv., loc. cit., esp. 9.

Esp. V. Paracuse.

Eth. de para, vicieusement; et acouo, j'entends.

Syn. Paracuse; Sauvages, cl. vI, débilités; ord. I, dysesthésies; gen. VIII. — Sagar, cl. IX, débilités; ord. I, dysesthésies; gen. VIII. Fausse ouïe.

Car. Les sons qui se font entendre ont lieu, mais avec des circonstances extraordinaires.

S-esp. I. Baricoïque.

Dans laquelle les sons forts ne sont pas entendus.

Paracuse barycoïque; SAUV., loc. cit., esp. 1. Ouïe dure, grave.

S-esp. II. Oxicoïque.

Dans laquelle le plus léger son est fatigant. Paracuse oxicoïque; SAUV., loc. cit., esp. 2. Ouïe tendre.

S-esp. III. Doublée.

Dans laquelle un seul son est entendu deux fois.

Paracuse doublée; SAUV., loc. cit., esp. 3.

S-esp. IV. Bruyante.

Dans laquelle les sons ne peuvent être entendus qu'à la faveur d'un bruit violent fait en même temps.

Paracuse willisienne; SAUV.; loc. cit., esp. 4.

S-esp. V. Opposée.

Dans laquelle on entend à droite des paroles proférées à gauche.

Bourdonnement vertigineux; Sauv., cl. VIII, ord. I, gen. IV, esp. 10.

Esp. VI. Hydrophobie.

Eth. d'ydor, eau; et phovos, crainte.

Syn. Fausse hydrophobie.

Bibl. Alla dissertazione publicata col titolo: de falsa hydrophobia; apologia del doctor Fl. Interlenghi; Milano 1750.

A. A. APORTA, riflessioni critico-mediche, e difesa della dissertazione de falsa hydro-phobia; Coira 1750.

Car. Crainte de tout liquide, sans fureur ni envie de mordre.

Rap. A. Hydrophobie spontanée; SAUV., cl. VIII, ord. II, gen. XVI, esp. 2. — Houlston, journ. de médec., décembre 1792, tom. XCII, pag. 378.

Hydrophobie spasmodique.

Hydrophobie accidentelle de BADER, voy. l'art. rage, gen. XXXIX.

- B. Péripneumonie hydrophobique; SAUV.; cl. 111, ord. 111, gen. xxii, esp. 16.
- C. Dyssenterie hydrophobique. Obs. J'ai rencontré trois cas isolés de dyssenterie dans laquelle il y eut pendant trois jours une aversion très forte pour toute boisson.
- D. Hydrophobie sphacélique (guérie par un sphacèle mortel); J. Ch. HILDEBRAND, nová acta natur. curios., tom. 111; Norimb. 1767; art. 8, pag. 39.

Esp. VII. Antipathie.

Eth. d'anti, contre; et pathos, affections

Syn. Antipathie; LINNÉ, cl. v, mentales; ord. III, pathétiques; gen. LXXXVIII. -- VITÉT, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. II.

Bibl. CH. WEIGEL, de horrore; Lips. 1791.
Il en traite au moral et au physique.

Car. À la vue de certains objets, on éprouve un sentiment indéfinissable et pénible, souvent avec oppression, aphonie, défaillances, etc.

Formes.

Sor. 1. Syncope antipathique; SAUV., cl. vI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 9.

2. Orthopnée

- 2. Orthopnée antipathique; SAUV., cl. V , ord. 11, gen. IX, esp. 15.
 - 3. Aphonie antipathique; SAUV., cl. VI 3 ord. 111, gen. XV, esp. 2.

Esp. VIII. Cochemar.

Syn. Ephialte (d'ephallomai, je saute dessus);
SAUVAGES, cl. v, essouslemens; ord. 1, convulsifs; gen. 1.—LINNÉ, cl. VIII, suppressoires; ord. 1, suffocatoires; gen. CLXIII.—SAGAR, cl. VIII, essouslemens; ord. 1, convulsifs, gen. 1.

Incube; Juncker, tab. LI. - Vogel, cl. v, spasmes; gen. CCXI.

Oneyrodinie; Cullen, cl. 11, névroses; ord. 1v, vésanies; gen. LXVIII.

Bibl. J. Bond, an essay on the incubus or nightmare; London 1753.

Tournay, de incubo; Nancy 1783.

Car. Imagination décévante pendant le sommeil avec oppression, cris étouffés et terreur qui se prolonge quelquéfois pendant quelque temps après le reveil.

Rap. A. Oneyrodinie gravative; Culleng loc. cit., esp. 11.

Tom. II.

B. Rêve (somnium), réalité donnée à ce qu'on a vu d'effrayant en songe; Vogel, cl. 1x, gen. CCCXXXIX.

Agrypnie pathématique; SAUV, cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 2.

Panophobie; SAUV., cl. VIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. XII.

Esp. IX. Somnambulisme.

Eth. d'ambulo per somnum, je me promène pendant le sommeil.

Syn. Somnambulisme; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. VI.—LINNÉ, cl. V, mentales; ord. II, imaginaires; gen. LXXVII.—SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. VI.

Noctambulation; Juncker, tab. cxxvi. Hypnobatase; Vogel, cl. IX, paranoies;

gen CCCXL.

Bibl. Bohn, casus ægri noctambulationis morbo laborantis resolutus; Lips. 1717; et coll. de Haller, tom. VII, pag. 438.

G. M. PAGANI, aggiunta alla storia del somnambulo publicata del sign. D. G. PIGATI, col raconto della di lui guarigione per mezzo della virtu ellectrica; Vicenza 1751.

RICHTER, de statu mixto somni et vigiliæ, quo dormientes multa vigilantium munera obeant; Gotting. 1756; et opusc. med., vol. 11, Francof. et Lips. 1780, pag. 196.

F. *** Essai sur les probabilités du somnambulisme magnétique, etc.; Amsterd. 1785?

Car. Exercice des mouvemens volontaires, avec les apparences du sommeil.

Rap. A. Oneyrodinie active; Cullen, cl. 11, ord. IV, gen. LXVIII, esp. 10

B. Somnambulisme vulgaire; SAUV., loc. cit., esp. 1.

S-esp. I. Mélancolique.

L'ame n'étant occupée que d'un seul objeta

A. Paraphrosyne hystérique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 12.

B. Cataleptique (commençant et finissant par un accès de catalepsie); SAUV., loc. cit., esp. 2.

A. Catalepsie délirante; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXV, esp. 6.

Gen. XXV. PHYSÉOSE.

Eth. de physis, physeos, naturel.

Car. Dépravation du caractère par quelque vice ou travers moral.

Esp. I. Orgueil.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXVII.

Car. Préoccupation de son propre mérite, qui rend plein et bouffi de soi-même; qui fait que de tout ce qui est au monde l'on n'estime que soi; et qui rend très-attentif à faire sentir la supériorité que l'on croit avoir sur les autres.

S-esp. I. Hauteur.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Dédain affecté pour les autres par un sentiment orgueilleux de soi-même.

S-esp. II. Fierté.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Sentiment fondé sur une estime exagérée de soi-même, qui empêche de se familiariser, et qui éloigne des personnes que l'on croit au dessous de soi sous un rapport quelconque.

S-esp. III. Arrogance.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 111.

Car. Disposition habituelle à faire sentir aux autres, par des paroles dures et des manières hautaines, la supériorité que l'on croit avoir sur eux.

S-esp. IV. Dédain.

Voy. VITET, loc. cit., esp. IV.

Car. Mépris que l'on affecte des autres par le peu de cas que l'on en fait.

Esp. II. Vanité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination, gen. XXVIII.

Car. Avidité ridicule d'estime, avec desir d'occuper la pensée de tout le monde, au moyen de certains avantages dont on prétend se faire honneur.

S-esp. I. Prétention.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Efforts continuels pour prévaloir sur les autres, à l'aide de certaines qualités dont on se glorifie.

S-esp. II. Affectation.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Étalage maniéré de toutes ses qualités, pour capter l'attention ou les égards.

S-esp. III. Coquetterie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 111.

Car. Dérèglement de l'esprit, dans une femme, fondé sur la vanité et la légéreté, avec desir dominant d'être trouvée aimable, et de passer pour belle; goût excessif pour plusieurs amusemens tout à la fois, et habitude formée de se contenter de plaire.

Caractère tracé par LA Noue dans la comédie de la coquette corrigée.

Esp. III. Vaine-gloire.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. r, vices de l'imagination; gen. XXIX.

Car. Habitude dans laquelle on est de se repaître d'une vaine considération, en insistant, en toute occasion, sur des actes de supériorité gratuite.

Caractère présenté par DesTouches dans la comédie du glorieux,

S-esp. I. Magnificence.

Le magnifique; VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Étalage minutieux de tout ce qui tient à la grandeur et à la somptuosité pour captiver l'admiration.

Caractère esquissé par LA MOTTE dans l'opéra du magnifique.

S-esp. II. Dissipation.

Le dissipateur; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. XXXIII.

Car. Satisfaction habituelle à prodiguer sa fortune avec ostentation et vanité.

Caractère exposé par DesTouches dans la comédie du dissipateur.

S-esp. III. L'important.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXIX, esp. II.

Car. Caractère toujours occupé à se prévaloir, aux yeux des autres, de la science qu'on a, de la faveur dont on jouit ou de la fortune qu'on possède.

S-esp. IV. Grandomanie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 111.

Car. Imitation ridicule du ton et des ma-

nières des personnes d'un rang plus élevé, avec prétention affectée d'être de la bonne compagnie.

Caractère offert par Molière dans la comédie du bourgeois gentilhomme,

S-esp. V. L'avantageux.

Voy. VITET, loc. cit., esp. IV.

Car. Travers ayant pour objet une parade outrée de l'idée qu'on a de soi-même,

S-esp. VI. Fanfaronade.

Le fanfaron; VITET, loc. cit., esp. v.

Car. Parade de bravoure ou des succès réels ou supposés que l'on peut avoir.

Esp. IV. Présomption.

Voy. VITET, cl. I, maladies de l'esprit; ord, I, vices de l'imagination; gen. XXX.

Car. Croyance chimérique sur l'article des vertus ou des talens et du pouvoir.

S-esp. I. Pédanterie.

Voy. VITET, loc, cit,, esp. 1.

Car. Manie à étaler des connoissances scien-

tifiques, et une érudition déplacée avec affectation à endoctriner ou à reprendre les autres.

S esp. II. Suffisance,
Voy. VITET, loc. cit., esp. 11,

Car. Prévention sur soi-même, avec habitude de le faire sentir avec emphase.

Esp. V. Caprice.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. XXXVII.

Car. Inconstance ou changement subit de goût, sans raison et sans cause.

S-esp. I. Bizarrerie.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Habitude de s'écarter du goût commun par une singularité d'objet non convenable.

S-esp. II. Le Fantasque.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Caractère que distingue la manie de s'écarter du goût commun par excès de délicatesse ou par une recherche du mieux, faite hors de saison,

Esp. VI. Singularité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXVIII.

· Car. Habitude de penser et d'agir d'une manière contraire aux usages et aux sentimens admis dans la société.

Caractère offert par DesTouches dans la comédie de l'homme singulier.

S-esp. I. L'original.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Habitude de penser et d'agir d'une façon nouvelle et particulière.

Esp. VII. Distraction.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XL.

Car. Mobilité plus ou moins grande de l'attention, fréquemment détournée de l'objet extérieur à qui on l'a donnée ou à qui on doit la donner.

Esp. VIII. Le dissipé.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. XLI.

Car. Caractère que domine une imagination qui ne peut point se fixer, et qui est continuellement entraînée par les objets les plus frivoles.

Sesp. I. Le volage.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Caractère que distingue le desir renaissant de former d'autres attachemens avec difficulté de se fixer sur aucun.

S-esp. II. L'évaporé. Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Caractère que particularise le passage rapide d'une idée à l'autre, avec extrême légéreté dans l'attention, incertitude dans le discours, inconstance dans le regard et vivacité dans les mouvemens.

Esp. IX. Le babillard.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. XII.

Car. Caractère invinciblement entraîné à beaucoup parler, d'une manière rapide et diffuse sur les objets même les plus frivoles, sans écouter les autres ni leur laisser le temps de répondre.

Caractère développé par M. Boissy dans la comédie du babillard.

Esp. X. Frivolité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. XIII.

Car. Penchant continuel et involontaire à traiter légèrement les objets importans pour ne s'occuper que des choses superficielles, avec empressement pour les nouveautés.

Esp. XI. Inconséquence.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. XIV.

Car. Dépravation du jugement qui fait parler et agir d'une manière contraire aux principes mêmes qu'on a adoptés, et au but qu'on se propose.

Esp. XII. Curiosité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. xv.

Car. Disposition habituelle à desirer avec impatience de pénétrer dans les secrets et les affaires d'autrui.

Esp. XIII. Prévention.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. XVI.

Car. Dépravation du jugement, par laquelle on est incapable d'apprécier les sentimens contraires à l'idée que l'on a conçue, et à l'opinion que l'on a embrassée.

S-esp. I. Entêtement.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Jugement déterminé sur un objet, avec impossibilité d'en revenir, fondé sur un esprit trop fortement persuadé et abondant trop en son sens.

S-esp. II. Opiniâtreté. Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Constance mal-entendue, par une volonté revêche, dans un sentiment adopté, avec refus de se rendre à la raison.

S-esp. III. Obstination.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 111.

Car. Volonté de pur caprice et de propos délibéré, sur un point sur lequel on ne revient pas.

S-esp. IV. L'implacable.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXXIV, esp. v.

Car. Caractère que la fierté ou l'entêtement porte à ne jamais pardonner un mal ou une offense, souvent sans aucun desir de vengeance.

Esp. XIV. Imprudence.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. XVII.

Car. Disposition habituelle à agir inconsidérément, sans égard à l'importance des choses.

Esp. XV. Le menteur.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. 11, vices du jugement; gen. XVIII.

Car. Caractère toujours porté à donner hardiment des choses fausses pour véritables, avec satisfaction d'avoir réussi à persuader, souvent sans intérêt ni but particulier.

Caractère tracé par Corneille dans la comédie du menteur.

S-esp. I. Le fourbe.

Voy. VITET, cl. v, ord. II, gen. XIX, esp. 1.

Car. Caractère toujours porté à mentir avec assurance et à se servir de faussetés combinées pour parvenir à un but qui est nuisible aux autres.

S-esp. II. Le charlatan.

Voy. VITET, cl. v, ord. II, gen. XIX, esp. II.

Car. Caractère toujours porté à en imposer avec effronterie par les paroles et par les actions, ordinairement pour son propre intérêt.

Esp. XVI. Impudence.

Voy. VITET, cl. 11, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. XX.

Car. Hardiesse à commettre sans honte pour soi, ni respect pour les autres, des actions qu'on sait être blâmables.

Esp. XVII. Effronterie.

Voy. VITET, cl. II, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement, gen XXI.

Car. Disposition habituelle à ne rougir de rien et à braver l'infamie.

Esp. XVIII. Insolence.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit à

ord. 11, vices du jugement; gen. xxiii.

Car. Disposition habituelle à faire sentir aux autres, d'une manière outrageante, leurs défauts réels ou prétendus.

S-esp. I. Le railleur.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Caractère qui se livre sans cesse au plaisir de tourner en ridicule les paroles et les actions des autres.

Esp. XIX. L'indépendant.

Esprit d'indépendance; VITET, cl. v, maladies mentales; ord. 11, vices du jugement; gen. XXIV.

Car. Disposition habituelle à ne souffrir aucune loi et à ne suivre que ses propres idées.

S-esp. I. Indocilité.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Disposition habituelle à résister à tout ce que la supériorité légitime exige.

Esp. XX. Le mécontent.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. xxv.

Caro

Car. Caractère toujours disposé à désapprouver les paroles et les actions des autres.

S-esp. I. Le bourru.
Voy: VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Caractère maussade, toujours disposé par grossièreté des mœurs et défaut d'éducation, à témoigner de la mauvaise humeur même dans les circonstances agréables.

Caractère présenté par Goldoni dans la comédie du bourru bienfaisant. — Par l'auteur de la comédie du mariage secret.

S-esp. II. Le grondeur.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Caractère toujours disposé à réprimander les autres par des paroles dures et brusques, sans examen des actions.

Caractère exposé par Palaprat dans la comédie du grondeur.

S-esp. III. Le boudeur.
Voy. VITET, loc. cit., esp. III.

Car. Caractère toujours disposé à témoigner du mécontentement par un silence obstiné et un air sombre et fâché.

Tom. II.

Esp. XXI. Contradiction.

Voy. VITEI, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices de l'imagination; gen. XXVI.

Car. Disposition habituelle à être contraire aux sentimens, aux desirs ou aux actions des autres.

S-esp. I. Le chicaneur.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Caractère toujours porté à disputer avec acharnement sur des prétentions réelles ou imaginaires, et à chercher dans les paroles, les actions ou les propriétés des autres, des moyens pour leur élever des difficultés.

Caractère tracé par RACINE dans la comédie des plaideurs.

Esp. XXII. L'intrigant.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices de l'imagination; gen. XXVII.

Car. Caractère porté sans cesse par son activité à sinsinuer dans toutes les affaires, à les mettre en mouvement, à les faire tourner à son gré par une multitude de moyens adroits ou cachés. Caractère exposé par Dumaniant dans la comédie des intrigans. — Par BEAUMARCHAIS, dans la comédie du barbier de Séville, du mariage de Figaro, etc.

S-esp. I. Le brouillon.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Caractère toujours porté à s'insinuer dans les affaires des autres pour y faire naître des obstacles, en empêcher le succès et produire des inimitiés ou la discorde.

Esp. XXIII. Insensibilité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices de l'imagination; gen. XXVIII.

Car. Disposition habituelle à n'être point affecté du mal d'autrui.

S-esp. I. Dureté.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Disposition habituelle à témoigner son insensibilité par des paroles ou par des actions.

S-esp. II. Cruauté.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Penchant habituel à commettre, de

sang-froid et sans émotion, les actions les plus inhumaines; et à goûter du plaisir à faire souffrir on à être témoin des souffrances des autres.

S-esp. III. Ingratitude.

L'ingrat; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 111, vices de la mémoire; gen. v.

Car. Insensibilité constante pour les bienfaits reçus; souvent avec aversion pour les bienfaiteurs, desir d'éviter leur présence, et même disposition à leur nuire.

Gen. XXVI. MENTISME.

Eth. de mens, mentis, ame, esprit.

Dénomination proposée et adoptée dans cet ouvrage pour exprimer tout mouvement déréglé de l'action mentale, considérée principalement dans les effets d'une imagination vive et des passions.

Bibl. LE CAMUS, la médecine de l'esprit; Paris 1753 et 1769.

G. A. LANGGUTH, de animo, sanitatis præside atque custode optimo; Vittenb. 1758.

CH. RICHMANN, de affectibus animæ, quatenus machinam corpoream in consensum trahunt; Jenæ 1768. PH. HOLLAND, de mente; Edinb. 1782.

CHRICHTON, an inquiry in to the nature and origin of mental derangement, etc.; Lond. 1798.

CABANIS, 1.º histoire physiologique des sensations, 2.º rapports entre l'organisation physique de l'homme et ses facultés intellectuelles; mém. de l'instit. nation. scienc. mor. et pol.; tom. 1, pag. 37, 98.

Car. Excès des tempéramens dans le rapport de l'imagination et des affections de l'ame.

Esp. I. Mentisme (imaginatif) par trop d'ardeur dans l'imagination.

S-esp. I. Méditabilité.

Bibl. Tissot, des effets de la forte tension de l'ame et de ceux de l'imagination; traité des nerfs, tom. 11, part. 1, pag. 285.

CH. G. LUDWIG, de contentione studiorum in puerili ætate cavendá; Lipsiæ 1767.

Car. Disposition habituelle de l'imagination à méditer fortement.

Rap. A. Enflure par de fortes méditations; Tissot, d'après Bordeu, loc. cit., pag. 288.

B. Syncope par méditation trop forte; Tissot, d'après Pechlin, loc. cit. pag. 287.

C. Anorexie mélancolique; Sauv., cl. VI, ord. II, gen. XI, esp. 5.

D. Mélancolie mentale: G. LANDIS, de melancholid ex mente; Gotting. 1788.

E. Apoplexie par contention d'esprit; J. Nonnemann, dissert. sistens observationem apoplexiæ ex nimiis animi contentionibus ortæ; Argentor. 1771.

F. Épilepsie par méditation trop forte; Tissot, d'après Galien, loc. cit., pag. 288.

G. Convulsion par forte méditation; Tissot ibid.

H. Colique par méditation trop forte; Тізsoт, d'après Viridet, loc. cit., pag. 288.

I. Impotence par forte méditation; Tissot, d'après Pechlin, loc. eit., pag. 287.

ord. 11, gen. VIM, esp. 3.

L. Diarrhée par méditation trop forte; Tissot, d'après Pechlin, loc. cit., pag. 287.

M. Éphidrose par forte méditation; Tissot, loc. cit,

S-esp. II. Sensibilité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit;

ord. 1, vices de l'imagination; gen. XXXIX.

Car. Susceptibilité d'être vivement affecté de la moindre impression sur les sens.

Var. A. Tendresse.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Facilité extrême à être ému en faveur d'un ou de plusieurs objets, souvent avec larmes et léger saisissement.

B. Pitié.

Voy. Tissot, traité des nerfs, tom. 113 part. 1, pag. 386.

Car. Disposition à être affecté de douleur pour éprouver trop vivement la peine des autres.

A. Lipothymie pathématique; Sauv., cl. VI, ord. IV, gen. XXII, esp. I.

S-esp. III. Vivacité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXIII.

Car. Disposition à agir promptement, et exécution rapide.

Var. A. Esprit embrouillé.

Voy. VITET, cl. v, ord. II, gen. VIII.

Car. Aptitude à rassembler avec rapidité sur le même objet, une multitude d'idées obscures, sans pouvoir les préciser.

B. L'homme bouillant.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Caractère ardent et capable des plus grands efforts pour surmonter les difficultés et les obstacles, avec vivacité extrême dans la conception et dans l'action.

C. Brutalité.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Aptitude à manifester vivement son opposition, soit en paroles peu mesurées, soit en actions violentes, et sans aucune considération.

D. Brusquerie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 111.

Car. Disposition naturelle à s'exprimer promptement et laconiquement, avec un ton dur et incivil, sans égard aux personnes.

E. Pétulence.

Voy. VITET, loc. cit., esp. IV.

Car. Habitude d'agir impétueusement sans motif bien réel.

F. Étourderie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. v.

Car. Disposition habituelle à agir vivement sans réflexion, et ordinairement d'une manière opposée au but que l'on devroit se former.

G. Le téméraire.

Voy. VITET, loc. cit., esp. VI.

Car. Caractère toujours porté à affronter des dangers, sans réflexion comme sans motif.

S-esp. IV. Enthousiasme.

Voy. Vogel, cl. IX, paranoies; gen. cccxxxv. — Vitet, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. xxxv.

Mélancolie par enthousiasme; Sauv.; cl. VIII, ord. III, gen. XIX, esp. 13.

Ecplexis, exaltation de l'esprit par un trouble soudain, provenant de cause externe; Vo-GEL, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXXIV.

Car. Véhémence dans la conception, le discours ou l'action sur un ou plusieurs objets, avec desir exalté de propager les sentimens dont on est préoccupé, et pour lesquels on témoigne de l'admiration.

Var. A. Extase.

Voy. Sauvages, cl. vi, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. XXVI. — VOGEL, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXXIII. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. XXVI. — VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXV, esp. I.

Car. Préoccupation portée au point de suspendre l'action des sens.

A. Extase résolue, sans rigidité des membres; Sauv., loc. cit., esp. 2.

B. Emphase.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Car. Représentation très exagérée des objets, avec discours outrés sur leur compte.

C. Le chimérique.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. XXIII.

Car. Caractère porté sans cesse à enfanter des idées ou des projets invraisemblables, et à s'en repaître avec enthousiasme.

D. L'extravagant.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXIII, esp. I.

Car. Caractère dont les idées s'écartent toujours de la réalité des objets.

E. Métromanie.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXI.

· Car. Disposition fougueuse à créer des ouvrages en vers, à se passionner pour eux, et à vouloir les faire admirer aux autres.

Caractère tracé par PIRON dans la comédie de la métromanie.

Musolepsie, enthousiasme poëtique; PAW, œuvres philosoph., tom. VI, pag. 123.

F. Mélomanie.

Car. Disposition ardente pour tout ce qui est mélodie, musique et chant.

Caractère présenté dans la comédie avec chant de la mélomanie.

G. Tarantisme; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. xv. — LINNÉ, cl. v, mentales; ord. III, pathétiques; gen.

LXXXIV. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. XV.

Mélancolie dansante; SAUV., loc. cit., esp. 8. Phrénésie par le tarantisme; SAUV., cl. 111, ord. 11, gen. XI, esp. 14.

Car. Disposition particulière à s'enthousiasmer pour la danse, à la suite d'une prétendue morsure de la tarentule.

H. Pythonissisme.

Car. Disposition particulière à se monter l'imagination pour prédire l'avenir, au milieu des contorsions et avec une apparence d'extrême fatigue.

S-esp. V. Fanatisme.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXVI.

Car. Ardeur aveugle pour un objet, avec disposition très-forte à tout oser en sa faveur, et souvent avec haine implacable contre ceux qui lui sont contraires.

Caractère tracé par Voltaire dans la tragédie de Mahomet.

A. Démonomanie fanatique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XXI, esp. 5.

- B. Démonomanie simulée ou corybantisme; Sauv., loc. cit., esp. 3.
- C. Manie anarchique ou fanatisme de la liberté; Rush, medical inquiries, etc., Philadelphie 1791, art. 17.

S-esp. VI. Inquiétude.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. XVI.

Car. Etat pénible ou douloureux, souvent avec insomnie et mouvemens incertains du corps, par des événemens qui affectent ou que l'on craint.

Var. A. Souci.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Car. Inquiétude provoquée par l'incertitude des événemens futurs.

B. Chagrin.

1.º Par caractère.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. 11, esp. 1.

Car. Mauvaise humeur, ou inquiétude soutenue par mécontentement et tracasseries de la vie. 2.º Comme passion.

Voy. Tissot, traité des nerfs, tom. 11, part. 1, pag. 373.

Car. Tristesse vive, subite et d'autant plus forte qu'elle est imprévue.

A. Asphyxie pathématique; SAUV, cl. VI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 7.

B. Anesthésie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. X, esp. 4.

C. Aphonie mélancolique; SAUV., cl. VI; ord. 111, gen. XV, esp. 1:

C. Désolation.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. 11, esp. 111.

Car. Chagrin que donne un événement imprévu avec sanglots et cris inarticulés.

D. Désespoir.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XX.

Car. Désolation avec une sorte de fureur et desir de se nuire.

E. Regret.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. III, vices de la mémoire; gen. II.

Car. Inquiétude par le ressouvenir d'une action qu'on se reproche ou d'une jouissance qu'on a perdue.

F. Repentir.

Voy. VITET, cl. v, ord. III, gen. III, esp. I.

Car. Regret que donne intimément la conviction d'une faute vraie ou imaginaire, avec un air triste et quelquefois avec larmes.

G. Remord.

Voy. VITET, toc. cit.

Car. Vif regret donné par le ressouvenir de quelque crime réel ou imaginaire, avec un air sombre et taciturnité.

A. Langueur mortelle; Tissot, traité des nerfs, tom. 11, part. 1, pag. 384.

B. Mélancolie profonde; Tissot, loc. cit.

C. Folie causée par le remord; Tissor; loc. cit., pag. 383.

H. Honte.

Voy. VITET, cl. v, ord. III, gen. III, esp. II.

Car. Inquiétude que donne le sentiment d'une chose que l'on croit repréhensible à l'appro-

che de ceux qu'on en suppose instruits, avec rougeur du visage, attitude contrainte, et desir de fuir leur présence.

I. Misantropie.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. 111, esp. vIII.

Car. Inquiétude constante avec une sorte de haine pour les hommes, penchant à s'irriter de leurs imperfections, et desir de les fuir.

K. Mysoginie.

Voy. PAW, œuvres philosophiques, tom. v1, pag. 120, 178.

Car. Misantropie ayant les femmes pour objet.

S-esp. VII. Méchanceté.

Le méchant; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. XXIX.

Car. Caractère faisant son habitude du plaisir de nuire volontairement par discours, actions ou intrigues.

Caractère tracé par GRESSET dans la comédie du méchant.

Var. A.

Var. A. Calomnie.

Le calomniateur; VITET, cl. v, ord. ii, gen. XXIX, esp. I.

Car. Méchanceté portant sur des imputations fausses.

B. Médisance.

Le médisant; VITET, cl. V, ord. II, gen. XXIX, esp. II.

Car. Méchanceté portant sur des imputations vraies.

C. Le satyrique.

Voy. VIIEI, cl. v, ord. II, gen. XXIX, esp. III.

Car. Méchanceté ayant pour objet de nuire avec l'arme du ridicule.

S-esp. VII. Frayeur.

Voy. Tissot, traité des nerfs, tome II, part. I, pag. 389. — VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. xvii, esp. v.

Car. Secousse vive et passagère de l'imagination et des sens, à l'aspect d'un danger Tom. II. inattendu, ou par l'impression subite d'un objet sur les sens.

Var. A. Épouvante.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. XVII, esp. IV.

Car. Forte frayeur avec empressement de fuir.

B. Alarme.

Voy. VITET, cl. v, ord. r, gen. xvII, esp. iii.

Car. Frayeur que donne l'approche d'un péril imprévu, avec cris, incertitude dans le jugement et précipitation des mouvemens du corps.

C. Effroi.

Voy. VITET, cl. v, ord. r, gen. XVII; esp. II.

Car. Frayeur profonde avec saisissement subit et violent, frissonnement et immobilité passagère des sens.

A. Manie par effroi; SAUV., cl. VIII, ord. YII, gen. XX, esp. 1, var. B.

B. Épilepsie par effroi; SAUV., cl. IV, ord.
IV, gen. XIX, esp. 7.

D. Terreur.

Voy. VITET, cl. V, ord. I, gen. XVII, esp. I.

Car. Frayeur excessive par quelque circonstance extraordinaire.

A. Oubli pathématique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. 5.

B. Bévue terrorique; Sauv., cl. vIII, ord. 1, gen. III, esp. 9.

C. Amenorrhée terrorique; W. DE Loos, de menstruorum per terrorem obstructorum curá; Utrecht 1767.

Esp. II. Mentisme (pathématique) par un effet des passions.

Voy. Tissot, des effets des passions; traité des nerfs, tom. 11, part. 1, pag. 322.

Bibl. G. Schaw, de morbis ex animi passionibus orientibus; Edinburg. 1735; et coll. d'Édimbourg, tom. 1, pag. 127.

LALLEMANT, essai sur le mécanisme des passions en général; Paris 1751.

Hoin, discours sur l'utilité des passions, etc.; Dijon 1752.

H. P. Juch, de animi pathematibus tanquam causis multorum morborum et mortis; Erford 1753.

A. Heemskerk, de animi pathematum efficaciá in corpus humanum; Lugd.-Batav. 1754.

A. THOMSON, de effectibus pathematum in corpus; Edinb. 1754.

J. Cabbell, de animi pathematihus quatenus morborum causis; Edinb. 1755.

G. BAKER, de offectibus animi et morbis inde oriundis; Cantabr. 1755.

J. APOSTOLOVICKS, de modo quo adfectus animi in corpus humanum agunt, generatim; Halæ 1757.

TH. BAYER, de animi affectibus; Viennæ 1759.

C. Ph. Gelbich de Ostrich, de affectibus animi; Vindobonæ 1766.

TH. COGAN, de animi pathematum vi et modo agendi in judicandis et curandis morbis; 1766.

LE CAT, traité des sensations et des passions en général, et des sens en particulier; Paris 1767 et 1768.

D. BRYAN, de affectibus animi; Edinb. 1782; et diss. med.; Edinb. 1782.

G. MERCER, de pathematibus animi eorumque in corpus humanum effectibus; Edinburg. 1784; et diss. med.; Edinb. 1784.

A. PETIT, mémoire sur l'influence que peu-

vent avoir sur la santé les violentes et subites affections de l'ame; Lyon, an VI.

Bonnefoy, mémoire sur les passions de l'ame; prix de l'acad. de chirurg., tom. V, pag. 865.

Rap. A. Délire pathématique; SAUV, cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 7.

B. Manie pathématique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. I.

Manie mentale; CULLEN, cl. 11, ord. 1V, gen. LXVII, esp. 1.

Manie nerveuse; Fouquet, quæstiones medicæ duodecim, etc., 1777, quæst. 11.

C. Épilepsie pathématique; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 7.

D. Anaphrodisie magique (effet d'une imagination frappée); SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XIII, esp. 3.

S esp. I. Joie.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXII.

Car. Démonstration extérieure d'un sentiment agréable et vif, avec contentement et quelquefois transports d'alégresse.

- A. Hémoptysie mortelle par une joie imprévue; Tissot, loc. cit., pag. 330.
- B. Asphyxie pathématique; Sauv., cl. vi, ord. iv, gen. xxiv, esp. 7.
- C. Tremblement artériel par une joie vive; Tissot, loc. cit., pag. 329.

Tremblement pathématique; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 14.

- D. Délire causé par une grande joie; Tissor, loc. cit., pag. 330.
- E. Hémiplégie à la suite d'une joie imprévue; Tissot, loc. cit., pag. 330.
- F. Distocie pathématique; Sauv., cl. VII, ord. IV, gen. XXVI, esp. 3.

S-esp. II. Espérance.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXI.

Car. Joie intérieure par la persuasion intime de voir combler ses desirs.

Var. A. Espérance de gagner à la loterie, amenant le desir des spéculations; biblioth. britann., littérat., tom. XI, pag. 224.

B. Espérance de gagner au jeu, amenant la passion de jouer. Passion exprimée par REGNARD dans la co-médie du joueur. — Par SAURIN dans le drame de Beverley. — Par LEBRUN dans le drame de la joueuse.

S-esp. III. Amour.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. XXVI.

Bibl. J. DIEZ, de amore; 1771.

De la passion de l'amour, de ses causes et de ses remèdes, etc.; Paris 1782.

VELTER, de morbis amatoriis; Erlang. 1787.

Car. Sentiment plus ou moins vif en faveur d'un objet à qui l'on accorde une prédilection exclusive.

Var. A. Amour sexuel ou entre personnes du sexe.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXVI, esp. 1.

Amour extrême avec inquiétude, agitation, souvent avec jalousie, insomnie, etc.

A. Hecticie par amour; effet tracé par HOFFMAN dans la comédie-opéra de Stratonice.

B. Mélancolie amoureuse; SAUV., cl. VIII, ord. 111, gen. XIX, esp. 2.

Érotomanie; LINNÉ, cl. v, mentales; ord. 111, pathétiques; gen. LXXXII.

C. Folie par amour; Tissot, loc. cit., pag. 339.

Fsfet exposé par l'auteur de la comédie-opéra de Nina ou la folle par amour.

- D. Manie par amour; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp I, var. c. G. RICHTER, de mania erotica; Gotting. 1741; et opusc. medic., tom. III, Francof et Lips. 1781.
- E. Fréné ie aphrodisiaque; SAUV., cl. 111, ord. 11, gen. XI, esp. 9.
- F. Catalepsie par amour; Tissor, loc. cit., pag. 340.
- G. Carus pathématique; SAUV., cl. VI, ord, v, gen. XXX, esp. 11,
 - B. Amour de la gloire.
- A. Délire causé par l'amour de la gloire; Tissot, loc. cit., pag. 341,
- C. Amour-propre.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXVI, esp. 111.

Car. Satisfaction que donne le contentement de soi-même.

S-esp. IV. Desir.

Voy. Tissot, traité des nerfs, tom. 11, part. 1, pag. 343.

Car. Attention soutenue sur un objet au sujet duquel on conçoit des craintes ou des espérances.

Var. A. Ambition.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXII.

Car. Desir actif et souvent inquiet, ayant son élévation pour but.

Caractère tracé par DesTouches dans la comédie de l'ambitieux.

B. Avarice.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXXII.

Car. Desir immodéré d'accumuler des richesses aux dépens de ses propres besoins, avec satisfaction de les posséder, et inquiétude au sujet de leur conservation.

Caractère fortement tracé par Molière dans la comédie de l'avare.

C. Sensualité.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XI.

Car. Desir très-vif, dirigé vers les plaisirs des sens.

D. Gourmandise.

Voy. VITET, cl. v, ord. r, gen. xr, esp. 1.

Car. Desir avide et excessif de manger le plus souvent sans besoin et avec rafinement.

E. Ivrognerie.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XI, esp. 11.

Car. Desir violent de boire des liqueurs fermentées, avec soif, dégoût pour les alimens solides, et le plus souvent avec abrutissement.

S-esp. V. Haine.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. 11, esp. 11.

— Tissot, traité des nerfs, tom. 11, part. 1, pag. 345.

Car. Desir, prenant sa source dans la passion ou dans le ressentiment, de nuire à quelqu'un, avec disposition à blâmer ses actions et à noircir jusques à ses vertus.

A. Névrose par haine; Tissor, loc. cit., pag. 346.

B. Convulsions par haine; Tissor, loc. cit., pag. 345.

Var. A. Aversion.

Voy. VITET, cl. V, ord. II, gen. II, esp. I.

Car. Sentiment haineux que l'on a pour certains défauts ou pour certaines façons d'agir, avec desir de n'en être pas témoin.

B. Envie.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXIV.

Car. Sentiment mêlé de haine et de jalousie, inspiré par le bien ou par les avantages dont on voit les autres jouir.

C. Vengeance.

Le vindicatif; VITET, cl. v, ord. r, gen. XXXIV., esp. IV.

Car. Haine durable avec desir de le prouver à ceux qui en sont l'objet.

D. Le ressentiment.

Voy. VITET, cl. v, ord. III, gen. IV.

Car. Souvenir vif et pénible que l'on conserve d'une offense avec haine et desir de s'en venger. S-esp. VI. Jalousie.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. i, vices de l'imagination; gen. xxv.

Car. Forte inquiétude relative à la possession d'un objet aimé, avec aversion pour ceux qui peuvent inspirer quelque crainte.

Var. A. Jalousie par amour. Voy. VITET, loc. cit., esp. 1.

Passion développée par Molière dans la comédie de l'école des maris. — Par Campis-Tron, dans la comédie du jaloux désabusé. — Par Rochon de Chabanes, dans la comédie du jaloux. — Par Dei Rieu, dans la comédie du jaloux malgré lui. — Par Des-Forges, dans la comédie de la femme jalouse. — Par Barthe, dans la comédie de la mère jalouse.

B. Jalousie par vanité.

Voy. VITET, loc. cit., esp. 11.

Passion exprimée par IMEERT dans la comédie du juloux sans amour.

C. Jalousie par intérêt.
Voy. VITET, loc. cit., esp. 111.

S-esp. VII. Colère.

Le colérique; VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. XXXIV.

- Bibl. J. I. J. DOELLINGTR, de effectibus iræ, medicè consideratæ; Wurzburg 1752.
- A. E. BUCHNER, de iræ noxio et salutari effectu in corpus humanum; Halæ 1757.
- A. Dilatation anévrismatique de l'oreillette gauche du cœur; Tissor, loc. cit., pag. 357.
- B. Rinorragie par colère; Тіssот, loc. cit., pag. 353.
- C. Pneumorragie par colère; Tissot, loc. cit., pag. 353.
- D. Proctorragie par colère; Tissot, loc. cit., pag. 353.
- E. Hémorragie par les lèvres, par les yeux, par diverses parties du corps en même temps; Tissor, loc. cit., pag. 353, 354.
- F. Vomissement par colère; Tissot, loc. cit., pag. 361.
- G. Tremblement pathématique; Sauv., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 14.

H. Bévue par colère; Tissot, loc. cit., pag. 367.

I. Manie par colère; Sauv., cl. VIII, ord.

K. Apoplexie par colère; Tissor, loc. cit., pag. 356-57.

L. Palpitation mortelle; Tissor, loc. cit. pag. 367.

M. Toux très-forte par colère; Tissor, loc. cit., pag. 354.

N. Asthme mortel par colère; Tissot, loc. cit., pag. 354.

O. Oppression cardiaque; Tissor, loc. cit., pag. 354.

P. Cholérée mortelle par colère; Tissot, loc. cit., pag. 362.

Q. Rage par colère; berlinische sammlungen, etc. ster band, part. IV, art. I, pag. 334.

R. Paralysie par colère; Tissot, loc. cit., pag. 358.

S. Ischurie mortelle; Tissor, loc. cit., pag. 368.

T. Diarrhée par colère; Tissot, loc. cit., pag. 361.

U. Fièvre mortelle; Tissot, loc. cit., pag. 366.

V. Erysipèle par colère; Tissor, loc. cit., pag. 358.

X. Pleurésie par colère; Tissot, loc. cit., pag. 354.

Y. Jaunisse par colère; Tissor, loc. cit., pag. 364.

Var. A. Le violent.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXXIV, esp. 1.

Car. Aptitude constante à lutter impétueusement contre les obstacles; avec rougeur du visage, œil étincelant et menaces.

B. L'emporté.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXXIV, esp. II.

Car. Disposition à s'abandonner par accès et sans réflexion à des paroles vives et véhémentes, avec éclat de voix et mouvemens trèsprompts du corps, contre ceux qui nous résistent.

C. L'impatient.

Voy. VITET, cl. V, ord. I, gen. XXXIV, esp. III.

Car. Caractère inquiet et toujours disposé

à avoir de l'humeur au plus léger obstacle, avec paroles vives et coupées, trépignement et contraction des différentes parties du visage.

Gen. XXVII. AGRYPNIE.

Eth. d'a, privatif; et ypnos, sommeil.

Syn. Agrypnie; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. IV, anomales; gen. XXII. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. IV, anomales; gen. XXIV.

Bibl. A. B. HEBENSTREIT, de morbis ex pervigi'io; Lipsiæ 1740.

W. Oudenaarden, de vigilio sano et morboso; Lugd.-Batav. 1757.

Car. Privation du sommeil avec fatigue et épuisement des forces.

Gen. XXVIII. NÉVROSE.

Eth. de nevron nerf.

Syn. Névroses; Cullen, cl. 11. — PINEL, cl. 1V. — Tourtelle, cl. IV.

6. I.er

Névroses pyrétiques.

Esp. I. Névrose (pyrétique) avec lésion apparente de la circulation.

Syn. Fièvre nerveuse; pyréto-névrie.

Fièvres ataxiques; SELLE, pyretol. method. edit. 3; Berol. 1789; ord. 111, pag. 299.

— PINEL, cl. 1, pyrexies; ord. v.

Bibl. R. A. Vogel, de febre nervosa, ejusque genuina indole; Gotting. 1767.

Car. Lésion de la circulation sanguine, jointe à des symptômes nerveux.

S-esp. I. Lente.

Syn. Typhus I et 2 HIPPOCRATIS; voya comment. Lips., toma XXXII, pag. 629.

Typhos nerveux; Home, clinical experiments histories and dissections, etc.; Lond. 1781; sect. 11.

Bibl. E. G. BALDINGER, progr. sistens illustrationem malignitatis in morbis ex mente HIPPOCRATIS, per recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem; Gotting. 1776.

Tom. II.

I. G. CARELSON, de symptomatologià et ætiologià febris lentæ nervosæ; Gotting. 1782.

M. D. CAMPHELL, observations on the typhus, etc.; Lond. 1785.

M. WALL, clinical observations on the use of opium in low fevers and in the synochus, etc.; Lond. 1786.

S. Herz, observ. de febribus nervosis; Be-rol. 1789.

Car. Après un frisson et des horripilations vagues et passagères, on trouve une affection du cerveau avec regard vif, pouls serré et lent, sensibilité plus vive de certains sens, avec insomnie ou sommeil léger et inquiet, anxiétés profondes et tendance à un état général de laxité vibratile.

Var. A. Fièvre du plus mauvais caractère en 1711; MORGAGNI, de sedib. et caus. morb.; epistol. VII, art. 16.

B. Maladie épidémique de Rouvray-Saint-Denis, en 1779; Teissier, hist. et mém. de la soc. roy. de médec. de Paris, ann. 1779, pag. 23 des mém.

C. Fièvre nerveuse épidémique à Halle, en

- 1787; J. CH. REIL, memorabilium clinicorum medico-practicorum, vol. 1, fasc. 1; Halæ 1790, sect. 1.
- D. Fièvre épidémique d'Oxford, en 1785; M. WALLS, journ. de médec., novembre 1791, tom. LXXXIX, pag. 165. Et février 1792, tom. CX, pag. 272.
- E. Constitution épidémique de Jena, en 1791; Ph. I. HARTLAUB, dissert. medic. sistens descriptionem constitutionis epidemicæ sub fine præteriti anni Jenæ grassatæ, etc.; Jena 1792.
- Rap. A. Fièvre cérébrale. Voy. M. CHAR-DEL, observations pour servir à l'histoire de la fièvre cérébrale; Paris an 8. — Godefroy, mémoires de la société médicale d'émulation, 4.° année; Paris an IX, pag. 141.
- B. Hectique vespertine (ne formant point une maladie et ne faisant qu'exprimer un effet de l'action nerveuse, sur-tout chez les êtres sensibles); SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. V, ésp. 2.
- C. Hectique nerveuse; SAUV., loc. cit., esp. 13.
- D. Quotidienne hystérique; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. 1X, esp. 3.

E. Synochus tarentulé; SAUV., cl. 11, ord.

1, gen. 111, esp. 11.

F. Peste sporadique; SAUV., cl. 111, ord. 1, gen. 1, esp. 4.

G. Oubli fébrique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. 8.

S-esp. II. Vive.

Bibl. F. G. BUTTNER, de febribus nevrosis acutis; Gotting. 1786.

Car. Chaleur plus sensible et pouls plus relevé que dans la fièvre nerveuse lente; la marche de la maladie est plus rapide.

Rap. A. Fièvre nerveuse aiguë par contagion; Selle, pyretol, pag. 309.

B. Fièvre ataxique par contagion; PINEL, cl. 1, ord. v, gen. XII.

6. I T.

Névroses apyrétiques.

Esp. II. Névrose (spasmodique) avec lésion manifeste de l'action tonique.

Syn. Spasme; maux de nerfs.

Bibl. RAULIN, traité des affections vaporeuses du sexe; Paris 1756. P. Hunauld, dissert. sur les vapeurs et sur les pertes de sang; Paris 1756.

BOIRHAAVE, prælectiones de morbis nervorum; Lugd.-Batav. 1761.

W. SMI:H, dissertation upon the nerves; Lond. 1768.

PRESSAVIN, nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies des nerfs; Lyon 1770.

La philosophie des vapeurs, etc.; Lausanne 1774.

S. Musgrave, speculations and conjectures on the qualities of the nerves; Lond. 1776.

Tissot, traité des nerfs et de leurs maladies; Paris et Lausanne 1779.

F. H. BRUCKMANN, de morbis nervorum observationes singulares; Gotting. 1780.

Pomme, traité des affections vaporeuses des deux sexes, ou maladies nerveuses vulgairement appelées maux de nerfs; Paris in-4.º 1782.

Beauchène, de l'influence des affections de l'ame sur les maladies nerveuses des femmes, 2.º édit.; Paris 1783.

Schoeffer; versuche aus der theoretischen arzneykunde, etc.; Nuremb. 1785.

Esp. III. Spasme.

Bibl. J. JUNCKER, de spasmis eorumque quadruplici respectu; Halæ-Magd. 1754.

C. F. KALTSCHMID, de affectibus spasmo-dicis vagis; Jenæ 1754.

H. P. Juch, de spasmo in genere; Erford.

F. A. CARTHEUSER, de spasmis in genere; Francof. ad Viad. 1764.

I. STEVART, de spasmo; coll. de WEBSTER, tom. 11, 1781, diss. 12, pag. 164.

I. S. Kohler, morbi spasmodici aliquot historiæ; Soraviæ 1778.

Car. Le sentiment et le mouvement sont lésés sans indices de gastronévrie, ni de métronévrie.

Rap. A. Ph. A. Boehmer, de spasmorum externorum ratione ad viscera, indeque oriunda morborum complicatione; Halæ 1762.

B. Spasme dorsal (affection spasmodique des muscles du dos, tendant à se terminer par une éruption); R. Worthington, a treatise on the dorsal spasm, etc.; Lond. 1792.

S-esp. I. Cohibant.

Resserrement par spasme.

Var. A. Métose (phthisie de la prunelle). Constriction spasmodique de la prunelle.

J. F. Weissenborn, de pupilla nimis coarctata vel clausa; Erford 1773.

Amaurose myosique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 7.

B. Intestinal.

Anxiétés abdominales, avec cette circonstance que les excrémens, quelques délayans qu'on emploie, représentent des fils passés à la filière et imbibés ou recouverts de matières glaireuses comme d'un vernis.

Voy. LORRY, observ. sur un genre particulier de colique et de constipation; hist. et mém. de la soc. roy. de méd., ann. 1777-78, pag. 193 de l'hist.

C. Rétrécissement du rectum; E. DERRE-CAGAIX, journ. de chirurg., tom. 1, pag. 268; et journ. de méd., tom. xc, pag. 49.

Faits d'anatomie pathologique.

Rétrécissement considérable de l'aorte pectorale; journ. de chirurg., tom. 11, pag. 107; et journ. de médec., tom. XCI, pag.

Constipation constrictive; EHRHARD, nova.

acta natur. curios., tom. VIII; Nuremb. 1791; art. 40.

S-esp. II. Flatueux.

Spasme avec production prédominante de flatuosités.

Maladie flatulente, morbus ructuosus d'HIP?
POCRATE.

A. O. GOELICKE, de morbo ructuoso HIP-POCRATIS; Francof ad Viad. 1738; et BAL-DINGER, select. doct. viror. opusc.; Gotting. 1782, diss. v, pag. 142.

Voy. G. L. MARUGI, le malatie flatuose; in Napoli, tom. 1, 1786; tom. 11, 1787.

Nota bene, La maladie flatueuse existe si souvent sans apparence de flatulence, Gen. XVII, Esp. II, S-esp. V, ou de gastronévrie, Gen. XXVIII, Esp. III, qu'on n'a pu se refuser d'en faire une sous-es pèce de spasme,

Formes.

Sor. 1. Sciatique nerveuse; Cotugno, de ischiade nervosa commentarius; Viennæ 1770.

— J. Petrini, de ischiade nervosa; 1785.

2. Lypothimie stomachique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXII, esp. 2.

- A. Syncope stomachique; SAUV., loc. cit., esp. 13.
- 3. Amblyopie méridienne (les objets n'étant bien aperçus que dans l'obscurité ou pendant la nuit); Sauv., cl. vi, ord. i, gen. iii, esp. 2. Nyctalopie d'Hippocrate. Sail-Lant, mémoire sur l'espèce de nyctalopie ou vue de nuit dont parle Hippocrate; hist. de la soc. roy. de méd., ann. 1786, tom. viii, pag. 121. Dysopie luminique; Cullen, cl. Iv, ord. i, gen. xciv, esp. 2.
- A. Strabisme équinoxial; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. I, esp. 10.
- 4. Anorexie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XI, esp. 5.
- 5. Nausée marine; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XII, esp. 12.
- 6. Vomissement marin; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. 25.— B. Ludwig, de vomitu navigantium; Lips. 1738.

Vomissement hémorragique; SAUV.; cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. 28.

Vomissement sympathique; P. C. ABILGAARD, societ. med. haun. collect., vol. 1, Hauniæ 1774, art. 22, pag. 176 (effet de la ligature d'un sarcome au front).

- 7. Ivresse convulsive; PERCY, journ. de médec., août 1792, tom. XCI, pag. 349; et août 1793, tom. XCIV, pag. 366.
- 8. Tremblement cafétique; Sauv., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 4.
- 9. Bévue spasmodique; SAUV., cl. VIII, ord.
 1, gen. III, esp. 2.
- 10. Anxiétés; B. HAMBERGER, de anxietatibus; Jenæ 1750.
- 11. Catalepsie vermineuse; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXV, esp. 2.
- 12. Carus nystagmique; SAUV., cl. VI, ord.V, gen. XXX; esp. 17.
- 13. Épilepsie sympathique; SAUV., cl. IV, ord. 111, gen. XIX, esp. 8.
- 14. DE BERGEN, de morbo spasmodico convulsivo contagii experte; Franc. ad Viad. 1742.
- 15. Asthme spasmodique; B. Rush, a dissertation on the spasmodic asthma, etc.; Lond. 1770. Th. Ryan, de asthmate spasmodico Lond. 1784; et diss. med.; Edinb. 1784, art. 13. J. MILLAR, de asthmate spasmodico; coll. de Webster, tom. 11, 1781, diss. 9, pag. 124.
- 16. Hypocondrie phthisique; SAUV, cl. VIII, ord. I, gen. V, esp. 6.

Phthisie nerveuse; PH. F. W. SEIP, de phthisi nervosa; Gotting. 1773.

- 17. Dysphagie spasmodique; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 1.
- A. Dysphagie nauséeuse; SAUV., loc. cit., esp. 9.
- 18. Pleurodynie spasmodique; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. XI, esp. 9.
- 19. Amaurose spasmodique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 8.
- 20. Aphonie spasmodique; C. SMYTH, me-dical communications, etc., vol. 11; Lond. 1790, art. XXXIII.
- 21. Mutité spasmodique; SAUV., cl. VI, ord. 111, gen. XIV, esp. 6.
- 22. Dyshæmorrhée spasmodique; Buxtorf, acta helvetica, vol. VII; Basil. 1772, art. II, pag. 90.
- 23. Ischurie néphrospastique; SAUV., cl. x, ord. 111, gen. XIX, esp. 5.
- A. Ischurie cystospastique, SAUV., loc. cit., esp. 20.
- 24. Diarrhée hypercathartique; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XVI, esp. 16.
- 25. Diabète insipide; Cullen, cl. 11, ord. 111, sect. 111, gen. LXII, esp. 2.
- A. Diabète légitime; SAUV., cl. IX, ord. 111, gen. XXV, esp. 1.

Diurèse; Vogel, cl. 11, flux; ord. 11, apocénoses; gen. cxiv.

- 26. Tumeur par absorption; Soemmering, de morbis vasorum absorbentium; Francfortsur-le-Mein, 1795.
- 27. Tympanite spasmodique; SAUV., cl. x, ord. 111, gen. XVII, esp. 5.

28. Dyssenterie cathartique; SAUV.; cl. IX, ord. 11, gen. X, esp. 12.

- 29. Jaunisse accidentelle; SAUV., cl. x, ord. VI, gen. XXXII, esp. 2.
- 30. Ictère spasmodique des enfans; G. F. H. BRUNING, de ictero spasmodico infantum essendiæ anno 1772 epidemico; Vesal. et Lips. 1773.
- 31. Gangrène sèche avec douleur gravative, devenant brûlante avec amaigrissement, des-sèchement et noirceur.

Mortification des orteils et des pieds; Per-CIVAL POTT, chirurgical observations relative to the cataract, the polypus of the nose, the cancer of the scrotum, the different kinds of rupture the mortification of the toes and feet; Lond. 1775.

Rhumatisme convulsif; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. III, esp. 15.

Esp. IV. Névrose (hypocondrique) avec lésion apparente des organes appartienant aux hypocondres.

Syn. Hypocondrie, maladie hypocondriaque; et mieux sans doute gastronévrie, de gaster, ventre, estomac; et nevron, nerf.

Hypocondrie (hypocondriasis); SAUVA-GES, cl. VIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. v. — LINNÉ, cl. v, mentales; ord. II, imaginaires; gen. LXXVI. — VOGEL, cl. v, gen. CCXVIII. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. II, adynamies; gen. XLVI — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. v. — PINEL, cl. IV, névroses; ord. I, vésanies; gen. XLV.

Maladie hypocondriaque; Juncker, tab.

Névrose avec affection dominante des nerfs de l'estomac; LAROCHE.

Bibl. STAHL, de malo hypocondriaco et hysterico; Halæ 1703.

RICHTER, de moibo hypocondriaco; Gotting. 1739; et opusc. médic., tom. 1, pag. 28.

- F. CH. STRUVE, de acido hypocondriacorum; Kiliæ 1750.
- I. F. CARTHEUSER, de passione hypocondriaca; Francof. ad Viad. 1751.

- A. DE HALLER, de malo hypocondriaco; Gotting. 1752.
- M. Alberti, de morbis imaginariis hypocondriacorum; Halæ-Magdeb. 1755.
- G. B. FABER, ulterior expositio novæ methodi kæempfianæ curandi morbos chronicos inveteratos, præcipue malum hypocondriacum; Tubingæ 1755 (a).
- I. CH. STOCK, de affectu hypocondriaco; Jenæ 1755.
- G. B. Moretti, del mal de nervi, o sia dell ipochondria, o del morbo isterico; poema medico del doct. M. Fleming; Romæ 1756.
- H. F. Delius, nonnulla ad malum hypocondriacum spectantia; Erlang. 1757.
- A. FRACASSINI, opusc. pathol. alterum de febribus, alterum de malo hypocondriaco; Gryphiswaldiæ 1757.
 - J. F. RUBEL, die mittel, wie denen hypo-

⁽a) Quelques ouvrages ont été publiés sur la même matière, sans porter un titre aussi significatif. Voyez J. KAEMPF, de infarctibus vasorum ventriculi; Basileæ 1751. — D. E. KOCH, de infarctibus vasorum in infimo ventre; Argent. 1752. — I. G. SCHMID, de concrementis uteri; Basileæ 1753. — G. F. SIGWART, de infarctibus venarum abdominalium internarum, eorumque resolutione per enemata potissimum instituenda; Tubing. 1754.

- chondriacis, melancholicis, maniacis, etc.;
 Breslau 1758.
- S. A. PONTICELLI di tre specie d'affezione isterica e iponchondriaca, etc.; in Lucca 1759.
- G. E. ZEVIANI, trattato del flato a favore degl'ipocondriaci; in Verona 1761.
- P.S. GARBOE, dissert. sistens experimenta quædam circa malum hypocondriacum; Halæ 1762.
- J. HILL, hypocondriasis; or a practical treatise, etc.; Lond. 1766.
- E. A. BUCHNER, de vero ortu mali hypocondriaci et hysterici; Halæ ad Salam 1769.

GATTENHOFF, hypocondriasis; Heidelberg 1769; et coll. de Franck, tom. 1, pag. 1.

- A. HAY, de affectionibus hystericis et hypocondriacis; 1765.
- F. G. KRAEXFAENGER, de mali hypocondriaci ad minimum sextuplici specie; Duisburg ad Rhen. 1771.
- H. C. BRODKORB, de affectione hypocondriaca ac hysterica; Erford 1772.

OEHME, uber die hypochondrie; Dresden 1777.

S. BAYNES, de hypocondriasi; Edinburg, 1777; et coll. de WEBSTER, tom. 11, 1781, diss. 2, pag. 17.

A. Comparetti, occursus medici, de vagá ægritudine infirmitatis nervorum; Venetiis 1780.

REVEILLON, recherches sur la cause des affections hypocondriaques, appelées communément vapeurs, etc.; Paris 1779; en allemand, Gotha 1781.

STOLL, de morbo hypocondriaco; dissert. medic. edente EYEREL, tom. 11, 1782, pag. 394.

- J. KEMPF, etc., fur aerzte und kranke bestimmte abhandlung von einer nevers methode die harnaeckigsten krankheiten, die ihren sitz im unterleibe haben, besonders die hypochondrie, etc.; Frankfort 1784; en hollandais, 1787.
- J. RYMER, a tract upon the indigestion and the hypochondriæ disease; London 1786.

Car. Flatuosités incommodes donnant lieu à des rots, des vents, à des tensions spasmodiques dans diverses parties de l'abdomen, et manifestant le trouble qui domine dans les fonctions de la digestion; avec trouble fugace dans les idées, et disposition constante à la tristesse, à la crainte.

Rap. A. Hypocondrie mélancolique; SAUV. loc. cit., esp. 3.

B. Hypocondrie bilieuse; SAUV. loc. cit. esp. 1: Voyez D. G. H. HOPP, nouvelle méthode

d'expliquer les symptômes des hypocondriaques; hamburgische magazin, etc.; achter band (vol. VIII); Hamburg. 1751, pag. 604. --- vol. XI, pag. 339. - vier zenhter band (vols XIV), pag. 480.

Formes:

Sor. i. Froid hypocondriaque; SAUV., cla VIII, ord. 1, gen. V, esp. 10.

2. Vomissement hypocondriaque; Sauv., cla ix, ord. II, gen. xiII; esp. 9.

3. Flatulence hypocondriaque; SAUV., cla ix, ord. iv, gen. xxxiv, esp. 3.

A. Flatulence convulsive; SAUV., loc. cit., esp. 7.

4. Vertige hypocondriaque; HIRZ, loc. cit. esp. 7.

5. Cochemar hypocondriaque; Sauv., cl. v, ord. 1, gen. 1; esp. 6.

6. Contracture hypocondriaque; SAUV. > cl. IV, ord. I, gen. IV, esp. I.

7. Carus hypocondriaque; SAUV., cl. VI, ord. v, gen. xxx, esp. 13.

Tom. II.

8. Asthme hypocondriaque; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. VIII, esp. 4. — F. L. WOLF, de asthmate hypocondriaco; Argentor. 1754.

9. Phthisie hypocondriaque; Sauv., cl. x, ord. 1, gen. 111, esp. 16.

cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 16.

11. Constipation hypocondriaque; Cullen, cl. IV, ord. V, gen. CXXIII, esp. 2.

12. Diarrhée hypocondriaque; J. J. Sen-GER, de diarrhea hypocondriaca; Erford 1752.

13. Salivation hypocondriaque; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXIII, esp. 8.

Esp. IV. (a) Névrose (métrique) avec lésion sensible de l'action de la matrice.

Syn. Hystérie, affection hystérique; et mieux sans doute métronévrie, de metra, matrice, et nevron, nerf.

Hystérie, hysteria; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XX.

⁽a) Par une erreur typographique on a mis, pag. 324 lig. 19, Esp. II, désignation qui ne doit pas subsister; pag. 216 lig. 1, Esp. III, il faut Esp. II; pag. 332 lig. 25, Esp. IV, il faut Esp. III. Le lecteur est invité à faire cet errata.

LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. 1, spastiques; gen. CXXVI. — VOGEL, cl. V, spasmes; gen. CCXIX. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III; spasmes; gen. LXIII. — SAGAR, cl. VII; spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XXI. — PINEL, cl. IV, névroses; ord. 1, vésanies; gen. XLVIII.

Mal hystérique; Juncker, tab. xxxvii.

Névrose avec affection dominante des organes de la génération; LAROCHE.

Maladies nerveuses hystériques; Beauchène, esp. 2.

Suffocation de matrice, hystérique. Fureur utérine de quelques-uns. Mal de mère du peuple.

Bibl. RICHTER, de malo hysterico; Gotting. 1741; et opusc. medic., tom. 1, pag. 94.

P. S. DE CHAUFEPIÉ, de malo hysterico; Lugd-Batav. 1752.

J. Juncker, de commodis ambiguis ex matrimonio hystericarum; Halæ-Magdeb. 1755.

CH. PERRY, a mechanical account and explication of the hysteric passion, etc.; Lond. 1755.

A. UVEN, de mali hysterici symptomatum diversitate ob regionum et vitæ regiminis di-

versitatem, habita præsertim ratione ad hystericas in frisia orientali; Halæ 1762.

J. W. BAUMER, de mali hysterici verā indole et curatione; Erfordiæ 1763.

C. RICHARDSON, de malo hysterico; Edinb. 1763.

F. MITTERBACHER, de secretione urinæ fæminarum hystericarum, et de ea ut signo affectionum hystericarum; Pragæ 1764.

L. VAN STEVENINCK, de hysterică passione; Lugd.-Bat. 1766.

PH. B. BOEHMER, de causis cur malum hystericum morbum malo hypocondriaco majorem constituat? Halæ 1772.

J. LANG, de passione hysterica; Vind. 1776.

H. WOOLCOMBE, de hysteriä; Edinb. 1777; et coll. de WEBSTER, tom. 11, 1781, art. 8, pag. 109.

E. W. L. MEURS, de differentiá passionis hystericæ à morbis convulsivis relinquis; Duisburgæ 1780.

STOLL, morbus hystericus; diss. med., tom. 11, 1782, pag. 38.

R. GROAT, de hysteriä; Edinb. 1783; et dissert. medic.; Edinb., ann. 1783.

Car. Gonflement et murmures du ventre.

avec le sentiment d'un globe qui roule et monte de l'hypogastre dans l'estomac et au gosier, où il produit un étranglement; avec assoupissement par intervalles, quelquefois convulsion ou délire fugace; urines abondantes et limpides.

S-esp. I. Flatulente; W. ROWLEY, a treatise on female, nervous, hysterical, hypochondriacal, etc.; Lond. 1789; en allemand par MICHAELIS; Breslaw 1790.

S-esp. II. Convulsive; W. ROWLEY, loc. cit.

S-esp. III. Stertoreuse; W. ROWLEY, loc. cit.

. - 1 7.

Formes.

Sor. 1. Sciatique hystérique; SAUV., cl. VII, ord. v, gen. xxxi, esp. 3.

2. Édématie hystérique; SAUV., cl. X, ord. 11, gen. VIII, esp. 2.

3. Anasarque hystérique; Sauv., cl. x, ord. 11, gen. VII, esp. 6.

4. Syncope hystérique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 6.

5. Asphyxic hystérique; Sauv., el. vI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 8.

- 6. Vertige hystérique; SAUV., cl. VIII, ord., esp. 3.
- 7. Agrypnie hystérique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 3.
- 8. Hypocondrie hystérique; Sauv., cl. VIII, ord. 1, gen. v, esp. 5.
- 9. Délire hystérique; SAUV., cl. VIII, ord. 111, gen. XVII, esp. 12. — A. NUNN, de delirio hystérico; Erfordiæ 1762.
- ord, 11, gen. XIV, esp. 6.
- TI. Tétane hystérique (vraie épilepsie avec convulsion tonique); SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. 12.
 - ord. v, gen. xxv, esp. 1.
- 13. Carus hystérique; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXX, esp. 9.
- 14. Apoplexie hystérique; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXXI, esp. 4.
- 15. Épilepsie utérine; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 4. Busch, neves magazin fur aerzte, etc., zehnter band (vol. X); Leips. 1788, pag. 566.
- 16. Palpitation hystérique; Sauv., cl. IV, ord. III, gen. XV, esp. 12.

- 17. Toux hystérique; SAUV., cl. v, ord. 1, gen. v, esp. 2.
- 18. Asthme hystérique; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. VIII, esp. 3.
- 19. Orthopnée hystérique; Sauv., cl. v, ord. 11, gen. IX, esp. 4.
- 20. Céphalalgie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. 11, gen. XI, esp. 12.
- A. Migraine clou; SAUV., cl. VII, ord. 11, gen. XIII, esp. 6.
- 21. Odontalgie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. 11, gen. XVI, esp. 8.
- 22. Dysphagie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. 111, gen. XVII, esp. 2.
- 23. Pleurodynie (thoraxialgie) hystérique; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. x1, esp. 6.
- 24. Gastrodynie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 14.
- A. Gastrodynie pulsatile; SAUV., loc. cit., esp. 13.
- 25. Colique hystérique; Sauv., cl. vii, ord. Iv, gen. XXII, esp. 17. F. A. Neuhaus, diss. sistens colicæ hystericæ casum cum sua epicrisi; Argentor. 1769.
- ord. IV, gen. XXV, esp. 5.

- 27. Dysurie hystérique; SAUV., cl. IX, ord, III, gen. XXVII, esp. I.
- 28. Hystéralgie vaporeuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXVII, esp. 10.
- ord. 1, gen. IV, esp. 15.
- 30. Aphonie hystérique; Sauv., cl. vi, ord.
- 31. Constipation hystérique; AASKOW, soc, med. Haun. collect., vol. 11; Hauniæ 1775, art. 2, pag. 9.
- 32. Larmoyement pathématique; Sauv., cl. IX, ord. III, gen. XXI, esp. I.
- 33. Diabète hystérique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXV, esp. 3.
- 34. Météorisme hystérique; SAUV., cl. X, ord. 111, gen. XVIII, esp. 3.
- 35. Pneumatose hystérique; Sauv., cl. x, ord. 11, gen. vI, esp. 3.
- 36. Rhumatisme hystérique; Sauv., cl. vII, ord. I, gen. III, esp. 7.
- 37. Jaunisse hystérique; SAUV., cl. x, ord, vi, gen. xxxII, esp. 13.

Gen. XXIX. PARAPHRYNIE.

Eth, de para, proche; et phrin, esprit.
Syn, Vésanies; SAUVAGES, cl. VIII. - CUL-

LEN, cl. II, névroses; ord. IV. SAGAR, cl. XIII, vésanies.

Car. Aliénation totale de l'esprit; folie.

Esp. I. Délire.

Eth. du verbe latin deliro, je rêve, j'extravague; provenant lui-même de lira, un sillon. Ainsi délire signifie, au propre, s'écarter du sillon; et au figuré, du droit chemin de la raison.

Syn. Délire, paraphrosyne; Sauvages, cl. VIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XVII.

— LINNÉ, cl. v, mentales; ord. 1, idéales; gen. LXVI. — VOGEL, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXX. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XVIII.

Transport au cerveau.

Bibl. J. Juncker, de chronicis deliriis legitime curandis; Halæ-Magdeb. 1754.

E. A. NICOLAI, dem rasen und phantasiren; Copenhagen 1758.

J. N. PEZOLD, de delirio febrili; Lips. 1762.

E. A. NICOLAI, de deliriis; Jenæ 1763.

P. Steven, de deliriis; Gotting. 1782.

Car. Folie active avec fièvre.

S-esp. I. Délire doux, tranquille.

S-esp. II. Délire fort, agité.

Frénésie; P. LUTRAND, considérations médicales sur la frénésie; Montpellier, an x.

Esp. II. Manie.

Eth. Mania, de mainomai, je suis en fureur, je suis fou.

Syn. Manie; Sauvages, cl. VIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XX. — LINNÉ, cl. V, mentales; ord. I, idéales; gen. LXVIII. — Vogel, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXXI. — Cullen, cl. II, névroses; ord. IV, vésanies; gen. LXVII. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. II, délires; gen. XXII. — PINEL, cl. IV, névroses; ord. I, vésanies; gen. XLVII.

Bibl. J. BENEDEK, de mania et statu maniacorum in paroxismo constitutorum; Traj. ad Rhen. 1762.

M. Locher, observ. pract. circa luem veneream, epilepsiam et maniam; Brux. 1764.

D. STUART, de maniā; Edinb.; et coll. de Webster, tom. 11, 1781, pag. 255.

TH. ARNOLD, observations on the nature, kinds, causes and prevention of insanity, etc.; Lond. 1782-86.

PARGETER, observations on maniacal disorders, etc.; Lond. 1792.

PINEL, mémoire sur la manie périodique ou intermittente; Paris, an VI-1798.

- Traité médico philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie; Paris, an VIII.

Car. Folie avec fureur sans fièvre.

S-esp. I. Manie (vulgaire) que n'a précédé, ni aucune affection de l'ame, ni aucun vice sensible du corps; Sauv., cl. vni, ord. 111, gen. xx, esp. 7.

A. Manie obscure; Cullen, cl. 11, ord. IV, gen. LXVII, esp. 2.

S-esp. II. Manie (périodique) quelquefois soumise à des apparences d'influence solaire ou lunaire; Sauv., loc. cit., esp. 6.

Paraphrosyne; Linné, cl. v, ord. I, gen. LXVI.

A. Manie humorale; Fouquet, quæst. med. duodecim pro regiā cathedrā vacante, etc., thes. XI.

Gen. XXX. SALACISME.

Eth. de salacitas, substantif latin qui veut dire penchant aux plaisirs vénériens.

Syn. Satyriase; LINNÉ, cl. v, mentales; ord. 111, pathétiques; gen. 81.

Manie; Vogel, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXXI.

Car. Penchant insurmontable pour les plaissirs de l'amour physique, qu'on cherche à remplir sans honte et avec la plus vive ardeur.

Esp. I. Masculin.

Syn. Satyriase, satyriasis; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. XIII.

— Cullen, cl. IV, locales; ord. II, dysorexies; sect. I, appétits erronés; gen. CIV.

— SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. XIII.

Car. Salacisme dans les hommes.

S-esp. I. Satyriase (des jeunes-gens) avec desir immodéré pour les plaisirs de l'amour, et un leger trouble du corps; Cullen, loc. cit., esp. 1.

Satyriase néogamique; SAUV., loc. cit., esp. 5.

S-esp. II. Satyriase (furieux) avec un desir effréné pour le coït, auquel se joint

un grand trouble du corps; Cullen, loc. cit., esp. 2.

Satyriase aigu; SAUV., loc. cit., esp. 1.

Esp. II. Féminin.

Syn. Métromanie.

Nymphomanie; Sauvages, cl. VIII, vésanies; ord. 11, morosités; gen. XIV. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. 11, dysorexies; sect. 1, appétits erronés; gen. CV. — SAGAR, cl. XIII, ord. 11, morosités; gen. XIV.

Tentigo des latins.

Mélancolie utérine de NENTER.

· Hystéromanie de BOECLER.

Métromanie d'Astruc.

Fureur utérine.

Bibl. D. T. DE BIENVILLE, la nymphomanie ou traité de la fureur utérine; Amsterdam 1771; en allemand 1772; en anglais 1775.

Car. Salacisme dans les personnes du sexe.

Var. A. Nymphomanie salacitique; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Nymphomanie furibonde; SAUV., loc. cit., esp. 2.

S-esp. I. Métromanie (douloureuse) avec douleur dans l'acte irrésistible du coït.

Nymphomanie douloureuse; Sauv., loc. cit., esp. 3.

Hystéralgie prurigineuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXVII, esp. 7.

Gen. XXXI. TONISME.

Eth. de tonus, ton; indiquant des maladies par excès et permanence de l'action tonique.

Car. Le corps est affecté dans une ou plusieurs de ses parties d'une rigidité constante et excessive.

§. I. er Général.

Esp. I. Tétane.

Eth. de tetanos, convulsion droite et roide.

Syn. Tetanos; Sauvages, cl. IV, spasmes; ord. II, toniques généraux; gen. VII.—
LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. I, spastiques; gen. CXXVII.— VOGEL, cl. V, spasmes, gen. CLXXX.— Cullen, cl. II, névroses; ord.
III, spasmes; sect. I, dans les fonctions animales; gen. XLVIII.— SAGAR, cl. VII,

spasmes; ord. II, toniques généraux; gen. VII. — PINEL, cl. IV, névroses; ord. II, spasmes; gen. VII.

Bibl. J. G. KRUGER, de opisthotono, emprosthotono et tetano; Helmstad 1754.

L. CHALMERS, mémoire sur l'opisthotone et le tétane; medical observations and inquiries; etc.; tom. 1; Lond. 1758, art. 12, pag. 87.

CH. L. BILFINGER, de tetano liber singularis, etc.; Lindaviæ 1763.

J. G. BAUMER, de tetano; Giess. 1775.

BAJON, mémoire sur le tétanos; mém. sur Cayenne et sur la Guyane française; Paris 1777.

J. C. STARKE, de tetano ejusque speciebus etc.; Jence 1778.

G. Munro, de tetano; Edinb. 1783; coll. d'Edimbourg, tom. IV, pag. 324. — Dissert. med. Edimburg. 1783.

Dissertation et observations sur le tetanos, publiées par le cercle des Philadelphes; au Cap français 1786.

DAZILLE, observations sur le tetanos, ses différences, ses causes, ses symptômes, etc.; Paris 1788.

CURRIE, memoirs of the medical society of London, etc.; Lond. 1792, art. 12.

N. HEURTELOUP, précis sur le tétanos des adultes; Paris, an v.

Car. Rigidité spasmodique de tous les muscles, ou d'un très-grand nombre de muscles à la fois.

Rap. A. Tétane indien; SAUV., loc. cit., esp. 5.

B. Convulsion indienne; SAUV., cl. IV, ordo

C. Tétane; BAJON, loc. cit., esp. 1.

Var. A. Holotonique; occupant tout le corps; SAUV., loc. cit., esp. 4.

Tétane tonique; SAUV., ibid, esp. 1.

B. Opisthotonique, renversant le corps en arrière; Sauv., loc. cit., esp. 3.

Opisthotone; Vogel; cl. v, gen. CLXXXI.

C. Emprosthotonique, pliant le corps en avant; Sauv., loc. cit., esp. 2.

Episthotone; Vogel, cl. v, gen. CLXXXII...

—. J. G. BAUMER, de emprosthotono; Giessæ
1776.

D. Tetane latéral; SAUV., loc. cit., esp. 6.
S-esp. I.

S-esp. I. Pyrétique.

La marche de la maladie est vive, il y a sièvre, le plus souvent mortelle.

S-esp. II. Apyrétique.

Syn. Catoche, catochus; Sauvages, cl. IV, spasmes; ord. 11, toniques généraux; gen. VIII. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. 11, toniques généraux; gen. VIII.

Car. Le cours de la maladie est lent, il n'y a point de sièvre, et l'espoir sur la guérison est fondé.

Rap. A. Tétane; Bajon, loc. cit., esp. 2.

B. Catoche holotonique, SAUV., loc. cit., esp. 1.

C. Catoche cervin; SAUV., loc. cit., esp. 2-

S-esp. III. Anæsthésique.

Syn. Catochus; LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. I, spastiques; gen. CXXVIII.

Car. Tétane avec insensibilité.

S-esp. IV. Comateux.

Syn. Catochus; Vogel, cl. v, spasmes; gen. CLXXXIII.

Tom. II.

Car. Tétane avec privation des sens.

§. II. Particulier.

Esp. II. Strabisme.

Eth. de strabizo; j'ai les yeux de travers.

Syn. Strabisme; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. I.—
LINNÉ, cl. XI, vices; ord. VII, difformités;
gen. CCCV.— VOGEL, cl. XI, difformités;
gen. DXIX.— CULLEN, cl. IV, locales; ord.
III, dyscinésies; gen. CXIV.— SAGAR, cl.
VII, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. I.

Car. Défaut de réunion ou de convergence des axes optiques, par affection tonique de l'un des yeux.

S-esp. I. Vulgaire; par l'habitude de n'exercer qu'un œil; SAUV., loc. cit., esp. 2.

S-esp. II. Asthéno-spastique; par affection spasmodique des muscles d'un œil, et foiblesse des muscles de l'autre.

Strabisme buffonien; SAUV., loc. cit., esp. 3.

Rap. A. Amblyopie luscitique; SAUV., cl. v1, ord. 1, gen. 111, esp. 5.

Esp. III. Trisme.

Syn. Tic, trismus; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. II.

LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. I, spastiques; gen. CXXIV. — CULLEN, cl. II, névroses; ord.

III, spasmes; gen. XLIX. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. II.

Capistre; Vogel, cl. v, spasmes; genecoulli.

Car. Rigidité spasmodique affectant particulièrement la mâchoire inférieure.

S-esp. I. Néophytique.

Attaquant les enfans de naissance entre les deux premières semaines de la vie-

Trisme néophytique; SAUV., loc. cit., esp. 1.
Mal de mâchoire; BAJON, loc. cit. — BAUMES, des convulsions dans l'enfance, pag.
319.

La sarrette.

S-esp. II. Traumatique; à l'occasion d'une plaie.

Bibl. J. G. BRENDEL, de spasmo maxillæ inferioris; Gotting. 1755.

BILFINGER, traité du tétanos ou du mal de mâchoire; maladie de l'Amérique; Gott. 1764.

LE FOULON, mémoire sur le tétanos à la suite des plaies; rec. périod. de la soc. de méd. de Paris, tom. 111, an VI, pag. 257.

Rap. A. Trisme traumatique; SAUV., loc. cit., esp. 2.

Angine spasmodique; SAUV, cl. V, ord. 11, gen. X, esp. 18.

Convulsion vulnéraire; SAUV. IV, ord. 1113 gen. XIII, esp. 2.

- B. Après l'opération d'un stéatome dans l'aîne; J. DE PLENCIZ, acta et observata medica; Pragæ 1773, pag. 170.
- C. Trisme après l'extraction de deux dents; rec. pér. de la soc. de méd. de Paris, tom. 11, pag. 137.
- D. Trisme par une plaie faite au tendon du second orteil par un clou, ibid.
- E. Trisme par une plaie d'arme à feu à la main; Bodin, ibid, tom. v, pag. 293.

S-esp. III. Trisme cataleptique.

Trisme compliqué avec la catalepsie; L. HIORTZ BERG, kongl. svenska vetenskaps aca-

demiens handlingar for ar 1778; Stockolm, vol. XXXIX, pag. 70.

Esp. IV. Torticolis.

Syn. Torticolis, obstipitas; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. III. — SAGAR, cl. VII, ord. I, toniques partiels; gen. III.

Tête de travers, caput obstipum; Vogel, cl. XI, difformités; gen. DXIII.

Car. Inflexion tonique de la tête à droite ou à gauche, en avant ou en arrière.

Rap. A. Torticolis spasmodique; Sauv., loc. cit., esp. 6.

B. Torticolis huméral; le visage restant tourné en dehors vers l'humérus; Sauv., loc. cit., esp. 1.

C. Torticolis latéral; SAUV., loc. cit., esp. 5.

Esp. V. Contracture.

Syn. Contracture; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. IV.—
LINNÉ, cl. XI, vices; ord. VII, difformités;
gen. ccc.— Cullen, cl. IV, locales; ord.
III; dyscinésies; gen. CXVI.— SAGAR, cl.
VII, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. IV.

Car. Rigidité soutenue avec inflexion d'un ou de plusieurs membres.

Rap, A. Contracture spasmodique; SAUV., loc. cit., esp. 11.

B. Digitie, digitium; courbure constante et forcée de la première phalange des doigts; VOGEL, cl. v, spasmes; gen, CCXXI.

Esp. VI. Crampe.

Syn. Crampe, crampus; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. v. SAGAR, cl. VII, spasmes; ord, I, toniques partiels; gen. v.

Car. Rigidité subite et passagère d'un muscle ou de deux avec douleur.

Rap. A. Crampe idiopathique; SAUV., loc.

Esp. VII. Priapisme.

Syn, Priapisme; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. VI. — LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. I, spastiques; gen. CXXII. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLXXIII. — SAGAR, cl. VII spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. VI.

Car. Érection involontaire et fatigante du membre viril sans desir amoureux.

Rap. A. Satyriase chronique; SAUV., cl. VIII, ord. II, gen. XIII, esp. 2.

Esp. VIII. Catalepsie.

Eth. de katalambano, j'arrête.

Syn. Catalepsie; Juncker, tab. xlv.—
Sauvages, cl. vi, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. xxv.—Linné, cl. vii, motoires; ord. i, spastiques; gen. cxxix.—Vogel, cl. vi, adynamies; gen. ccxxx.—Sagar, cl. ix, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. xxv. Pinel, cl. iv, névroses; ord. iv, affections comateuses; gen. lxi.

Bibl. H. F. Delius; de catalepsi; Erlang. 1754.

L. E. HERSCHEL, gedanken von der starrsucht oder catalepsi; Berlin 1768.

J. G. BAUMER, de extaseos et catalepseos notione ac rationali curatione; Giessæ 1776.

G. L. FABRI, tractatus pathologicus de catalepsi; Halæ 1780.

Car. Etat-permanent de contraction des muscles, avec privation du sentiment, du mouvement musculaire et des sens, et affoiblissement du pouls et de la respiration : néanmoins les membres ayant assez de flexibilité pour se prêter à des changemens de position qu'ils conservent.

Rap. A. Catalepsie mélancolique; SAUV., loc. cit., esp. 5.

- B. Tétane admirable; SAUV., cl. IV, ord. IT, gen. VII, esp. 13.
- C. Extase cataleptique; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXVI, esp. 3.
- D. Extase catoche, avec roideur du corps; Sauv., ibid, esp. 1.
- E. Apoplexie caraleptique; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. XLII, esp. 8.

Gen. XXXII. NARCOSE.

Eth. de narke, engourdissement, stupeur. Dénomination adoptée dans cet ouvrage pour exprimer un genre de maladie dont les synonymes sont les suivans.

Syn. Affections carotiques, apoplectiques.

Assoupissemens, comata; Sauvages, cl. vi, débilités; ord. v. — LINNÉ, cl. vi, quiétales; ord. ir, soporeuses. — Sagar, cl. ix, débilités; ord. v.

Bibl. (a) PECHLIN, de apoplexiá; Leidæ 1667; et coll. de HALLER, tom. 1, pag. 1.

L. HEISTER, de apoplexiá magis chirurgicis quam aliis medicamentis curandá; Helmstad 1752.

J. MOLINARI, de apoplexiâ; Viennæ 1753.

D. Hohed, de apoplexiá; Lugduni-Batav. 1753.

CH. G. LANGE, de apoplexiá; Jenæ 1754.

* M. Alberti, de majori frequentia apoplexiæ, in eruditis quam alius sortis hominibus observanda; Halæ-Magdeb. 1755.

G. E. HAMBERGER, de apoplexiã; Jenæ 1755.

A. STORCK, de apoplexiá; Lugd.-Batav.

Tissot, de variolis, apoplexiá et hydrope; Lausannæ 1761; coll. de Sandifort, tom. 11, pag. 1; et œuvres générales, tom. v, pag. 191.

J. WEPFER, historiæ apoplecticorum, etc.; Venetiis 1762.

⁽a) Les auteurs que l'on va énumérer n'appartiennent pas tous au vrai genre de l'apoplexie; on a cru devoir cependant les ranger dans cet article et marquer d'un astérisque * ceux qui s'y rapportent plus particulièrement.

* CH. A. MANGOLD, diss. docens apoplexice plures præter sanguineam et serosam dari species; Erford 1765.

A. WESTPHAL, de medelis quibusdam quæ parantur apoplexiæ, suspectis partim et noxiis, partim laudandis; Gryphiswald 1767.

MARQUET, traité de l'apoplexie, paralysie et autres affections soporeuses, etc.; Paris 1770.

- J. G. LEIDENFROST, de quibusdam ad præcavendam apoplexiam spectantibus; Duisburg. ad Rhen. 1771.
- J. Ch. Niemann, de apoplexiæ pathologia et therapeia; Halæ 1772.

Ponsard, traité de l'apoplexie, etc.; Liège 1775. -- Paris 1782.

F. O. KREBS, de apoplexia peripneumoniam indicante; Helmst. 1780.

STOLL, de apoplexia; dissert. med., tom.

1, pag. 302.

B. G. CHANDLERS, an inquiry in the the various theories and methods of cure in apoplexies and paralysies; Canterbury 1784.

LAMBRY, an et in quo asphyxia différat ab apoplexia? Nancy 1787.

* Zuliani, de apoplexia præsertim nervea; Brixen 1789. * KIRKLAND, a commentary on apoplectus and paralytic affections, etc.; Lond. 1791.

* N. X. A. RICHARD, essai médical sur l'apoplexie; Montpellier, an. X.

Car. État soporeux plus ou moins profond, avec lésion quelconque de la respiration; les mouvemens volontaires étant très diminués ou abolis, et l'action du cœur ét des artères subsistant.

Esp. I. Narcose modérée.

Car. Assoupissement soutenu avec un sentiment obscur et la respiration lente.

Rap. A. Apoplexie nerveuse; KIRLAND, loc. eit., esp. 2.

S-esp. I. Cataphore.

Eth. de kataphero, j'assoupis.

Syn. Cataphore; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. XXIX.—LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. II, soporeuses; gen. XCIX.—VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCXXXII.—SAGAR, cl. IX, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. XXIX.

Car. Le malade est assoupi; excité il se ré-

veille assez facilement, mais il retombe bientôt dans un état comateux.

Rap. A. Cataphore somnolente; SAUV., loc. cit., esp. 1.

- B. Somnolence; Linné, cl. vi, quiétales; ord. 11, soporeuses; gen. xcvi. Vogel, cl. vi, adynamies; gen. ccxxxiii.
- C. Typhomanie; SAUV., cl. VI, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXVII. LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. II, soporeuses; gen. CXVII. SAGAR, cl. IX, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXVII.
- D. Léthargie; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXVIII. LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. II, soporeuses; gen. XCVIII. SAGAR, cl. IX, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXVIII.
- E. Hypophose, apparition du blanc de l'œil en dormant; Vogel, cl. vi, adynamies; gen. ccxxxiv.

S-esp. II. Carus.

Syn. Carus (de caros); SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXX.

LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. II, soporeuses; gen. c. VOGEL, cl. VI, adynamies;

gen. CCXXXI. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXX.

Car. Le malade, excité, se réveille plus difficilement et se rendort plus profondément.

Rap. A. Cataphore, coma; SAUV., cl. VI, ord. v, gen. XXIX, esp. 2.

B. Surdité comatique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IX, esp. 7.

Var. A. Carus solaire, par un coup-de-soleil; Sauv., loc. cit., esp. 12.

B. Catoche diurne; assoupissement profond avec des symptômes tétaniques, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; Sauv., cl. IV, ord. 11, gen. VIII, esp. 6.

Esp. II. Narcose violente.

Car. Sommeil très-profond avec insensibilité et respiration stertoreuse.

S-esp. I. Apoplexie.

Eth. d'apoplettein, frapper, abattre, rendre stupide, sans sentiment.

Syn. Apoplexie; Juncker, tab. cxvII. — Sauvages, cl. vi, débilités; ord. v, assou-

pissemens; gen. XXXI. — LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. II, soporeuses; gen. CI. — Vo-GEL, cl. VI, adynamies; gen. CCXXIX. — CUL-LEN, cl. II, névroses; ord. I, assoupissemens; gen. XLII. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXXI. — PINEL, cl. IV, névroses; ord. IV, affections comateuses; gen. LX.

Car. Renversé subitement comme si on étoit frappé de la foudre, le malade tombe dans un sommeil profond, avec ronflement et une respiration sonore.

Rap. A. Apoplexie nerveuse; KIRKLAND, loc. cit., esp. 1.

Apoplexie foudroyante.

- B. Paraphonie stertoreuse; ronflement des apoplectiques; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XVII, esp. 6.
- C. Asphyxie apoplectique; effet d'une apoplexie foudroyante; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 10.
- D. Hémiplégie apoplectique; paralysie de la moitié du corps, venant après une attaque d'apoplexie, plus souvent après l'apoplexie modérée, ou première espèce d'apoplexie nerveuse de Kirkland; Sauv., cl. vi, ord. iir, gen. xix, esp. 7.

Gen. XXXIII. CLONISME.

Eth. de kloneo, j'agite, je mets en mouvement.

Syn. Convulsions cloniques; ETMULLER, colleg. pract., pars 11, cap. IX.

Mouvemens convulsifs de RIVIÈRE.

Spasmes cloniques; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. III et IV. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. III et IV.

Bibl. BAUMES, des convulsions dans l'enfance; in-8.º 1789.

ZEIT, dissert. de convulsionibus infantum; coll. de STOLL, tom. 111, 1790, pag. 179.

Car. Contraction et relâchement alternatif et involontaire des muscles ou organes moteurs.

Esp. I. Eclampsie.

Syn. Eclampsie; SAUVACES, cl. IV, spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XVIII.

VOGEL, cl. V, spasmes; gen. CLXXXIX.

SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XIX.

Épilepsie des enfans; BAUMES, loc. cit., pag. 381, chap. IX.

Mouvemens convulsifs.

Bibl. N. ROSEN, de epilepsiá infantili; Upsal. 1754.

Car. Clonisme aigu avec des paroxismes qui se renouvellent à de courts intervalles, et qui suspendent toutes les fonctions des sens.

Rap. A. Éclampsie puerpérique; I. C. Gehler de clampsia parientium, morbo gravi quidem, neque adeo funesto; sectio prior Lipsiæ 1776. — Sectio altera Lips. 1777.

Esp. II. Epilepsie.

Eth. d'epi lambaneistai, saisir, surprendre tout-à-coup.

Syn. Épilepsie; Juncker, tab. Liv. — Sauvages, cl. IV, spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XIX. — LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. II, agitatoires; gen. CXLIII. — Vogel, cl V, spasmes; gen. CLXXXVIII. — Cullen, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; gen. LIII. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. IV, cloniques généraux; gen. XX. — PI-NEL, cl. IV, névroses; ord. II, spasmes; gen. XLIX.

Mal caduc; haut mal; mal d'Hercule; mal

de la terre; mal de Saint-Jean; mal des comices; maladie sacrée ou divine.

Bibl. A. I. RUGEMER, de epilepsiá; Wurceb.
1752.

C. VAN WIERT, de epilepsiá; Traj. ad Rhen. 1752.

A. WATTS, de epilepsiä; Lugd.-Batav.
1753.

J. G. FALCK; de epilepsiá seu convulsivis motibus virginum; Gotting. 1753.

P. Samson, de epilepsid et præcipue ejusdem sic dictis specificis; Helmst. 1756.

F. Ch. Juncker, disp. sistens raram epilepsiæ speciem; Halæ 1763.

M. LOCHER, observ. pract. circa luem veneream, epilepsiam et maniam; Bruxellis 1764.

I. B. PASQUALATI, de epilepsiá; Vindob. 1766; et coll. de WASSERBERG, tom. 1119
1775, pag. 367.

CH. R. HANNES, de puéro epileptico, foliis aurantiorum sanato; Vesaliæ 1766; et coll. de Sandifort, tom. 111, pag. 311.

H. Fr. Delius, de ustione cranii in epilepsia; Erlang. 1768.

PH. A. BOEHMER, de nonnullis momentés
Tom. II. 24

ad curationem epilepsiæ spectantibus; Halæ 1768.

- S. A. D. Tissot, traité de l'épilepsie; Paris 1770.
- W. THRELFAL, essay on epilepsy, etc.; London 1772.
- J. Colbatsh, abandlung von den misteln und dessen krafft wider die epilepsie, etc.; Altenb. 1776.

Cases of insanity, the epilepsy, etc.; Lond. 1781.

PH. TURPIN, de epilepsiá; coll. de WEBS-TER; Edinb. 1781, tom. 11, pag. 147, dissert. 11.

SAILLANT, sur le siège de l'épilepsie; mém. de la soc. roy. de méd., ann. 1782-83, pag. 88 des mém.

Car. Clonisme chronique avec lésion absolue de l'exercice des sens, ordinairement composé d'une attaque qui revient par intervalles et qui est suivie de lassitudes plus ou moins fortes.

Rap. A. Epilepsie essentielle ou maladie sacrée d'HIPPOCRATE; SAILLANT, hist. et mém. de la soc. roy. de méd., ann. 1779, pag. 305, hist.

- B. Apoplexie épileptique; Sauv., cl. vi, ord. v, gen. XXXI, esp. 8. Assoupissement apoplectique formant la seconde période naturelle de l'épilepsie.
- C. Dyspermatisme épileptique; Sauv., cl. 1x, ord. 111, gen. xxx1, esp. 8.

S-esp. I. Précursive.

Le paroxisme est précédé d'une sensation quelconque, qui d'une partie du corps monte à la tête.

Epilepsie pédisymptômatique; SAUV., loc. cit.; esp. 6.

S-esp. II. Aprécursive.

L'attaque survient tout-à-coup, et pour l'or-dinaire sans cause évidente.

Epilepsie cérébrale; Cullen; locs cite, a esp. 1.

Esp. III. Convulsion.

Syn. Convulsion; SAUVAGES, cl. IV, spassmes; ord. III, cloniques partiels; gen. XIII.

— LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. II, agitatoires; gen. CXLII. — VOGEL, cl. V, spassmes; gen. CXCI. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; gen. L. SAGAR, cl.

vii, spasmes; ord. III, cloniques partiels; gen. XIV.

Bibl. Ph. C. FABRICIUS, de miris quibus² dam motibus spasmodico-convulsivis vagis; Helmst. 1751.

G. E. HAMBERGER, de convulsionum natură; Jenæ 1751.

H. A. NOKKEN, de convulsione; Traj. ad Rhen. 1752.

P. S. Muller, convulsionum et epilepsiæ infantum ex leviori dolore prodeuntium rationes medicæ; Halæ 1757.

PH. C. FABRICIUS, de motibus convulsivis; Helmstadt 1763.

J. GESSLER, de convulsione; Harderovic. 1765.

I. Koch, de convulsionibus juvenem decussatim distorquentibus; Argentor. 1770; et coll. de Baldinger, tom. vi, pag. 305.

Car. Clonisme général ou particulier; l'exercice des sens restant libres.

Rap. A. Hiéranose, convulsion générale; Sauv., loc. cit., esp. 11.—Linné, cl. vii, ord. 11, gen. CXLIV.—VOGEL, cl. v, gen, CXC.

- B. Tremblement involontaire; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 6.
- C. Chorée précipitée; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XXI, esp. 2. On ne peut marcher qu'en courant : c'est la volubilité de la langue lorsqu'il est question de la parole.
- D. Convulsion habituelle; SAUV., loc. cit., esp. 12. Elle affecte la tête ou le pied; est perenne.
- E. Cillose, tremblement continuel des cils supérieurs; Vogel, cl. v, gen. CCIII.
- F. Clignotement, convulsion des paupières, Nictatio; LAUTH, gen. 63. Hippos; LINNÉ, cl. VII, ord. II, gen. CXXXVII. Cinclèse; Vogel, cl. V, gen. cci.
- G. Nystagme (la souris); spasme clonique de l'œil ou de la paupière; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. IX. SAGAR, cl. VII, ord. III, gen. IX.

Strabisme spasmodique; convulsion clonique des muscles de l'œil; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. I, esp. 4.

Hippos: Vogel, cl. v, gen. cxcix.

H. Tic hypocondrique; SAUV., cl. IV, ord.

1, gen. 11, esp. 8. Distorsion involontaire
des muscles qui meuvent les joues, les yeux

et la mâchoire; laquelle passant en habitude est vulgairement appelée le tic.

I. Convulsion abdominale, occupant les muscles du bas-ventre; SAUV., loc. cit., esp. 10.

K. Convulsion intermittente, ayant son siège dans les extrémités; SAUV., ibid, esp. 17.

Esp. IV. Palpitation,

Syn. Palpitation; Juncker, tab. xxxIII.

SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. III, cloniques partiels; gen. xv. — LINNÉ, cl. VII,
motoires; ord. II, agitatoires; gen. CXXXII. —
VOGEL, cl. V, spasmes; gen. CCXIII. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes;
gen. LIV. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord.
III, cloniques partiels; gen. XVI.

Bibl. BECK, de palpitatione cordis; Giessæ 1718; et coll. de HALLER, tom. 11, pag. 499,

CH. E. DELILLE, tractatus de palpitatione cordis, etc.; Zwollæ 1755.

J. MILLIES, de palpitatione cordis; Lugdo-Batav. 1256.

DE BERGEN, de palpitatione cordis; Francof, ad Viad, 1740.

Car. Mouvement du cœur déréglé, fréquent,

convulsif avec oppression, difficulté de respirer, abattement des forces et même défaillances.

Var. A. Palpitation vive; mouvement violent et contre nature du cœur.

B. Palpitation foible; mouvement modéré, obscur ou tremblotant du cœur.

Palpitation tremblotante; Sauv., loc. cit., esp. 4. — LIEUTAUD, précis de médec. prat., in-8.°, tom. 1, pag. 398.

Esp. V. Hoquet.

Syn. Hoquet; SAUVAGES, cl. V, essouflemens; ord. I, convulsifs; gen. IV. — LINNÉ, cl. VIII, suppressoires; ord. I, suffocatoires; gen. CLIII. — VOGEL, cl. V, spasmes; gen. CCXII. — SAGAR, cl. VIII, essouflemens; ord. I, spasmodiques; gen. IV.

Bibl. F. H. BRUNING, diss. sistens singultum morbum, symptoma, signum; Traj. ad Rhen. 1758.

Car. Secousse du diaphragme suivie d'une inspiration tout-à-coup interrompue et sonore.

Rap. A. Hoquet passager; SAUV., loc. cit., esp. 1.

S-esp. I. Hoquet épileptico-maniaque; participant de l'épilepsie et de la manie; SAUV., loc. cit., esp. 29.

Esp. VI. Eternuement.

Syn. Eternuement; SAUVACES, cl. v, essouflemens; ord. 1, convulsifs; gen. 11.—LINNÉ, cl vIII, suppressoires; ord. 1, suffocatoires; gen. CLIV. — VOGEL, cl. v, spasmes; gen. CCIV. — SAGAR, cl. VIII, essouflemens; ord. 1, spasmodiques; gen. 11.

Bibl. A. E. BUCHNER, de sternutationis commodis et incommodis; Halæ 1757.

Car. Mouvement convulsif de la tête et du tronc, avec expiration violente, sonore et subite.

Gen. XXXIV. Toux.

Eth. de tussis, mot latin rendu en français par toux.

Syn. Toux; Sauvages, cl. v, essouflemens; ord. I, convulsifs; gen. v. — LINNÉ, cl. VIII, suppressoires; ord. I, suffocatoires; gen. cl.v. — Vogel, cl. v, spasmes; gen. ccv. — Cul-

LEN, cl. 1, pyrexies; ord. v, flux; gen. XL, catarre. — SAGAR, cl. VIII, essouflemens; ord. 1, spasmodiques; gen. v.

Bibl. ROSEN, de tussi, pars prior; Upsal. 1739; et pars posterior; Upsal. 1741; et coil. de HALLER, tom. 11, pag. 51.

RICHTER, de tussi; Gotting. 1747; et opusc. medic., tom. 1, pag. 343.

S. J. VEDEKIND, de tussi in genere et epidemia illa quæ hoc anno sæviit; Rintel 1766.

Car. Expulsion sonore et faite par secousse de l'air contenu dans le poumon.

Esp. I. Simple.

Les secousses de la toux ne sont point interrompues, précipitées.

S-esp. I. Toux accidentelle, déterminée par quelque cause externe sur la trachée artère; SAUV., loc. cit., esp. 4.

Rap. A. Dysphagie tussiculeuse; toux et impossibilité d'avaler, provenant de quelques gouttes d'eau tombées dans la trachée-artère; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 7.

S-esp. II. Toux gutturale, provenant d'une

sause qui affecte particulièrement le gosier; Sauv., loc. cit., esp. 8.

S-esp. III. Toux xérolaryngée; par sécheresse de la gorge; SAUV., loc. cit., esp. 23.

S-esp. IV. Toux indéterminée, dont il est très-difficile de découvrir la cause; QUARIN, tentam. de cicuta, obs. 1v.

Esp. II. Quinteuse.

Syn. Coqueluche; toux convulsive; toux férine.

Bibl. BOURDELIN, ergo tussi puerorum clangosæ vulgo coqueluche, emesis? Paris 1752, et coll. de HALLER, tom. 11, pag. 22.

TH. FORBES, de tussi convulsivá; Edinb. 1754; et coll. de HALLER, tom. 11, pag. 97.

- J. F. CH. EBELING, de tussi infantum convalsivă; Gotting. 1768.
- J. MILLAR, observations on the asthma and on the hooping congh, etc.; London 1769.
- CH. J. MELLIN, von den keichhusten der kinder, welcher in den jahren 1768 und 1769, etc.; Franckf. 1770.
- J. GABLA, de tussi convulsivă infantum; Vindob. 1772.

G. KIRKLAND, de pertussi; Edinb. 1772.
W. BUTTER, a treatise on the kinkcongh, etc.; Lond. 1773.

A. Murray, de tempore corticem peruvianum in tussi convulsivă exhibendi; Gotting. 1776; et coll. de Murray, tom. 1, pag. 305.

STRACK, de tussi convulsivă infantum; Mogunt. 1777; et coll. de Franck, tom. 111, pag. 218.

STOLL, de tussi convulsivá; coll. d'EYE-REL, tom. 11, 1789, pag. 208.

Car. Toux convulsive dans laquelle une seule inspiration est suivie de cinq ou six expirations successives, avec une sorte de sifflement, des anxiétés et un sentiment de strangulation; elle revient par accès et amène souvent le vomis; sement.

Gen. XXXV. ASTHME.

Eth. d'aazo, je respire.

Car. Difficulté de respirer, essentielle, aiguë ou chronique, périodique ou continue.

Esp. I. Paroxistique; asthme.

Syn. Asthme; SAUVAGES, cl. v, essouflemens; ord. II, oppressifs; gen. VIII. — LINNÉ,

cl. VIII, suppressoires; ord. 1, suffocatoires; gen. CLXI. — VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLXVIII. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; sect. II, des fonctions vitales; gen. Lv. — SAGAR, cl. VIII, essouflemens; ord. II, suppressifs; gen. VIII. — MACBRIDE, cl. I, universelles; ord. VII, essouflemens; gen. III.

Bibl. J. FLOYER, a treatise of the asthma; Lond. 1698; en franç. par Jau, Paris 1761; en allem. par Scherf, Leips. 1782. Voyez l'édition anglaise de FLOYER, Lond. 1753.

H. RIDLEY, observationes medicæ, inter quas aliquanto fusius agitur de asthmate et hydrophobia; L. B. 1738.

C. F. VALENTINI, asthmatis pathologica consideratio; Kiliæ 1751.

J. Juncker, de asthmatis verá pathologiá et rationali therapeiá; Halæ 1752.

F. B. DE SAUVAGES, de respiratione difficili; Monspel. 1757.

S. Aurivil, de asthmate; Upsal. 1763.

J.W FEYERABEND, de asthmate; Reg. 1764.

J. MILLAR, observations on the asthma, etc.; London 1769.

D. F. Bost, dissert. sistens historiam asthmatis; Erford. 1774. I.D. A. KREVEL, de asthmate; Halæ 1774.

J. C. MAYER; de asthmate ejusque speciebus; Gotting. 1779.

T. WITHERS, a treatise on asthma; Lond. 1786.

M. STOLL, de asthmate; coll. d'EYEREL, tom. 11, 1789, pag. 78.

Car. Difficulté subite de respirer, avec un sentiment de suffocation, avidité pour l'air frais et sifflement dans l'inspiration et l'expiration, venant par paroxismes aigus.

Rap. A. Paraphonie sifflante; SAUV., cl., vI, ord. III, gen. XVII, esp. 7.

S-esp. I. Humide.

Sentiment de plénitude et d'embarras dans la poitrine; expectoration avant l'accès et sur-tout à la fin, moins abondante néanmoins que dans l'asthme pituiteux (voy. ci-dessus tom. 11, pag. 33, Sorte 7.); toux comprimée pendant le fort du paroxisme.

S-esp. II. Sec.

Resserrement spasmodique de la poitrine avec des anxiétés de suffocation plus considérables ; la fin de l'accès n'est pas marquée par l'expectoration, et le paroxisme se déclare plus subitement et plus violemment.

Epilepsie du poumon de VANHELMONT.

Asthme occulte et sec; ETMULLER, coll. med., cap. XIV.

Asthme convulsif; SAUV., loc. cit., esp. 2. Voy. J. LAW, de asthmate recidivo spasmodico; Edinb. 1762.

Formes.

Sor. 1. Phthisie asthmatique; Sauv., cl. X, ord. 1, gen. 11, esp. 5.

Esp. II. Suffocant; orthopnée.

Syn. Orthopnée (de orthos, droit, levé; et pnæo, je respire.); Sauvages, el. v, essouflemens; ord. 11, oppressifs; gen. 1x.—Linné, cl. viii, suppressoires; ord. 1, suffocatoires; gen. CLXII.—Vogel, cl. vi, adynamies; gen. CCLXIX.—Cullen, cl. 11, névroses; ord. 111, spasmes; sect. 11, des fonctions vitales; gen. Lvi.—Sagar, cl. viii; essouflemens; ord. 11, suppressifs; gen. IX.—Macbride, cl. 1, universelles; ord. viii; essouflemens; gen. 11.

Car. Difficulté de respirer aiguë, avec les plus vives angoisses de suffocation,

Rap. A. Orthopnée spasmodique; SAUV., loc. cit., esp. 3.

B. Orthopnée épidémique à Forges en 1774; CIZEVILLE, dans LEPECQ DE LA CLOTURE, collect. d'observat. sur les malad. et constitut, épidém.

C. Orthopnée cardiaque; SAUV., loc. cit., esp. 2. — Catarre suffocant; ETMULLER, coll. medic., cap. XIV. — Syncope cardiaque, id.

Pesanteur de tête, douleur de poitrine, difficulté de respirer, avec aphonie, danger de suffocation, anxiété, quelquefois de la toux et pouls lent et rare.

Esp. III. Continu; dyspnée.

Syn. Dyspnée (de dys, difficilement; et pnæo, je respire.); SAUVAGES, cl. v, essouflemens; ord. II, oppressifs; gen. VII.—
LINNÉ, cl. VIII, suppressoires; ord. I, suffocatoires; gen. CLX.—VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLXVII.— CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; sect. II, des fonctions vitales; gen. LVI.— SAGAR, cl. VIII, essouflemens; ord. II, suppressifs; gen. VII.— MACERIDE, cl. I, universelles; ord. VII, spasmes; gen. I.

Car. Difficulté de respirer, continuelle, chronique, avec toux fréquente, dans laquelle on n'éprouve pas un resserrement, mais plutôt un sentiment de réplétion et d'embarras dans la poitrine.

Gen. XXXVI. PHTHISIE.

Eth. de phthino ou phthoo, je corromps; ou phtheiro, je slétris.

Car. Dépérissement et consomption générale du corps, avec formation de pus dans une partie, le plus souvent interne, et fièvre hectique lente.

Nota bene. Vogel observe que, dans l'atrophie, la graisse seule se consume et ne se remplace point; tandis que, dans le tabes et la phthisie, les chairs se fondent également.

Esp. I. Gutturale.

Car. Sentiment d'érosion dans le larynx, avec difficulté chronique de respirer, voix grêle ou rauque et crachats suspects ou purulens.

Rap. A. Dysphagie nauséuse; Sauv., cl. vII, ord. III, gen. XVII, esp. 9.

Esp. II.

Esp. II. Pulmonaire.

Syn. Pulmonie, Jeannet des Longrois; de la pulmonie; Paris 1781.

Phthisie; SAUVAGES, cl. x, cachexies; ordard, consomption; gen. 11.—LINNÉ, cl. x, difformités; ord. 1, maigreurs; gen. ccix.

VOGEL, cl. VIII, cachexies; gen. cccx.

Cullen, cl. 1, pyrexies; ord. 1v, hémorragies, gen. xxxvII, suite.—SAGAR, cl. 111, cachexies; ord. 1, consomption; gen. 11.

Bibl. G. E. STAHL, de phthisi; Halæ 1704; et coll. de Haller, tom. 11, pag. 369.

P. G. Schacher, progr. quo incisio phthisici continetur cadaveris; Lips. 1730; et colle de Haller, tom. 11, pag. 395.

C: F. KALTSCHMID, de phthisi pulmonali ejusque præservatione; Jenæ 1751:

D. VASSE, an ulceribus pulmonum suffimigium à balsamicis? Paris. 1751;

J. RAULIN; observations de médecine avec des remarques contre l'usage du lait dans la pulmonie; Paris 1754.

G. G. RICHTER; de phthisi infantum pulmonariá; Gotting. 1758.

F. Ch. Juncker, de phthisi per operationem chirurgicam curandá; Halæ 1760.

Tom. II.

Essai théorique et pratique sur la phthisie; Paris 1760.

- P. CHEVALIER, an phthisi pulmonali idiopathicæ præcavendæ, parca sed frequens sanguinis missio? Paris. 1761.
 - G. F. SIGWART, de phthisi; Tubing. 1765.
- C. HALL, de phthisi pulmonali; L. B. 1765.
- M. HINDE, de phthisi pulmonali; L. B. 1765.
- R. Harke, de phthisi pulmonali; L. B. 1767.

READ, sur les effets salutaires du séjour des étables dans la phthisie; Paris 1767.

- R. Starke, de phthisi pulmonali; Lugd.-Batav. 1767.
- P. J. Buch'oz, traité de la phthisie pulmonaire; Paris 1769.

R. DE L'ISLE, traité des maladies de poitrine, connues sous le nom de phthisie pulmonaire, etc.; Valence 1769.

ROZIERE DE LA CHASSAGNE, manuel des pulmoniques; Paris 1770.

A. VAN DER PLUYM, de phthisi pulmonali; Lugd.-Batav. 1771.

CH. F. JŒGER, diss. prima de phthisi pulmonali casu notabiliore et epicrisi illustrată; Tubing. 1772. - Secunda diss., id.; et coll. de BALDINGER, tom. IV, pag. 201-261.

J. RINGELMANN, de phthisi; Herbipoli

AMAR, instruccion curativa y preservativa: de dolores de costado y pulmonias; Madrid 1777.

D'Assy d'Arpajean, observations sur la guérison d'une phthisie pulmonaire; Lausanne et Paris 1778.

Schroeder, tractatus de pneumonide ejusque speciebus; Gotting. 1779.

J. HALLILAY, de phthisi pulmonali; collede Webster, tom. 1, 1781, pag. 323.

TH. REID, essay on the nature and cure of the phthisis pulmonalis; Lond. 1782-1785; en français par Petit D'Arson, Lyon 1792.

EVERS, diss. med. in contagium phthisicum inquirens; Gotting. 1782.

RAULIN, traité de la phthisie pulmonaire; Paris 1782. — Nouvelles observations sur la phthisie; Paris 1785.

G. Corp, de phthisi pulmonali; Edinb. 1782; et diss. med. Edinburgens., 1782.

R. Kentish, de phthisi pulmonali idiopathică; Edinb. 1784; et dissert. med. Edinb, 1784. M. I. MARX, abhandlung von der schwind lungen-sucht und den mitteln wider dieselbe; Hannover 1784.

MARIANO NARDUCCI, sovra il contagio della tisichezza, etc.; Perouze 1785.

Chavet, de phthisi pulmonali hereditaria; Munster 1787.

C. SMYTH, an account of the effects of swinging, etc.; London 1787; sur le balancement de l'escarpolette.

RYAN, an inquiry in to the nature, causes and cure of the consumption of the lungs, etc.; Lond. 1788.

CASTELLANI, sulla pulmonare tisichezza; 1791.

PORTAL, observ. sur la nature et sur le traitement de la phthisie pulmonaire; Paris 1792.

MAY, essay on pulmonary consomptions; Lond. 1792.

BAUMES, de la phthisie pulmonaire; Montp. an III.

Car. Avec la rougeur de la langue et des gencives, la blancheur des dents, la coloration des joues, la vivacité des sens et une urine jaune-claire presqu'inodore; il y a toux, dyspnée, amaigrissement successif porté jusques au marasme, quelquefois crachement de sang et expectoration d'abord visqueuse, ensuite purulente. La fin de la maladie est ordinairement marquée par quelques flux colliquatifs.

Rap. A. Toux phthisique; SAUV., cl. V₂ ord. 1, gen. v, esp. 17.

S-esp. I. Phthisie pulmonaire de naissance.

Maladie connée et se développant successivement dans l'adolescence par les signes qui lui sont propres; PORTAL, loc. cit., pag. 1, art. 1.

Phthisie pulmonaire; Rollo, traité du diabètes sucré, etc.; Paris, an VI, part. I, pag. 77; et part. II, pag. 131.

Phthisie pulmonaire tuberculeuse; BAUMES, loc. cit., tom. 11, pag. 262, chap. 11.

Rap. A. Phthisie sèche; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Phthisie humide; SAUV., loc. cit., esp. 2.

C. Dyspnée tuberculeuse; SAUV., cl. v, ord. II, gen. VII, esp. 2.

S-esp. II. Phthisie hémoptyque.

Phthisie pulmonaire marchant sous les apparences d'une hémoptysie.

Bibl. WAGNER, de hæmoptoes, imprimis vero habitualis seu phthisicæ...... curatione; Lipsiæ 1742; et coll. de HALLER, tom. 11, pag. 277.

Werlhoff, de phthisi ex hæmoptysi; opera miedica, in-4.°, pag. 791.

LEIDENFROST, de illa hæmoptysi quam phthisis sequi solet, etc.; Duisbourg 1782.

DE MEZA, vis corticis peruviani suspecta in hæmoptoes et phthiseos curatione; acta societ. medic. Hauniensis, tom. 1, pag. 40.

Car. Le sang sort moyennement et quelquefois en petite quantité; mais il reparoît par périodes et donne lieu à une maladie constitutionnelle, tendant par elle-même à la pulmonie.

Rap. A. Hémoptysie habituelle; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. 11, esp. 2.

B. Hémoptysie phthisique; SAUV., loc. cit., esp. 9.

Var. A. Hémoptysie tuberculeuse; SAUV., toc. cit., esp. 10.

S-esp. III. Phthisie colliquative.
Avec sueurs abondantes, écoulement copieux

d'urine, expectoration abondante et quelquefois des éflorescences.

Phthisie scorbutique; Sauv., loc. cit., esp. 4.

Var. A. Diarrhée colliquative; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 13.

B. Etisie éphidrosique; SAUV., cl. x, ord. 1, gen. 1, esp. 6.

Esp. III. Hépatique.

Bibl. Schroeder, de phthisi sect. 1; Got-ting. 1783.

Car. Douleur rongeante, mais sourde et continue dans l'hypocondre droit, avec toux sèche et vaine, fébricule fixe et erratique, redoublemens après le repas; pour l'ordinaire avec inappétence absolue, quelquefois avec la couleur ictérique du corps.

Esp. IV. Ovairique.

Car. Douleur compressive et continue, plus ou moins obscure dans l'une des régions iliaques, avec fébricule fixe ou erratique, paroxismes irréguliers et marasme progressif.

Obs. Madame B. M. avoit présenté les symp: tômes qui caractérisent la phthisie ovairique; on avoit attribué sa maladie à une dyspepsie nerveuse; il y avoit en effet plusieurs indices dyspeptiques. La douleur sourde de la région iliaque droite se soutenoit avec une intensité variable; la fièvre étoit continue, lente, hectique. Des médecins consultans déclarèrent qu'il y avoit une phthisie hépatique; enfin la malade rendit des matières purulentes par le fondement, ce qui fit douter qu'il n'y eût quelque foyer dont le siége ne tomboit pas bien, sous les sens. La malade succomba. Son corps fut ouvert en ma présence par M. Montagnon. A part les phénomènes propres au marasme, la poitrine étoit en bon état; le foie étoit volumineux, mais très-sain. L'ovaire droite seule présentoit un grand sac dont l'intérieur s'étoit fondu par la suppuration. La partie contiguë avec l'intestin rectum avoit formé adhérence aveć lui; l'abcès avoit percé dans le centre de cette adhérence, et c'est par cette voie que le pus, dont une partie étoit repompée, s'évacuoit par intervalles par l'anus, notamment dans certaines positions,

Esp. V. Cellulaire.

Nota bene. Le siège de cette phthisie, qu'on ne doit pas confondre avec la phthisie cellulaire de DE HAEN, rat. med., tom. 111, cap. 5, pag. 89, occasionnée par une inflammation érythématique lente des bronches; est souvent dans la capacité abdominale, dans le tissu cellulaire des muscles adossés à l'épine, et qui communique, sous le ligament de poupart, avec les muscles de la cuisse: elle est souvent la compagne des abcès profonds.

Car. Douleur plus ou moins vive dans toute autre partie qu'un organe; avec hecticie, sueurs nocturnes, diarrhée colliquative: il a quelquefois de la toux, même de la difficulté de respirer.

Gen. XXXVII. GASTROREXIE.

Eth. de gaster, ventre; et orexis, appétit.

Car. Desir extraordinaire des alimens liquides ou solides.

Esp. I. Boulimie.

Syn. Boulimie; SAUVAGES, cl. VIII, vésa-

nies; ord. 11, morosités; gen. VIII. — LINNÉ, cl. V, mentales; ord. 111, pathétiques; gen. LXXIX. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. 11, dysorèxies; sect. 1, appétits erronés; gen. 101. — SAGAR, cl. XIII, vésanies, ord. 11, morosités; gen. VIII.

Bibl. F. LINDENER, de fame canina; Halæ
1760.

Car. Appétit pour les alimens, plus grand que l'estomac ne peut en digérer.

S-esp. I. Voracique.

Boulimie des gros mangeurs sans affection sénsible de l'estomac; Cullen, loc. cit., esp. 1. Boulimie voracique; Sauv., loc. cit., esp. 4. Addéphagie; Vogel, cl. vII, hyperæsthèses; gen. ccxcvII.

S-esp. II. Cardio-syncopale.

Boulimie avec le sentiment d'une faim qui menace de syncope; Cullen, loc. cit., esp. 2.

Boulimie cardialgique; SAUV., loc. cit., esp. 2.

Bulime; Vogel, cl. VII, hyperæsthèses; gen. ccxcvI.

S-esp. III. Emétique.

Boulimie avec appétence d'une grande quantité de nourriture qu'on rejette aussitôt par le vomissement; Cullen, loc. cit., esp. 3.

Boulimie canine; SAUV., loc. cit., esp. r. Cynorexie; Vogel, cl. VII, hyperæsthèses; gen. CCXCVIII.

Esp. II. Polydipsie.

Syn. Polydipsie; Sauvages, cl. VIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. IX.—LINNÉ,
cl. v, mentales; ord. III, pathétiques; gen.
LXXX.— VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses;
gen. ccxcv.— Cullen, cl. IV, locales; ord.
II, dysorexies; sect. I, appétits erronés;
gen. CII.— Sagar, cl. XIII, vésanies; ord.
II, morosités; gen. IX.

Car. Desir excessif de la boisson.

Esp. III. Antropophagie.

Bibl. Antropophagie, crime et non, selon qu'on l'envisage; Grunner, almanach pour les médecins, en allem., ann. 1792, art. 13.

Car. Desir insurmontable de manger de la chair humaine.

Gen. XXXVIII. ALGIE.

Eth: d'algeia, douleur.

Syn. Douleurs; SAUVAGES, cl. VII. — LINNÉ, cl. IV. — VOGEL, cl. IV. — SAGAR, cl. IV. — MACBRIDE, cl. I, universelles; ord. IV.

Névralgie; Chaussier, tableau synoptique de la névralgie, suivant la nomenclature méthodique de l'anatomie.

- Bibl. G. E. HAMBERGER, de dolore in genere; Jenæ 1750.
- J. H. FURSTENAU, de doloribus; Rintelii
 1753.
- A. E. BUCHNER, de salutaribus et nocivis dolorum effectibus; Halæ 1768.
 - N. DIMSDALE, de dolore; Edinb. 1771.
- M. A. Petit, discours sur la douleur; Lyon an VII.
- Car. Douleur notable, fixe, souvent irradiante; plus ou moins vive, obtuse ou déchirante; quelquefois avec élancemens, pulsations et tiraillemens dans une partie du corps, sans indices d'inflammation et sans fièvre du moins essentielle.

Rap. A. Douleur spastico-flatulente des premières voies; D. E. ROSEN, de doloribus spastico-flatulentibus primarum viarum; Londs Goth. 1771.

Formes.

- Sor. 1. Syncope dolorique; SAUV., cl. VI; ord. IV, gen. XXIII, esp. 2.
- 2. Vomissement dolorique; G. Hunter, giornale per servire alla storia ragionata della medicina di quæsto sæcolo; tom. 111, Venet. 1786, pag. 488.
- 3. Oubli céphalalgique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. 6.
- 4. Insomnie dolorique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 6.
- 5. Eclampsie dolorique; affection convulsive de la maladie de Roanne; J. B. Desgranges, journal de médec.; mai 1793, tom. XCIV, pag. 3; et juin 1793, ibid, pag. 126.

Esp. I. Céphalalgie.

Eth. de kephalos, tête; et algeia, douleur.

Bibl. POLZA, de dolore capitis; coll. d'EYE-REL, tom. 11, 1789, pag. 173. Car. Douleur plus ou moins forte, occupant quelque partie de la tête.

S-esp. I. Gravative.

Syn. Douleur de tête, SENNERT, tom. 111, pag. 192.

Douleur céphalique; Fr. Hofman, tom. 11, pag. 247.

Céphalalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. II, de tête; gen. XI. — LINNÉ, cl. IV, douleureuses; ord. I, intrinsèques; gen. XI. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CXI. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. II, de tête; gen. XI.

Pesanteur, gravedo, LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. XLII.

Carebarie; Voger, cl. IV, douleurs; gen. CXLIV.

Bibl. N. G. Balemann, de cephalalgia, imprimisque illà, quæ consensualis ex abdomine est; Helmstadt 1755.

Car. Pesanteur de tête, ou sensation incommode dans laquelle, il semble que la tête soit intérieurement distendue, enflée et comme surchargée. Rap. A. Céphalalgie pulsative; SAUV., loc. cit., esp. 6.

B. Céphalalgie rhumatique; Tode, acta soc. med. Haun., tom. 1, pag. 90.

S-esp. II. Tensive.

Syn. Céphalée; Sauvages, cl. VII, douleurs; ord. II, de tête; gen. XII. — Vogel, cl. IV, douleurs; gen. CXLI. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. II, de tête; gen. XII.

Bibl. Tissot, de morbo nigro, schirris viscerum, cephalæa, etc.; Lausan. 1760; et coll. de Sandifort, tom. 1, pag. 67; en français par Vicat.

Car. Douleur vive et tensive, aiguë et continue de la tête, s'irritant à la plus légère occasion.

Rap. A. Céphalée séreuse; SAUV., loc. cit., esp. 7.

S-esp. III. Fixe.

Syn. Migraine, hemicrania; SAUVAGES, ch. VII, douleurs; ord. II, de tête; gen. XIII.

— LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. XLI. — VOGEL, cl. IV, dou-

leurs; gen. CXLIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. II, de tête; gen. XIII.

Clou, clavus; Vogel, el. IV, douleurs; gen. CXLII.

Bibl. Tissot, de la migraine; traité des nerfs, chap. XXII.

Car. Douleur aiguë et périodique, occupant fixement les deux côtés de la tête, sur-tout les tempes, le front, les arcades sourcilières.

Rap. A. Migraine lunatique; SAUV., loca cit., esp. 10.

Esp. II. Prosopalgie.

Eth. de Prosopon, face, visage; et algeia, douleur.

Syn. Tic douloureux.

Bibl. Pujol, essai sur la maladie de la face, nommée le tic douloureux; Paris 1787.

J. M. Weisse, de dolore faciei, prosopalgia dicto; Jenæ 1796; et coll. de Brera, tom. IV, pag. 134.

Car. Vibrations momentanées et douloureuses qui, comme des traits électriques, se font sentir de temps en temps dans certains lieux déterminés déterminés de la face ou sur tout autre point des tégumens de la tête, et qui se joignent le plus souvent à des mouvemens convulsifs des muscles limitrophes; sans aucun vice extérieur et sensible à la vue pendant la durée des élancemens spasmodiques, et sans aucun reste de douleur ni de sensibilité morbide dans les lieux précédemment affectés lorsque la dou-leur est dissipée.

Esp. III. Otalgie.

Eth. d'otos, oreille; et algeia, douleur.

Syn. Otalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. 11, de la tête; gen. XV. — LINNÉ, cl. IV, douleures; gen. XLIV. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CXLVIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. 11, de la tête; gen. XV. — MACBRIDE, cl. 1, universelles; ord. IV, douleurs; gen. VI.

Car. Douleur plus ou moins violente de l'oreille, sans indices d'inflammation.

Esp. IV. Ophtalgie.

Eth. d'ophtalmos, œil; et algeia, douleur.

Syn. Ophtalmodynie; Plenck, de morbis oculorum; Viennæ 1783, pag. 83.

Tom. II.

Car. Douleur plus ou moins intense de l'œil, sans inflammation.

Rap. A. Ophtalmodynie spasmodique; PLENCK, loc. cit., esp. 3.

Esp. V. Odontalgie.

Eth. d'odon, dent; et algeia, douleur.

Syn. Odontalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. II, de la tête; gen. XVI. — LINNÉ,
cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques;
gen. XLV. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen.
CXLV. — CULLEN, cl. I, pyrexies; ord. II,
phlegmasies; gen. XXIII. — SAGAR, cl. IV,
douleurs; ord. II, de la tête; gen. XVI. —
MACERIDE, cl. I, universelles; ord. IV, douleurs; gen. V.

Bibl. Jourdain, nouveaux élémens d'odontalgie; Paris 1756.

F. E. GLAUBRECHT, analecta de odontalgiá, ejusque remediis variis, præcipuè magnete; Argentor. 1765.

Mahon, le dentiste observateur; Paris, an VI.

Car. Douleur des dents et des gencives.

1. Odontalgie (gingivale) par le travail intérieur des dents.

Syn. Dentition difficile.

Odaxisme (d'odaxismos, prurit douloureux qui se fait sentir aux gencives avant la sortie des dents); VOGEL, cl. IV, douleurs; gene CXLVII:

Bibl. C. CH. SCHMIEDEL, de dentitione præsertim infantum difficili; Erlang: 1751:

Brunner, de eruptione dentium lacteorum; coll. de Wasserberg; tom: 1; 1775; pag. 303.

Car. Gonflement douloureux des gencives avec anxiétés, salivation, diarrhée, etc., dans les enfans qui ont à percer des dents.

S-esp. I. Nerveuse.

Odaxisme nerveux, provenant d'une extrême mobilité du système, et attaquant principalement les enfans qui ont une grosse tête.

S-esp. II. Maxillaire.

Odaxisme maxillaire, occasionné par une trop forte résistance des gencives.

Rap. A. Odontalgie par la dentition; SAUV4, el. VII, ord. II, gen. XVI, esp. 5:

Formes.

Sor. 1. Vomissement par la dentition; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XIII, esp. 4.

2. Eclampsie par la dentition; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 13.

3. Diarrhée par la dentition; Sauv., cl. 1x, ord. 11, gen. XIII, esp. 15.

ord. 1, gen. v, esp. 12.

II. Odontalgie (dentaire) par quelque lésion extérieure de la dent.

Syn. Rhumatisme odontalgique; Hoffman, tom. 111, pag. 1330. 1101 1102 2 12 12 12 12 13

Douleur ou mal des dents; Bell, cours de chirurgie, tom. IV, pag. 145.

Car. Douleur distensive, pulsative ou lancinante et rongeante des mâchoires, le plus souvent avec insomnie, quelquefois avec enflure extérieure et salivation.

S-esp. I. Carieuse.

Douleur produite par la carie d'une ou de plusieurs dents.

Odontalgie carieuse; SAUV., loc. cit., esp. 1.

Mal de dents qui survient quand le nerf est à nu; Bell, loc. cit., esp. 1.

Rap. A. Salivation carieuse; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXIII, esp. 16.

S-esp. II. Maxillaire.

Douleur odontalgique sans carie. Douleur de dents produite par les affections des parties éloignées; Bell, loc. cit., esp. 3.

Esp. VI. Esophalgie.

Eth. d'oio, je porte; phago, je mange; et algeia, douleur.

Syn. Dysphagie (de dys, difficilement; et phago, je mange.); Sauvages, cl. vII, douleurs; ord. III, pectorales; gen. XVII.—Cullen, cl. IV, locales; ord. III, dyscinésies; gen. CXV.—Sagar, cl. VI, suppressions; ord. II, des choses qu'on avale; gen. VII.

Bibl. VATER, de deglutitionis dissicilis et impeditæ causis abditis; Viteb. 1750; et coll. de HALLER, tom. I, pag. 577.

Car. Difficulté douloureuse de la déglutition, sans gêne de la respiration.

8-esp. I. Libre.

Difficulté d'avaler, sans qu'aucun corps étranger obstrue le passage de la déglutition.

Rap. A. Déglutition difficile, provenant d'un spasme de l'œsophage; TH. PERCIVAL, medic, fransact, etc., vol. 11, art. 8, pag. 90,

S-esp, II, Empêchée,

Difficulté de la déglutition, occasionnée par des corps étrangers accidentels qui irritent l'œsophage.

Rap. A. Dysphagie mécanique; Cullen, ¿oc. cit., esp. 3.

B. Dysphagie de déglutition; SAUV., loc.

C. Esquinancie par déglutition; SAUV., cl.

Esp. VII. Sternalgie,

Eth. de sternum, et algeia, douleur.

Syn. Angina pectoris; HEBERDEN, medical gransactions, etc., volume the second, art. 6, — Ibid vol., the third, art. 1. — WALL, ib., art. 2; et medical tracts, etc., art. 8. — SMITH dans MACBRIDE, a methodical introduction, etc. — BERGER, kough vetenshaps academiens,

etc., 1780, art. 3. — WICHMANN, idées sur le diagnostic; biblioth. german., tom. 11, pag. 226.

Bibl. ELSNER, abhandlung uber die brustbræune, etc.; Konigsberg 1778; traité de l'angina pectoris.

G. BUTTER, a treatise on the disease commonly called angina pectoris, etc. London 1791.

Car. Sentiment extrêmement pénible, d'abord peu durable, menaçant de suffocation, sans changement apparent dans l'acte de la respiration venant subitement, reprenant par accès, ayant son siége variable dans le sternum, et causant, dans la suite, une douleur spasmodique à l'un des bras ou aux deux ensemble, sur-tout au lieu de l'insertion du muscle pectoral à l'humérus.

Le paroxisme prend ordinairement en marchant, et cesse l'orsqu'on s'arrête, au moins dans les premiers temps de la maladie.

Obs. Le citoyen F....., architecte de Montpellier, éprouvoit depuis environ un an, lorsqu'il marchoit, une douleur spasmodique trèsforte qu'il rapportoit au sternum, et qu'il éprou-

voit en marchant, mais d'une manière si vive qu'il étoit forcé de s'arrêter, crainte de suffoquer. La douleur s'étendoit comme un trait jusqu'à l'épaule. Arrêté, la douleur se dissipoit, pour revenir de temps en temps, par accès très-courts, lorsque le malade marchoit plus ou moins vîte. Les accès tendoient de plus en plus à se rapprocher, et la maladie avoit été méconnue par ceux qui avoient été consultés avant moi. Je ne pus méconnoître la sternalgie (a). Je conseillai de suite la méthode de quelques médecins anglais qui emploient deux vésicatoires ou deux cautères appliqués à un bras et à une cuisse en sautoir, et l'usage interne du vin antimonié d'Huxam; ce traitement fut sans succès. J'y substituai le musc à dose graduellement augmentée : l'efficacité de ce médicament n'a point été problématique.

Esp. VIII. Gasteralgie.

Eth. de gaster, estomac; et algeia, douleur,

Car. Douleur quelconque fixée dans une partie de l'estomac.

⁽a) On pourroit appeler aussi cette maladie, asthme

S-esp. I. Cardialgie.

Eth. de cardia, nom de l'orifice œsophagien de l'estomac; et algeia, douleur.

Syn. Cardialgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs, ord. IV, abdominales internes; gen. XX. — LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. XLVIII. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLVIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XIX.

Bibl. G. G. RICHTER, de cardialgiá; Gotting. 1750; et opusc. medic., tom. 1, pag. 389.

- J. J. F. B. A MILLER, de cardialgiá; Vindobonæ 1762.
- P. I. HARTMANN, de cardialgià, colicâque funestà ab ingestis ortà et multiplici spasmorum genere imprimis St-Viti stipatà; Traj. ad Viad. 1775.
- W. TRNKA DE KRZOWITZ, historia cardialgiæ, etc.; Vindobon. 1785.

STOLL, de cardialgiá; coll. d'EYEREL, tom.
1, pag. 528.

Car. Douleur notable et soutenue de l'épigastre, avec vives anxiétés et menace de syncope. Var. A. Cardialgie flatulente; SAUV., loc. cit., esp. 3. — H. MARCHAND, de cardialgia flatulenta; Argentor. 1754.

Flatulence enfantile; SAUV., cl. IX, ord. IV, gen. XXXIV.

B. Cardialgie enfantile; SAUV., loc. cit., esp. 11.

Colique lactique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 20. — BUCCHAVE, coliçæ lactentium cura; acta reg. soc. med. Haun., tom. I, pag. 317, art. XXIV.

C. Cardialgie organique; BERGER, de cardialgià habituali ex perverso ventriculi situ; acta soc. med. Haun., vol. 1, pag. 171.

S-esp. II. Gastrodynie.

Eth. de gastron, estomac; et odyne, douleur.

Syn. Gastrodynie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXI. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XX.

Car. Affection plus ou moins douloureuse de l'estomac, sans menace de défaillances.

Var. A. Gastrodynie flatulente; SAUV., loc., cit., esp. 2.

B. Gastrodynie périodynique; SAUV., loc. cit., esp. 7.

C. Gastrodynie astringente, serrement d'estomac; Sauv., loc. cit., esp. 9.

D. Gastrodynie attérente; SAUV., loc. cit., esp. 10.

S-esp. III. Pyrose.

Eth. de pyr, feu.

Syn. Pyrose; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. III, de poitrine; gen. XVIII. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; sect. III, des fonctions naturelles; gen. LVIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. III, de poitrine; gen. XVII.

Soda; Linné, cl. IV, douleurs; ord. I, intrinsèques; gen. XLVII. — VOGEL, cl. IV, dou-leurs; gen, CLIV. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. II, adynamies; gen. KLV.

Car. Chaleur anxieuse de l'épigastre, avec ascension d'une humeur qui remonte de temps en temps au gosier, et y laisse pour l'ordinaire une âcreté brûlante. Rap. A. Pyrose vulgaire; SAUV., loc. cit., esp. 1.

Cardialgie sputatoire; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 5.

Var. A. Pyrose suédoise; Sauv., loc. cit., esp. 4.

Formes.

Sor. I. Bulimie acidique; SAUV., cl. VIII, ord. II, gen. VIII, esp. 7.

2. Salivation pyrosique; SAUV., cl. IX, ord.
III, gen. XXIII, esp. 2.

Esp. IX. Entéralgie.

Eth. d'enteros, intestin; et algeia, douleur.

Car. Douleur notable, fixée dans une partie quelconque des intestins.

S-esp. I. Cholérée.

Eth. de chole, bile; et rhæo, je coule.

Syn. Diarrhée cholique; Juncker, tab. cxII. Cholera; Sauvages, cl. IX, flux; ord. II, de ventre, sect. II, non sanguinolens; gen. xv. — Linné, cl. IX, évacuatoires; ord. III, de l'abdomen; gen. cl. xxxvII. — Vogel, cl.

CULLEN, cl. 11, névroses; gen. cx.—
Cullen, cl. 11, névroses; ord. 111, spasmes;
sect. 111, des fonctions naturelles; gen. Lx.
— SAGAR, cl. v, flux; ord. 111, de ventre
non sanglans; gen. xv.

Bibl. J. F. MESSER, de cholera morbo; Halæ 1710; et coll. de HALLER; tom. 111, pag. 73.

A. VATER, de cholera humida; Viteberg.

J. H. J. BAVER, de cholerá; Altdorf. 1751.

MAYER HIRSCH, de cholerá humidá; Gissæ
1751.

B. L. TRALLES, historia choleræ atrocissimæ, etc.; Vratislaviæ 1753.

P. H. ISENBERN, de cholerá; Tubecæ 1759.

C. A. APPUHN, de cholera humida; Gotting.

C. F. KALTSCHMID, de cholera; Jenæ 1760. H. L. HOFFMANN, de cholera morbo; Vind-1761.

J. SIDREN; de cholera; Upsal. 1768.

J. LEMANN, de cholerá; Edinb. 1778.

E. B. METFORD, de cholerá; Edinb. 1777.
STOLL, de cholerá; coll. d'EYEREL, tom.

11, pag. 240.

Car. Fortes anxiétés avec vomissemens et déjections fréquens d'une matière bilieuse, il y a en même temps tranchées, abattement des forces, et pour l'ordinaire crampes dans les extrémités inférieures.

Rap. A. Cholérée spontanée; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Cholérée indienne ; SAUV. 5 loc. cit.; esp. 6.

C. Hématemèse cholérique; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. IV, esp. 9.

S-esp. II. Iléose.

Eth. d'eileos, de ano eilesis, révolution de l'intestin; ou d'eilestai, convulsion de l'intestin; ou d'ileo, qui est le nom d'un intestin.

Syn. Iléosie; THIERRY, observations de physique et de médecine, faites en différens lieux de l'Espagne, etc.; Paris 1791, tom. 1, pag. 131.

Ilæus, ilée; SAUVAGES, cl. 1X, flux; ord.

11, de ventre; sect. 11, non sanguinolens;
gen. XIV. — VOGEL, cl. 1V, douleurs; gen.

CLXII. — SAGAR, cl. V, flux; ord. 111, de
ventre non sanglans; gen. XIV.

Iliaque, iliaca; LINNÉ, cl. IX, évacua-

- toires; ord. 111, de l'abdomen; gen. CLXXXVI.

 Passion iliaque; JUNCKER, tab. CVII.

 Volvulus, convolvulus, miserere.
- Bibl. J. G. LEIDENFROST, de volvulo intestini singulari; Duisburg. 1750.
 - C. F. KALTSCHMID, de ileo, Jenæ 1753.
- R. INNES, de ileo; Edinb. 1753.
- J. E. HEBENSTREIT, progr. aetii amideni anecdoton lib. IX, cap. XXVIII, exhibens tenuioris intestini morbum, quem ileon et chordapsum dicunt, etc.; Lips. 1757.
 - J. BOOT, de ileo; Edinb. 1761.
- J. G. GALLESKY, abhandlung von miserere, oder von der darmgicht, etc.; Mietau und Riga 1767.
 - J. P. Beucke, de ileo; Argentor. 1768.
 - L. GROLL, de volvulo; Harderovic. 1765.
- P. A. GADOLLA, de vomitu intestinorum, sivè volvulo confirmato; Viennæ 1771.
- J. SIDREN, de passione iliacă; Upsaliæ
- C. F. SEYSIRIAT, de passione iliacă; Monsp. 1776.
- Car. Douleurs abdominales avec borborigmes, constipation opiniâtre et vomissement-

par lequel on rend, sur la fin, des matières fécales.

Var. A. Iléose spasmodique; SAUV., loc. cit., esp. 2.

Rap. A. Vomissement iléosique; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XIII, esp. 24.

B. Iléose indien; SAUV., loc. cit., esp. 8.

B. Iléose volvuleux; avec engagement réciproque ou intus-susception des intestins; SAUV., loc. cit., esp. 7.

e 1

S-esp. III. Colique.

Syn. Colique; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXII.—LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. L.—VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLX.—CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; sect. III, des fonctions naturelles; gen. LIX.—SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXI.

Bibl. J. CH. STOCK, de clysterum emollientium usu in colicá suspecto; Jenæ 1757.

T. VAN ZELST, de podagra et dolore colico, etc.; Lausan. 1760.

PH. A. BOEHMER, de colicá; Halæ 1772.

G. H.

G. H. LANGGUTH, de diversá colicam cui randi methodo; Vittemb. 1762.

A. H. Dulhausen, de doloribus intestino-

F. G. HERNANDEZ, tratado del dolor colico, etc.; Madrid 1750.

M. REYE, de dolore colico; Gotting. 1769.

B. THOMAS, de colicà; Edinb. 1770.

P. J. HARTMANN; de cardialgià colicaque funestà ab ingestis ortà et multiplici spasmo-rum genere, imprimis St-Viti stipatà; Trajad Viad. 1775.

C. C. R. SIEMERLING, de colicá ejusque speciebus; Gotting. 1778.

E. B. METFORD, de colică; Edinb.; collede Webster, 1781, tom. 11, ord. 1v, maladies nerveuses, diss. 4, pag. 60.

STOLL, de colicá; coll. d'EYEREL, tom.
11, pag. 115.

Car. Douleurs du bas-ventre, se faisant particulièrement ressentir autour du nombril avec un sentiment plus ou moins aigu de tortillement.

Var. A. Colique spasmodique; SAUV., loc. eit., esp. 7.

Colique des nourrissons; SAUV., loc. cit.,
Tom. II.

esp. 20. — Bucchave, traitement de la colique des nourrissons; acta reg. soc. reg. Haun., vol. 1, pag. 317, art. XXIV. — EBERLE, de colicá infantum; Argentor. 1783.

B. Colique bilieuse; SAUV., loc. cit., esp. 5. (Les vomissemens bilieux ne sont ici que l'effet du spasme, cause de la colique, suivant Cullen.)

C. Colique venteuse; SAUV., loc. cit., esp. 1.

Iléose physode; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIV, esp. 9.

Cholérée sèche; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XV, esp. 2.

Iléose météorique; Gorcy, journ. de méd., tom. XC, pag. 420.

Voy. Cunrad, de colică flatulentă; Regiom. 1698. — Camerarius, de colică spasmodică; Tubing. 1720. — Lohr, de colică flatulentă Gedanensibus familiari; Erford 1726. — Neu-Haus, casus colicæ hystericæ cum epicrisi; Argent. 1769.

S-esp. IV. Tenesme.

Syn. Tenesme; SAUVAGES, cl. IX, flux;

ord. II, de ventre; sect. I, non sanglans; gen. XIX. — LINNÉ, cl. IX, évacuatoires; ord. III, abdominales; gen. CXCIV. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLXVI. — SAGAR, cl. V, flux; ord. III, de ventre non sanguinolens; gen. XIX.

Car. Envie fréquente, mais inutile, d'aller à la selle, avec effort douloureux et évacuation d'une petite quantité de glaires.

Var. A. Tenesme spontané; SAUV., loc. cit., esp. 1.

B. Tenesme indien; SAUV., loc. cit., esp. 3.

C. Tenesme oriental; SAUV., loc. cit., esp. 10.

Esp. X. Proctalgie.

Eth. de proctos, anus; et algeià, douleurs

Syn. Proctalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. v, externes et des membres; gen. XXXII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. v, locales des parties externes; gen. XXX. — MAC-BRIDE; cl. I, universelles; ord. IV, douleurs; gen. XII.

Proctica; LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord, I, intrinsèques; gen. LIX.

Clunésie; VOGEL, cl. IV, douleurs; gens

Car. Douleur à l'extrémité du rectum sans tenesme.

Var. A. Protalgie intertrigineuse (écorchure à l'anus); SAUV., loc. cit., esp. 4.

B. Proctalgie brésilienne (le ver des Portugais, finissant, après des douleurs énormes, par l'ulcère et la mort); SAUV., loc. cit., esp. 6.

Esp. XI. Hépatalgie.

Eth. d'ipar, foie; et algeia, douleur.

Syn. Hépatalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXII.

Hépatique, hepatica; LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. LI.

Car. Douleur fixe dans l'hypocondre droit, affectant le foie, sans indices d'inflammation ou d'obstruction manifeste dans cet organe.

Var. A. Hépatalgie infarctive; Sauv., loc. eit., esp. 3.

- B. Hépatalgie pétitienne ou de Petit (par le gonflement et l'étranglement de la vésicule du fiel); Sauv., loc. cit., esp. 8.
- C. Hépatalgie ictérique (colique hépatique avec jaunisse, ictère spasmodique, jaunisse nerveuse); BRUNING, de ictero spasmodico infantum; Vesaliæ et Lipsiæ 1773.

Esp. XII. Splénalgie.

Eth. de splin, rate; et algeia, douleur.

Syn. Splénalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXIV. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXIII.

Splénique, splenica; LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. LII.

Car. Douleur fixe dans l'hypocondre gauche, occupant la rate sans indices d'inflammation et d'obstruction, sans fièvre vive.

Nota bene. La contraction spasmodique et la rénitence du foie dans l'hépatalgie, et de la rate dans la splénalgie, peuvent facilement en imposer pour une obstruction.

Esp. XIII. Néphralgie.

Eth. de nephros, rein; et algeia, douleur; nephros provenant lui-même de nephrein, pleuvoir.

Syn. Néphralgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales; gen. XXV.— SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXIV.

Car. Douleur fixe dans les lombes, ayant son siège dans les reins, sans symptômes de néphritie (voy. le Gen. LVIII, Esp. XI, tom. III, pag. 207), de calcul (Gen. XLIX, Esp. IX, tom. III, pag. 106), ni de lumbagie (voy. Gen. IX, Esp. III, tom. I, pag. 299).

Esp. XIV. Cystalgie.

Eth. de kysis, vessie; et algeia, douleur.

Car. Douleur spasmodique de la vessie.

Esp. XV. Mictalgie.

Eth, du latin meire, pisser; mictio, l'ac-

Syn. Dysurie; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord.

III, séreux; gen. XXVII. — LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. LVII. —
VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLXIV. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. V, épischèses; gen.
CXXIV. — SAGAR, cl. VI, suppressions; ord.
I, d'humeurs sèreuses; gen. IV.

Bibl. A. WEGELIN, de dysuriá; Argentor. 1779.

Car. Douleur et ardeur de l'urêtre pendant le passage des urines.

Var. A. Dysurie primitive; SAUV., loc. cit., esp. 5.

Dysurie ardente (ardeur d'urine sans maladie de vessie évidente, et sans symptômes locaux d'affection syphilitique); Cullen, loc. cit., esp. 1.

- B. Dysurie coîtique; provenant d'un échauffement extrème dans l'acte vénérien.
- C. Dysurie néonymphale (arrivant aux nouvelles mariées qui ont affaire à un homme vigoureux); SAUV., loc. cit., esp. 14.
- D. Dysurie chronique (familière aux gens qui prennent l'âge de retour); Ch. Bisset, medical essays and observations; Newcastle 1766, pag. 151, art. 13.

Esp. XVI. Élytralgie,

Eth. d'elytron, vagin; et algeia, douleur.

Syn. Pudendagre; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. v, externes et des membres; gen. XXXIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. v, locales des parties externes; gen. XXXI.

Ædma; VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLXVIII.

Bibl. M. BERDOE, an essay on the pudendagra; Lond. 1772.

Car. Douleur du vagin et des grandes lèvres; sans dysurie.

Esp. XVII. Métralgie.

Eth. de metra, matrice; et algeia, douleur.

Syn. Hystéralgie (d'hysteros, matrice; et algeia, douleur); SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXVII, — LINNÉ, cl. IV; douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. LV. — VOGEL, cl. IV, douleurs, gen. CLXIX. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXV.

Car. Douleur fixe dans l'hypogastre, ayant

son siège dans la matrice, sans apparence d'accouchement et sans sièvre inslammatoire.

Rap. A. Métralgie après l'accouchement; BALDINGER, de doloribus post partum; Jena 1770.

. Esp. XVIII. Didymalgie.

Eth. de didymos, double, jumeau; nom affecté aux testicules; et algeia, douleur.

Car. Douleur des testicules.

Esp. XIX. Arthronalgie.

Eth. d'arthron, articulation; et algeia, douleur.

Syn. Entorses, distorsio.

Bibl. P. L. DAGOREAU, dissert. sur les en-

Car. Distension violente de l'appareil fibreux qui environne et affermit les articulations, accompagnée de douleur et de gonflement, et toujours produite par un mouvement forcé,

S-esp. I. Entorse avec irritation.

Premier temps ou premier degré de l'arthronalgie. Car. Irritation, douleur, gêne des mouvemens, engorgement de l'articulation.

S-esp. II. Entorse avec inflammation.

Second temps ou second degré de l'arthronalgie.

Car. Gonflement de toute l'articulation, avec douleurs vives et continues, progrès de l'engorgement, chaleur incommode, rougeur et sièvre.

S-esp. III. Entorse avec suppuration.

Troisième temps ou temps chronique de l'arthronalgie.

Car. L'engorgement qui se dissipoit augmente; une douleur sourde se fait sentir seulement après la fatigue du membre; elle augmente, il survient une tumeur qui blanchit, abcède, s'ouvre par plusieurs trous qui deviennent fistuleux et qui souvent se compliquent de carie.

TABLE ANALYTIQUE

DES, MATIÈRES

DU TOME SECOND.

Exposé méthodique des classes, des genres, des espèces et des formes des maladies.

CLASSE DEUXIÈME.

Oxigénèses.

HÉORIE de cette classe, pag. 5-26.

Les considérations générales relatives à l'action de l'oxigène sont calquées sur celles du calorique, 6.

Rôle important que joue l'oxigene, 7.

Comment il parvient dans le corps des animaux, et phénomènes dépendans de la décomposition du gaz exigène, 7-8.

L'oxigène est stimulant, condensant, suidifiant, colorant; comment et pourquoi? 9.

De sa fixation résulte la combustion; l'oxide, l'acide, le sel en sont les produits, ib.

Phénomènes dus à la respiration du gaz oxigène, 9-10. La respiration tend-elle à échausser ou à rafraîchir, 10-11 Idées des anciens sur le pneuma, 11. Essets généraux de l'oxigène, 13. Utilité de la réunion des gaz oxigene et azote, ib.

Le premier de ce gaz est seul considéré dans les phénomènes de la respiration, 14.

Son action lorsqu'il surabonde, ib.

Rapport qui existe entre cette action et les maladies inslammatoires, 15.

Utilité et insluence de la lumière dans l'oxigénation, 16.

Dissérence qu'on doit trouver entre les inslammations phlegmoneuses et les inslammations érysipélateuses, 17.

L'oxigenation pathologique est prouvée par la formation des acides, 19.

Essets résultans de l'oxigène en excès ou en désaut, 20.

L'augmentation de l'oxigène donne lieu à l'accroissement de la force de cohésion, aux maladies par excès de ton, ib.

La diminution de l'oxigène influe sur l'augmentation de l'hydrogène et du carbone, 21.

Énoncé des faits qui le confirme, 21-22.

Maladies dues à l'oxigène en excès, 22.

Assections morbifiques dépendantes de l'oxigène en désaut, 23.

Division naturelle de la classe des oxigénèses en deux sous-classes, 23.

La première par suroxigénation, ib.

La deuxième par désoxigénation, ib.

Utilité de cette division pour la pratique, ib.

Et simplicité des préceptes médico-chimiques, 24.

Réslexions et preuves directes en saveur de ces préceptes, sournies par le portrait d'HIPPOCRATE, ib.

SOUS-CLASSE PREMIÈRE. Désoxigénèses.

Enonciation des genres qui, composant cette sous-

classe, constituent depuis le genre XIII jusqu'au genre XXIII de la distribution nosologique, 26.

Et donnent onze genres qui sont l'anæmie, la cyanose, la blennose, l'adynamie, la gastrose, l'helminthèse, le stuporisme, la démence, le goître, la dyscinie et la vésanie, ib.

Genre XIII. Anæmie, 27. — Ethymologie, ib. — Symonymie, ib. — Bibliographie (a), ib. — Caractère, ib. — Rapport, ib.

Genre XIV. Cyanose, 27. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Mélasictère nuancé, 28. — B. Périodique, ib.

Genre XV. Blennose, 28. – Ethymologie, ib. – Synonimie, ib. – Bibliographie, ib. – Caractère, ib.

Espèce I. Pyrétique, 29. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 30.

Sous-espèce I. Continue, 30. — Rapports, ib. — Variétés, ib.

Sous-espèce II. Intermittente, 30. - Variété A. Quotidienne, 31. - B. Quarte, ib.

Sous-espèce III. Rémittente, 31. — Rapports, ib. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Espèce II. Blennose apyrétique, 32. — Caractère, ib. — Formes, ib. — Sortes (b), 32-35.

Espèce III. Blennose fluante, 35. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

⁽a) F. FORKENBECK, dissert. inquirens causam perfecta depletionis vasorum in cadavere detecta, etc.; Harderwick 1779; et coll. de BALDINGER, vol. 111, pag. 157.

⁽b) WICHELHAUSEN, de phthisi pituitosa; Gotting. 1783.

Sous-espèce I. Rinorrhée, 36. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce II. Cystirrhée, 36. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 37. — Caractère, ib. — Rapports (a), ib.

Sous-espèce III. Phallorrhée, 37. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce IV. Métrorrhée, 38. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, 32. — Rapport, ib. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Sous-espèce V. Elytrorrhée, 39. — Ethymologie, ib. — Caractère, 40.

Sous-espèce VI. Proctorrhée, 40. — Ethymologie, ib. Synonimie (c), ib. — Caractère, ib. — Rapport, ib.

Genre LVI. Adynamie, 41. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), ib. — Caractère, ib.

J. I. Adynamie générale, 41.

Espèce I. Asthénie, 41. — Ethymologie, ib.

Sous-espèce I. Corporelle, 42. — Synonimie, ib.

⁽a) On transportera aux rapports de la sous-espèce II, le rapport B de la sous-espèce VI.

⁽b) J. L. Doussin-Dubreuil, de la gonorrhée bénigne ou sans virus vénérien, et des fleurs blanches; Paris an VI.

- J. B. BLATTIN, du catarre utérin ou des fleurs blanches;

Paris an IX.

non sanglans; gen. XX.

⁽d) Some toughts on the relaxation of human bodies, etc. 5 Lond. 1783.

Caractère, ib. — Rapports (a), ib. — Variété A., ib. — Formes, ib. — Sortes (b), 42-49.

2.º Rhumatisme dorsal, pag. 46, sorte 8.

Var. B. Masturbation; onanisme.

En lisant avec attention le trait d'histoire qui a rapport au vice d'onan, on s'apercevra facilement que c'est mal à propos qu'on donne le nom d'onanisme à la masturbation.

Bibl. S. A. D. TISSOT, de morbis ex manustupratione; Lausannæ 1758-80. -- L'onanisme, etc.; 8.e édit., Lausan. 1785. -- Della tabe dorsale, etc.; Venise 1785; trad. angl. -- G. H. Ch. Huscheke, de masturbatione; Jena 1788. -- Voy. tableau de l'onanisme; le Nicolais du Saulsai, journ. de méd., tom. KXVIII, pag. 224. -- La Varenne, observ. sur les funestes effets de la masturbation; journ. de médec. milit., tom. 11, pag. 346. -- Estor, observ. sur quelques effets produits par la masturbation; journal de médecine ou annales de la société de médecine-pratique de Montepellier, tom. 1, pag. 110, première partie.

Rap. A. Oubli onanismique; SAUV., cl. VIII, ord. IV,

. B. Tétanos onanismique; PARANT, journ. de méd. milit., tom. VII, pag. 314.

3.º On peut compter parmi les autres sortes omises d'asthénie, le hoquet inanitique; SAUV., cl. V, ord, I, gen,

⁽a) La langueur (LINNÉ, gen. CXI), la lassitude (LINNÉ, gen. KC; VOGEL, gen. CCXXII), la torpeur (VOGEL, gen. CCXXIV), l'adynamie (VOGEL, gen. CCXXV) et la ptose ou l'impuissance de relever la paupière supérieure (VOGEL, gen. CCXXXV) sont des rapports naturels de cette sous-espèce.

⁽b) 1.º Hectique, pag. 46, sorte 7, rap. A. Fièvre anastomose de Boerhaave.-Fièvre hectique anglicane de Grant, an inquiry in the the nature, rise and progress of the fevers, etc.; Lond. 1771; et traduct. franç., tom. 1.

Sous-espèce II. Mentale, 50. — Caractère, ib. — Variété A. Exercice outré des facultés mentales, ib. — Formes, ib. — Sortes (a), 50-57.

Espèce II. Lipothymie, 58 — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. Rapport (b), ib.

Espèce III. Syncope, 58. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 59. — Rapport, ib.

Iv, esp. 8. -- La phthisie hémoptyque; SAUV., cl. X, ord. I, gen. II, esp. 5. -- Le mal d'estomac des nègres; DA-ZILLE, observ. sur les maladies des nègres; 2.e édit.; Paris 1792. -- La cardialgie bradypepte; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 9. -- Diverses hernies par relachement; SAUV., cl. 1, ord. VI, gen. XLIII, esp. 1; gen. XLIV, esp. 11; gen. XLVI, esp. I et 2; gen. XLVII, esp. I, z et 4; gen. XLIX, esp. 1 et 3. -- La distocie par débilité de la mère; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXVI, esp. I. -- La fistule lacrymale par foiblesse du sac lacrymal; RICHTER, mém. sur la fistule lacrymale, 1778, esp. 3. -- L'avortement par relâchement de la matrice; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. VII, esp. 2. -- Le bubon atonique; Swédiaur, malad. vén., 4.e édit., tom. 11, pag. 343. .-- Les ulcères mercuriels atoniques; Swédiaur, ibid. pag. 434. -- La luxation par laxité séreuse des ligamens; SAUV., cl. 1, ord. VI, gen. LX, esp. 7 et 9, etc.

⁽a) L'ennui (VITET, cl. V, ord. I, gen. XVIII.), l'athymie (VOGEL, gen. CCCXXIX.), l'hypocrisie (VITET, cl. V, ord. 11, gen. XIX, avec les espèces III, IV, V, VI, VII, VIII et IX.) et la bassesse (VITET, cl. V, ord. II, gen. XXII.) sont des rapports naturels omis de cette sous-espèce.

⁽b) Scotomie: lypothymie momentanée de la vue; LINNÉ, A. VI, ord. III; gen. CXI.

Espèce IV. Asphyxie, 59. — Ethymologie, ib. — Syanonimie, ib. — Bibliographie (a), 60-61. — Caractère, 61.

Sous-espèce I. Pulmonaire, 62. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapport, ib.

Sous-espèce II. Corporelle, 62. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Asphyxie des noyés, 62. — Bibliographie (b), 62-63. — Variété B. Asphyxie des suffoqués, 63. — Bibliographie, ib.

S. II. Adynamie particulière, 64.

Espèce V. Dysopie, 64. — Ethymologie, ib. — Synonimie (c), ib. — Bibliographie (d), ib. — Caractère, ib.

⁽a) E. PH. BLECH, de aeris dephlogisticati in asphyxiâ; Cotting. 1785.

malibus instituta; Gotting. 1754. -- Extrait from the journal of the board of police, etc.; Edimb. 1775. -- CH. F. JÆGER, experimenta de submersis, etc.; Tubing. 1779; et coll. de FRANK, vol. VI, pag. 78. -- A. J. TESTA, della morte apparente di annegati, etc.; Florence 1780. -- J. FULLER, some neve hints relative to the recovery of persons drowerds, etc.; Lond. 1784. -- DESGRANGES, mém. sur les moyens de perfectionner l'établissement public formé à Lyon en faveur des personnes noyées, etc.; Lyon 1790. Supplém.; Lyon 1790. Rapprochement, idem; Lyon 1792.

⁽c) Hémalopie; VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCXLV. -Mydriase: dilatation de la pupille nuisant à la vue; VOGEL,
Boid, gen. CCXXXVIII.

⁽d). GLEIZE, règlement de vie, ou comment doivent se conduire ceux qui sont affligés de la foiblesse de la vue, etc., a Orléans et Paris 1787.

Sous-espèce I. Myopique, 64. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 65. — Caractère, ib. — Rapport (a), ib.

S-espèce II. Nyctalopique, 65. - Synonimie (b), ib.

— Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, 66.

Sous-espèce III. Colorique, 66. — Caractère, ib.

Espèce VI. Dysosmie, 66. — Synonimie, ib. — (c). — Caractère, ib.

Espèce VII. Dysgeustie, 66. — Ethymologie, ib. — Synonimie, 67. — Caractère, ib.

Espèce VIII. Dysecœe, 67. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — (d). — Caractère, ib. — Variété A. Myringique, ib. — B. Monaute, ib.

Espèce IX. Dysphonie, 67. — Ethymologie, ib. —.
(e). — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Psellique, 68. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Bégayement (f), ib. — B. Grasseyement, ib. — C. Lambdacisme, 69. — D.

⁽a) B. Strabisme des myopes; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. I, esp. 9.

⁽b) Héméralopie: cécité nocturne; Vogel, cl. vi, gen. ccxliv.

⁽c) Bibl. LANG, de odoratu, ejusque læsionibus; opusc.. tom. III, pag. 92. -- SCHEFFEL, de olfactu deficiente; Gryphisw. 1747.

⁽d) Bibl. E. BUCHNER, de auditús difficultate circa febrium acutarum decrementum occurente; Halæ 1769.

⁽e) Bibl. R. A. VOGEL, de larynge humano et vocis formatione; Erford 1747; et opusc. medic., pag. 1. -- E. Long-Fox, de voce humaná; Edinb. 1784; et dissert. medic. Edin-burg. 1784.

⁽f) DE MANSE, mêm. sur le bégayement; académ. des sciences et belles-lettres de Beziers, 1766.

Blésité (a), 70. — E. Balbutiement (b), 71. — F. Mozgilagique, 72. — G. Jottacismique, ib.

Sous-espèce II. Paraphonique, 73. — Synonimie, ib. Caractère, ib. — Rapports, ib. Variété A. Pubertique, 74. — B. Nasale, ib.

Espèce X. Dyspermatisme, 74. — Ethymologie, ib. — Synonimie, 75. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Espèce XI. Dysesthésie, 75. – Ethymologie, ib. – Caractère, ib. – Rapports, 76.

Genre XVII. Gastrose, 76. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (c), 76-77. — Caractère, 77.

Espèce I. Pyrétique, 77. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), 78. — Caractère, 79. — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Légère, 79. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, 80.

Sous-espèce II. Grave, 80. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Espèce II. Apyrétique, 81. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Anorexie, 81. - Ethymologie (e), ib.

⁽a) Traulotis: prononciation viciense des lettres S et R; VOGEL, cl. VI, gen. CCLVIII.

⁽b) DE BERGEN, de balbutientibus; Franc. ad Viadr. 1756.

⁽c) Ph. J. NAGEL, de viviis primarum viarum morbisque exinde oriundis; Argentor. 1761. -- Ph. A. BOEHMER, de cruditatibus ac impuritatibus primarum viarum; Halæ 1776. -- G. F. HILDEBRAND, geschichte der unreinigkeiten in magen und gedærmers, etc.; Brunswick 1789-90.

⁽d) PH. A. BOEHMER, de febrium gastricarum symptomazibus; Halæ 1785.

⁽e) D'oregomai, je desire, j'appette; et d'a, privatif; SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XI.

- Synonimie, ib. - Bibliographie (a), ib. - Caractère, ib. - Variété A. Saburrale, ib. - B. Admirable, ib. - C. de SWART, 82.

Sous-espèce II. Adipsie, 82. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapport, ib.

Sous-espèce III. Nausée, 82. — Ethymologie, ib. — (c). — Caractère, 83. — Rapport, ib.

Sous-espèce IV. Vomissement, 83. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, 83-84.

Sous-espèce V. Flatulence, 84. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Nidoreuse, ib. — B. Acide, ib.

Sous-espèce VI. Dyspepsie, 85. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Apepsie, ib. — B. Dyspepsie, ib. — C. Diaphtore, ib. — Formes de la gastrose apyreptique, 86. — Sortes (c), ib.

Genre XVIII. Helminthèse, 89. - Ethymologie, ib.

⁽a) T. POLZER, de adpetitu deleto; coll. de WASSER-BERG, tom. 111, pag. 56.

⁽b) Bibl. C. F. KALTSCHMID, de nauseâ, etc.; Jena 1765: -- CH. H. SCHNIZLEIN, dissert. inaug. med. sistens observationes quasdam de nauseâ; Erlang. 1787.

⁽c) Parmi ces sortes, doivent être comprises les suivantess Baillement stomachique; SAUV., cl. V, ord. I, gen. III, esp. 3. -- Hoquet gloutonier; SAUV., cl. V, ord. I, gen. IV, esp. 2. -- Hoquet cacochylique; SAUV., ibid, esp. 3. -- Céphalalgie stomachique; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XI, esp. 4. -- Cardialgie saburrale; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. I.

- Synonimie, ib. - Bibliographie (a), 89-93. - Ca-ractère, 93.

Espèce I. Par l'ascaride lombrical, 93. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 94. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Pyrétique, 95. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, ib. — Variété A. Légère, ib. — Caractère, ib. — B. Grave, 96. — Caractère, ib. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Sous-espèce II. Apyrétique, 97. — Caractère, ib. — Formes, 98. — Sortes (c), ib.

Espèce II. Par l'ascaride vermiculaire, 102. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Intestinale, 102. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Sous-espèce II. Cystique, 103. — Rapport, ib. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Espèce III. Par le dragoneau, 103. - Caractère, ib.

⁽a) A. E. BUCHNER, de pruriente naso, frequenti vermium indice; Halæ 1757. -- J. GUIDETTI, dei vermi humani, etc.; Florence 1783.

⁽b) S. MUSGRAVE, an essay on the nature and cure of the worm fever, etc.; Lond. 1776. -- S. C. PHILITES, febrium verminosarum pathologia; Gotting. 1785.

⁽c) Parmi ces sortes doivent se trouver les suivantes: Hémorragie vermineuse; coll. de FRANK, vol. x, pag. 371. -- Balbutiement vermineux, ibid, pag. 370. -- Rumination vermineuse; Goldaghen, de ruminatione humanâ, etc; Halæ 1783. -- Hoquet vermineux; FRANK, loc. cit., pag. 272. -- Anxiété vermineuse, ibid, pag. 369. -- Ozène vermineux, ibid, pag. 370. -- Epilepsie vermineuse; SIGWART, exemplum epileptici verminosi, etc.; Tubing. 1767.

Sous-espèce I. Intestinale, 104. — Caractère, ib. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Sous-espèce II. Cellulaire, 104. — Bibliographie, ib. — Caractère, 105.

Espèce IV. Par le trichure, 105. — Bibliographie, b. — Caractère, 106.

Espèce V. Par la douve, 106. - Caractère, ib.

Espèce VI. Par le tænia, 106. — Bibliographie (a), ib. — Caractère, 109. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Espèce VII. Par l'hydatide, 109. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, 111. — Formes, ib. — Sortes (c), ib.

Espèce VIII. Par le bicorne rude, 114. — Bibliographie, ib. — Caractère, 115.

Espèce IX. Par la furie infernale, 115. — Caractère, ib.

Espèce X. Par la mite psorique, 116. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), ib. — Caractère, 117. — Va-riété A. Gale épidémique, 118.

⁽a), A. J. G. G. BATSCH, naturgeschichte ter bandwurmgattung uberhanpt und ihrer arten ins besondere, etc.; Halæ 1786.

⁽b) J. T. G. AB ECKARDT, dissert. sistens observationem hydatidum in hepate inventarum, etc.; Jenæ 1797; et coll. de BRERA, vol. IV, pag. 157.

⁽c) Grossesse vésiculaire; SAUV.; cl. X, ord. II, gen. X, esp. 4 -- Hernie simulée à l'occasion d'une hydatide dans le ligament rond de la matrice; séance publique de l'école de médecine de Paris, an VIII.

⁽d) L. CH. JUNCKER, de damno ex scabie repulsa et remedio illud avertente; Halæ 1750.

Sous-espèce I. Gale miliaire, 118. - Rapports, ib.

II. Gale boutonnée, 118. — Rapports, 119. — Formes, ib. — Sortes (a), ib.

Espèce XI. Par le pou, 121. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Phthiriase interne, ib. — B. Vésical, ib. — C. Pédiculaire, 122. — D. Inguinal, ib.

Espèce XII. Par le crinon, 122. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapport, ib.

Espèce XIII. Par le pou du bois, 122. — Caractère,

Espèce XIV. Par la sangeue, 123. — Rapport, ib. Espèce XV. Par des larves ou par des vers indéterminés, 124.

Sous-espèce I. Vers dans le cerveau, 124.

Sous-espèce II. Vers dans les sinus frontaux, 124. — Bibliographie (b), ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce III. Vers dans les oreilles, 125.

Sous-espèce IV. Vers dans les dents, 125. — Bibliographie, ib.

Sous-espèce V. Vers dans les poumons, 125.

Sous-espèce VI. Vers dans l'estomac ou dans les intestins, 125. — Rapports, ib.

Sous-espèce VII. Vers dans les organes urinaires, 126. — Rapports, ib.,

Sous-espèce VIII. Vers dans la peau, 126. — Rapports, ib.

⁽a) Ischurie galeuse; VERBECKMOES, actes de la société de médecins, etc. de Bruzelles, tom. 1, pag. 177.

⁽b) M. TROJA, rarissima observatio de magno lumbrico in frontali sinu reperto et totam ejus cavitatem replente; Napoli \$771,

Genre XIX. Stuporisme, 127. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Apnéique, 127. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Par le gaz hydrogène, 127. — Bibliographie, ib. — Caractère, 128. — Rapports (a), ib.

Sous-espèce II. Par le gaz hydrogène sulfuré, 128.

— Caractère, ib.

Sous-espèce III. Par le gaz azote, 129. — Caractère, ib.

Sous-espèce IV. Par le gaz acide carbonique, 119.

— Bibliographie (b), ib. — Caractère, ib. — Rapports, 130.

Sous-espèce V. Par le gaz carboneux, 130. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce VI. Par la fumée, 131. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce VII. Par un arome, 131. — Rapports (c), ib. — Caractère, 133.

Espèce II. Synéqué, 133. — Bibliographie (d), ib. — Caractère, 134. — Rapport A. Fièvres intermittentes, 135. — Synonimie, ib. — Bibliographie (e), ib. —

⁽a) LABORIE, CADET et PARMENTIER, observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconvéniens de leur vidange; Paris 1778.

⁽b) HARMANT, mémoire sur les funestes essets du charbon allumé, etc.; Nancy 1775.

⁽c) THUNBERG, arbor toxicaria macassariensis; Upsal, 1787.

⁽d) MARTINI, analecta ad miasmologiam; Gotting. 1776.

⁽e) G. M. GATTENHOF, caloris febrilis examen; Heidelberg 1775; et coll, de FRANK, vol. VII, pag. 63. -- Id. Frigoris febrilis examen; Heidelberg 1776; et coll. de FRANK, vol. VII, pag. 1. -- TH. SKEETE, experiments and obser-

Caractère, 140. — B. Fièvres remittentes, 141. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 142. — Caractère, 143.

Sous-espèce I. Fièvre quotidienne, 143. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Intermittente, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 144. — Rapports, ib. — B. Rémittente, 145. — Synonimie, ib. — Rapports, 146.

Sous-espèce II. Fièvre tierce, 146. — Synonimie; ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Intermittente, ib. — Synonimie, 147. — Bibliographie, ib. — Caractère, 148. — Rapports, ib. — B. Rémittente, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 149. — Caractère, 150. — Rapports, ib.

Sous-espèce III. Double-tierce, 157. — Caractère, ib. — Variété A. Intermittente, ib. — Rapports, ib. — B. Rémittente, 158. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 160. — Rapports, 161.

Sous-espèce IV. Fièvre quarte, 164. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapport (a), ib. — Variété A. Intermittente, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports typiques, 165. — Symptômatiques, 166. — B. Rémittente, 167. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Rapports, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce V. Fièvre erratique, 168. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Quinte, 169. — B. Sextaine, ib. — C. Septaine, ib. — D. Octaine, ib. — E. Nonaine, ib. — F. Décimaine, 170. — G. Vague, ib.

vations on quilled and red peruvian bark, etc.; Lond. 1786.

- J. P. FRANK, de periodicarum affectionum ordinandis familiis, vol. K, pag. 383.

⁽a) Algor interne; SAUV., cl. VII, ord. 1, gen. IX, esp. 2.

Formes de sièvre intermittente, 170. — Bibliographie, ib. — Sortes (a), ib.

Espèce III. Synoqué, 173. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapport A. Fièvre putrido-sanguine, 174. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 182. — Rapports (b), ib.

Sous-espèce I. Fièvre putride, 183. — Synonimie, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce II. Fièvre maligne, 184. — Synonimie, ib. — Rapports 185. — Variété A. Fièvre d'hôpital, 186. — B. Fièvre de prison (c), 187. — C. Fièvre de vaisseau, 188. — D. Fièvre des camps, 189.

Sous-espèce III. Fièvre pétéchiale, 190. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports (d), 191.

Sous-espèce IV. Fièvre jaune, 194. — Caractère, ib. — Rapports (e), ib.

Sous-espèce V. Fièvre suette, 196. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

⁽a) Algor fiévreux; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. IX, esp. 3. -- Coryza fiévreux; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. XXII, esp. 6.

⁽b) Débilité fébrile; C. F. KALTSCHMID, de causis debilitatis febrilis; Jenæ 1765. -- Catarrhe suffocant; J. GATS-LEFF, de catarrho suffocativo in morbis acutis malignis; Halæ 1760.

⁽c) H. G. F. SOELLING, de febre carcerum; Marburg. 1790; et coll. de BRÉRA, tom. IV, pag. 197.

⁽d) Epidémie de Carouge en 1754, synochus miliaire; SAUV., el. 11, ord. 1, gen. 111, esp. 14.

⁽e) J. H. CHAUFFESSIÉ, specimen sistens historiam febris flavœ americanæ; Halæ 1794; et coll. de BRÉRA, tom. IV * pag. 31.

Sous-espèce VI. Fièvre dysenterique, 196. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce VII. Fièvre colliquative, 199. — Caractère, ib. — Rapports (a), ib.

Sous-espèce VIII. Peste, 200. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, 202. — Rapports, ib.

Formes de sièvre putride, 204. — Sortes, ib. — Fièvre avec charbon (c), 205. — Angine (d), ib. — Pneumonie, 206. — Variole, ib. — Erysipèle; 208. — Pleurésie, ib. — Catarrhe (e), ib. — Scarlatine, 209. — Rougeole, 210. — Aphtes, ib. — Phlyciènes, ib.

⁽a) Ephémère hémacydrotique; SAUV., cl. 11, ord. 1, gen. 1, esp. 10.

⁽b) BAUMER, de peste in quâ simul quœstio movetur an pestis inoculatio sub certis conditionibus, rationi consentaneâ, etc.; Halæ 1770. -- F. L. MELTZERS, beschreibung der pest ann. 1770-72 in Moskau; Moskau 1776. -- G. ORRÆI, memorabilia pestis quæ ann. 1770 in Jassayâ et 1771 in moscuâ grassata est; Pætropoli 1783. -- J. A. Dolst, diss. inaug. medic. sistens observationes nonnullas de peste; 1784. -- A. CANESTRINI, pestis diagnosis, etc.; Salzburg 1795. -- E. H. SMYTH, essay on the plague of athens; Newyorck 1797.

⁽c) MALACARNE, de febre carbunculosá, deque carbone bovillo; Patav. 1797; et coll. de BRÉRA, vol. 111, pag. 1.

⁽d) J. TAYLOUR, de cynanche gangrænosá; Edinb. et colle de WEBSTER, ord. III, tom. I, pag. 466. -- G. DANIEL, de cynanche typho; Edinb. 1782; et diss. medic. Edinburg. 1782.

⁽e) STAHL, de febre catarrhali maligná; Halo. 1708 -- BAUMER, de febre catarrhali maligná; Giessoc 1773.

Espèce IV. Lypothymique, 211. — Synonimie, ib. — Bibliographie (a), 212. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Crotalique, 212. — Rapports, 213.

II. Scyralique, 213. - Rapports, ib.

III. Couleuvrique, 214. — Rapports, ib.

Espèce V. Narcotique, 215. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, 218.

J. I. Produits simples, 218.

Sous-espèce I. Par des plantes de la diandrie (c), 218.

II. Par des plantes de la triandrie, 219. — Raphanie, ib.

⁽a) P. RUSSEL, an account of indian serpens, etc.; Lond. 1796. -- Voyez dans philosophical transactions, etc., vol. LXXIX, pag. 1, ann. 1789, art. III, les observations de M. E. W. GRAY, sur la classe d'animaux appelés par LINNÉ amphibies, principalement sur les moyens de distinguer les serpens vénimeux de ceux qui ne le sont pas.

⁽b) J. COOKE, a treatise of poisons vegetable, animal and mineral, with their cure; Lond. 1770. -- TH. CAELS, de Belgii plantis, etc.; Bruxelles 1774. -- E. G. Bose, de diagnosi veneni ingesti et sponte in corpore geniti; Lipsiæ. 1774. -- B. WILMER, observations on the poisonous vegetables, etc.; Lond. 1780. -- J. G. REYER, de venenorum actione, etc.; Kiliæ Holsat. 1781.

⁽c) J. E. WICHMAN, beytray zur geschichte, etc.; Leips. et Zelle 1771. -- J. L. HERMANN, abhandlung und gegrundete wahrnehmungen von der kriebelkrankeit, etc.; Cassel 1774. -- Model, dissert. sur l'ergot; récréat. physiq., économ. et chim., trad. par PARMENTIER; Paris 1774, tom. 11, pag. 345, 377, 401, 441. -- VETILLARD, mém. sur l'ergot, la maladie qu'il produit et la manière de la guérir; Nancy 1774. -- CH. G. RESSIGS, abhandlung uber des mutterkorn, etc.; Leips. 2786.

(445)

Cous-espèce III. Par des plantes de la tétrandrie, 2212 IV. Par des plantes de la pentandrie, 221. V. Par des plantes de l'hexandrie, 228. VI. Par des plantes de l'octandrie, 228. VII. Par des plantes de la décandrie, 228. VIII. Par des Plantes de l'icosandrie, 229. IX. Par des plantes de la polyandrie, 230. X. Par des plantes de la monadelphie, 2320 XI. Par des plantes de la diadelphie, 233. XII. Par des plantes de la syngénésie, 233. XIII. Par des plantes de la monœcie, 233. XIV. Par des plantes de la diœcie, 234. XV. Par des plantes de la polygamie, 235. XVI. Par des plantes de la cryptogamie, 235. - Bibliographie (a). - Caractère, 239. - Rapports, ib.

- §. II. Produits de la fermentation, 239.
 Sous-espèce XVII. Par le produit fermenté (b) de la vigne, 239. Rapports, 240.
 - J. III. Plantes narcotiques indéterminées, 240.
 Sous-espèce XVIII. Par le jatrops umbellata, 240.
 Genre XX. Démence, 241. Ethymologie, ib. —

⁽a) M. J. N. FELDNER, dissert. exhibens prodromum ad historiam fungorum agri Vindobonensis; Viennæ 1775. -- H. J. Tode, fungi ditionis Mecklenburgensis selecti; Lunebourg 1791.

⁽b) PH. F. GMELIN, de noxis ex abusu potuum spirituosorum in hominem sanum et ægrum redundantibus; Tubing. 1767. -- Observations on the pernicious consequences, etc.; Dublin 1788.

Synonimie, ib. — Bibliographie (a), ib. — Caractère >

Espèce I. Oubli, 243. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Coîtique, 243.

. II. Sénile, 243.

Espèce II. Imbécillité, 244. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Incohérente, 244-

II. Niaise, 244.

III. Bête, 244. - Variétés, 245.

Espèce III. Idiotisme, 245. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Microcéphalique, 245.

Espèce IV. Crétinisme, 246. — Bibliographie (b); ib. — Caractère, ib.

Genre XXI. Goître, 246. — Synonimie, 247. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Goître cellulaire, 247.

Sous-espèce I. Séreux, 248. - Rapport, ib.

II. Mellicérique, 248.

III. Stéatomatique, 248. — Rapports, ib.

Espèce II. Goître thyroïdien, 248. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

⁽a) S. Th. QUELMALZ, de epidemicâ mentis alienatione; Lipsiæ 1752.

⁽b) V. MALACARNE, lettre au professeur FRANK sur l'état des crétins; Turin 1788; et coll. de FRANK, vol. IX, pag. 241. -- Voy. CONE, observations faites dans les Pyrénées, etc., traduct. franç.; Paris 1789.; et gazette de santé, ann. 1789, n.º 38.

Genre XXII. Dyscinie, 249. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Tremblement, 249. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Tremblement débilitique, 250.

II. Tremblement palpitant, 250.

III. Tremblement paralytodé, 250.

IV. Tremblement sénile, 250.

Espèce II. Chorée, 250. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 251. — Rapports, ib. Sous-espèce I. Tétanique, 251.

Espèce III. Béribéri, 251. — Caractère, 252. — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Béribéri épileptiforme, 252.

Genre XXIII. Vésanie, 252. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Mélancolie, 252. — Ethymologie, ib. — Synonimie, 253. — Bibliographie, ib. — Caractère, 254. — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Mélancolie illusoire, 254. — Variété A. Craintive, ib. — B. Inanimique, 255. — C. Morbidique, ib. — D. Religieuse, 256. — E. Phrontique, ib. — F. Stupéfactive, ib. — G. Zoantropique, 257. — H. Féminine, ib. — I. Gaie, ib. — K. Plaintive, 258. — L. Suicidique, ib. — M. Erotomanique, ib. — N. Nympholepsique, 259. — Formes, ib. — Sortes, ib. Espèce II. Nostalgie, 259. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 260. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Nostalgie compliquée, 260.

Espèce III. Démonomanie, 261. - Ethymologie,

ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-Classe Deuxième.

Suroxigênèses.

Sous-classe destinée aux maladies dnas lesquelles il paroît que l'oxigène est en excès, 262.

Les genres nombreux qui la forment sont les suivans; au nombre de trente-sept: le phantasme, la physéose, le mentisme, l'agrypnie, la névrose, la paraphrynie, le salacisme, le tonisme, la narcose, le clonisme, la toux, l'asthme, la phthisie, la gastrorexie, l'algie, la toxicose, la paralysie, l'amaigrissement, l'épischésie, le spermatisme, la diarrhée, la cénose, le diabètes, la grossesse, l'avortement, le calcul, la concretion, 263.

Le leucome, la parectamie, la pneumatose, l'emphraxie, le polype, la phlegmose, le phlegmon, la phlegmonitie, la variole et la vaccine, 264.

Genre XXIV. Phantasme, 264. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Berlue, 264. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 265. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Myode, 265.

II. Réticulaire, 265.

III. Etincélante, 265.

IV. Colorante, 266.

Espèce II. Bévue, 266. — Synonimie, ib. — Caracatère, ib.

Sous-espèce I. Métamorphosique, 266.

II. Chancélante, 266.

III. Diminutive, 267.

IV. Multiplicative, 267.

Sous-espèce

Souts-espèce V. Eloignée; 267.

VI. Palpébrale, 267.

Espèce III. Vertige, 267. — Ethymologie, ib. — Synonimie, 268. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. Sous-espèce I. Psychique, 268.

II. Accidentel, 268.

III. Traumatique, 268.

Espèce IV. Bourdonnement, 269. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Sifflement d'oreilles, ib. — B. Bruissement d'oreilles, ib. — C. Coup de marteau, ib.

Sous-espèce I. Oxicæïque, 269.

Espèce V. Paracuse, 269. — Ethymologie, ib. — Synonimie, 270. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Baricoïque, 270.

II. Oxicoïque, 270.

III. Doublée, 270.

IV. Bruyante, 270.

V. Opposée, 271.

Espèce VI. Hydrophobie, 271. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Espèce VII. Antipathie, 272. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Garactère, ib. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Espèce VIII. Cochemar, 273. — Synonimie, ib. — Bibliographie (a), ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

⁽a) SCHEIDT, de ephialte; Basil: 1618. -- OHEIM, de ineubo; Altd. 1678. -- PETERMANN, de ephialte; Lipsiæ 1688.

-- FISCHER, de ephialte; Erf. 1728. -- HUISINGA, de ineubo; Lugd. Batav. 1734. -- Josa, de ephialte; Budæ 1778;

Espèce IX. Somnambulisme, 274. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 275. — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Mélancolique, 275. — Rapports, ib.

Genre XXV. Physéose, 275. — Ethymologie, ib. — Caractère, 276.

Espèce I. Orgueil, 276. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Hauteur, 276. - Caractère, ib.

II. Fierté, 276. - Caractère, ib.

III. Arrogance, 276. — Caractère, ib.

IV. Dédain, 276. - Caractère, ib.

Espèce II. Vanité, 277. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Prétention, 277. - Caractère, ib.

II. Affectation, 277. — Caractère, 273.

III. Coquetterie, 278. - Caractère, ib.

Espèce III. Vaine gloire, 278. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Magnificence, 273. - Caractère, 279.

II. Dissipation, 279. — Caractère, ib.

III. L'important, 279. - Caractère, ib.

IV. Grandomanie, 279. - Caractère, 280.

V. L'avantageux, 280. — Caractère, ib.

VI. Fanfaronade, 280. - Ciractère, ib.

Espèce IV. Présomption, 280. — Caractère, ib. Sous-espèce I. Pédenterie, 280. — Caractère, ib.

II. Suffisance, 281. - Caractère, ib.

Espèce V. Caprice, 281. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Bisarrerie, 281. — Caractère, ib.

II. Le fantasque, 281. - Caractère, ib.-

Espèce VI. Singularité, 282. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. L'original, 282. - Caractère, ib.

Espèce VII. Distraction, 282. - Caractère, ib. -

Espèce VIII. Le dissipé, 282. - Caractère, 283.

Sous-espèce I. Le volage, 283. - Caractère, ib.

Espèce IX. Le babillard, 283. - Caractère, ib.

Espèce X. Frivolité, 284. - Caractère, ib.

Espèce XI. Inconséquence, 284. — Caractère, ib.

Espèce XII. Curiosité, 284. - Caractère, ib.

Espèce XIII. Prévention, 285. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Entêtement, 285 - Caractère, ib.

II. Opiniâtreté, 285. - Caractère, ib.

III. Obstination, 285. - Caractère, ib.

IV. L'implacable, 286. — Caractère, ib.

Espèce XIV. Imprudence, 286. — Caractère, ib.

Espèce XV. Le menteur, 286. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Le fourbe, 286. - Caractère, 287.

II. Le charlatan, 287. — Caractère, ib.

Espèce XVI. Impudence, 287. — Caractère, ib.

Espèce XVII. Effronterie, 287. - Caractère, ib.

Espèce XVIII. Insolence, 287. - Caractère, 288.

Sous-espèce I. Le railleur, 288. - Caractère, ib.

Espèce XIX. L'indépendant, 288. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Indocilité, 288. — Caractère, ib.

Espèce XX. Le mécontent, 288. — Caractère, 289.

Sous-espèce I. Le bourru, 289. — Caractère, ib.

II. Le grondeur, 289: — Caractère, ib.

III. Le boudeur, 289. — Caractère, ib.

Espèce XXI. Contradiction, 290. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Le chicaneur, 290. — Caractère, ib.

Espèce XXII. L'intrigant, 290. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Le brouillon, 291. - Caractère, ib.

Espèce XXIII. Insensibilité, 291. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Dureté, 291. - Caractère, ib.

II. Cruauté, 291. - Caractère, ib.

III. Ingratitude, 292. — Caractère, ib.

Genre XXVI. Mentisme, 292. — Ethymologie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 293.

Espèce I. Mentisme imaginatif., 293.

Sous-espèce I. Méditabilité, 293. — Bibliographie (a), ib. — Caractère, ib. — Rapports (b), ib.

Sous-espèce II. Sensibilité, 294. — Caractère, 295. — Variété A. Tendresse, ib. — Caractère, ib. — B. Pitié, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce III. Vivacité, 295. — Caractère, ib. — Variété A. Ésprit embrouillé, ib. — Caractère, 296. — B. L'homme bouillant, ib. — Caractère, ib. — C. Brutalité, ib. — Caractère, ib. — D. Brusquerie, ib. — Caractère, ib. — Caractère, ib. — Caractère, 297. — F. Etourderie, ib. — Caractère, ib. — G. Le téméraire, ib. — Caractère, ib. — G. Le téméraire, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce IV. Enthousiasme, 297. — Synonimie, ib. — (c). — Caractère, ib. — Variété A. Extase, 298. — (d) — Caractère, ib. — Rapports, ib. — B. Emphase, ib. — Caractère, ib. — C. Le chimérique, ib. — Caractère, ib. — D. L'extravagant, 299. — Carac-

⁽a) G. F. SIGWART, devi imaginationis in producendis et removendis morbis; Tubing. 1769.

⁽b) Impuissance morale; BABLOT, gazette salutaire, 1786, L. 4.

⁽c) Bibl. GERDESIUS, diss. idea errans in ectasi seu enthusiasmus; Francof. 1692. -- ZORN, diss. de philtris enthusiasticis anglico-batavis; Witeb. 1745.

⁽d) STOCKMANN, diss. de somno..... ectasi, et ephialte; Rostoch. 1625. -- PANECIUS, diss. de ectasi; Witeb. 1695. -- WEDEL, pr. de ectasi putata Christi; Jena 1704. -- HANDT-WIG, diss. de ectasi; Rostoch 1755. -- OESFELD, diss. de ectasi; Halæ 1757.

tère, ib. — E. Métromanie, ib. — Caractère, ib. — F. Mélomanie, ib. — Caractère, ib. — G. Tarantisme, ib. — (a). — Caractère, 300. — H. Pythonissisme, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce V. Fanatisme, 300. — Caractère, ib.

Sous-espèce VI. Inquiétude, 301. — Caractère, ib.

Variété A. Souci, ib. — Caractère, ib. — B. Chagrin, ib. — Caractère, 302. — Rapports, ib. — C. Désolation, ib. — Caractère, ib. — D. Désespoir, ib. — Caractère, ib. — E. Regret, ib. — Caractère, 303. — F. Repentir, ib. — Caractère, ib. — G. Remord, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib. — H. Honte, ib. — Caractère, ib. — I. Misantropie, 304. — Caractère, ib. — K. Mysoginie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce VII. Méchanceté, 304. — Caractère, ib. — Variété A. Calomnie, 305. — Caractère, ib. — B. Médisance, ib. — Caractère, ib. — C. Le satyrique, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce VIII. Frayeur, 305. — Caractère, 306. — Variété A. Epouvante, ib. — Caractère, ib. — B. Alarme, ib. — Caractère, ib. — C. Effroi, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib. — D. Terreur, 307. — Caractère, ib. — Rapports (b), ib.

⁽a) H. SWINBURNE, travels into the two Sicilies, etc., tom. 1, Lond. 1782. -- HUBNER, de tarantismo; Argentor. 1674. -- MULLER, de tarantulá; Witeb. 1676.

⁽b) VILLEM DE LOOS, de menstruorum per terrorem obstructorum curá; Ultraject. 1767. -- Dyshæmorrhoïs pathématique; SAGAR, cl. VI, suppressions; ord. 111, da bas-ventre; gen. XI, esp. 2. -- Convulsions aménorrhéiques; BRUCKMANN, enarratio choræ S. Viti, etc.; 1786, obs. 2.

Espèce II. Mentisme, 307. — Bibliographie (a), ib. Sous-espèce I. Joie, 309. — Caractère, ib. — Rapports, 310.

Sous-espèce II. Espérance, 310. — Caractère, ib. — Variétés, ib.

Sous-espèce III. Amour, 311. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Amour sexuel, ib. — Rapports, ib. — B. Amour de la gloire, 312. — C. Amour-propre, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce IV. Desir, 313. — Caractère, ib. — Variété A. Ambition, ib. — Caractère, ib. — B. Avarice, ib. — Caractère, ib. — C. Sensualité, ib. — Caractère, 314. — D. Gourmandise, ib. — Caractère, ib. — E. Ivroguerie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce V. Haine, 314. — Caractère, ib. — Rapports, ib. — Variété A. Aversion, 315. — Caractère, ib. — B. Envie, ib. — Caractère, ib. — C. Vengeance, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce VI. Jalousie, 316. — Caractère, ib. — Variété A. Par amour, ib. — B. Par vanité, ib. — C. par intérêt, ib.

Sous-espèce VII. Colère, 317. - Bibliographie, ib. Rapports, ib. - Variété A. Le violent, 319. - Caractère, ib. - B. L'emporté, ib. - Caractère, ib. - Caractère, ib. - Caractère, ib.

⁽c) ISENFLAMM, de diverso pathematum animi in corpus imperio, etc., 1773. -- DE MARÉES, de animi perturbationum in corpus potentià; Gotting. 1775. -- W. FALCONER, a dissertation on the influence of the passions upon disorders of the body; Lond, 1788; en franç., Paris 1788.

Genre XXVII. Agrypnie, 320. -- Synonimie, ib. -- Bibliographie (a), ib. -- Caractère, ib.

Genre XXVIII. Névrose, 320. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib.

6. I. Névroses pyrétiques.

Espèce I. Névrose pyrétique, 321. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Lente, 321. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, 322. — Variétés, ib. Sous-espèce II. Vive, 324. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports (b), ib.

§. II. Névroses apyrétiques.

Synonimie, 324. — Bibliographie (c), ib.

Espèce II. Spasme, 326. — Bibliographie (d), ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

⁽a) Eibl. ETMULLER, de vigiliis involontariis; Lips. 1705.
-- LINDER, de somno et insomniis; Konisgb. 1752.

⁽b) Péripheumonie nerveuse; KREISIG, de peripheumonia nervosa; Lips. 1796.

⁽c) J. F. G. GOLDAGHEN, de tensione nervorum in genere; Halæ ad Salam 1770. -- B. Aubert, de morborum ques nervosos aut vaporosos dieunt, principiis et elementis, etc.; Monsp. 1777. -- A. Thomson, an inquiry in to the nature causes and method of cure of nervous disorders, etc.; Lond. 1781. -- Comparetti, occursus medici de vagă ægritudine, infirmitatis nervorum; Venise 1781. -- L. Desbouet, ragionamento fisico chirurgico sopra l'effetto della musica nelle malattie nervose, etc.; Livourne 1782. -- J. Heinecke, de morbis nervorum eorumque frequentissimă ex abdomine origine; Gotting. 1783. -- Bressy, recherches sur les vapeurs; Paris 1789.

⁽d) J. F. CARTHEUSER, de variis spasmorum causis et

Sous-espèce I. Cohibant, 326. — Variété A. Métose, 327. — B. Spasme intestinal, ib. — C. Retrécissement du rectum (a), ib.

Sous-espèce III. Flatueux, 328. Sous-espèce III. (b).

remediis; Francof. ad Viadr. 1752. -- F. BARELTO DE VEIGA, de motu spasmodico; Lugd.-Batav. 1753, -- J. MARX, de spasmis sive motibus convulsivis optimaque iisdem medendi ratione tam generali quam speciali; Halæ 1765. -- E. A. N. COLAI, de spasmi effectibus; Jenæ 1767. -- S. HAHNEMANN, conspectus adfectuum spasmodicorum æthiologicus et therapeuticus, etc.; Erlang. 1779.

- (a) L. F. JOURDAN DUCHADOZ, de proctostenia seu de morbosis intestini recti angustiis; Monspel. 1771.
- (b) Epigénésique; état spasmodique dépendant d'un développement du corps à quelque âge critique.
- Var. A. Crue: développement dans la stature du corps avec mal aise, quelquesois donleurs articulaires, et toujours avec des signes d'une irritabilité augmentée.
- B. Age de sept ans : mal-aise avec un vice dominant d'irritabilité, souvent avec des retours anomaux de sièvre éphémère, chaleur, amaignissement; etc.
- C. Puberté; voy. G. ARMSTRONG, an account of the disease most incident to children, from the birth, till the age opuberty; Lond. 1783. -- G. D'AIGNAN, tableau des variétés de la vie humaine, etc.; Paris 1786. -- G. G. AB EIKEN, de noxis ex proematurá pubertate oriundis in physicá educatione maximopere attentendis; Jena 1788. -- V. T. L'EPINE, essai sur la puberté, etc.: Paris an VII.
- D. Age de quarante ans; J. B. P. CHOUFFE, des accidens et des maladies qui surviennent à la cessation de la menstrustion; Paris en X. -> BECHARD, essai sur les maladies

Eni.

Formes, 328. - Sortes (a), ib.

Espèce III. Névrose hypocondrique, 332. — Synonimie, 333. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, 336. — Rapports, 337. — Formes, ib. — Sortes, ib.

Espèce IV. Névrose métrique, 338. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 339. — Caractère, 340.

Sous-espèce I. Flatulente, 341.

II. Convulsive, 341.

III. Stertoreuse, 341.

Formes, 341. — Sortes (c), ib.

Genre XXIX. Paraphrynie, 344. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, 345.

Espèce I. Délire, 345. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. Sous-espèce I. Délire doux, 346.

II. Délire fort, 346.

Espèce II. Manie, 346. - Ethymologie, ib. - Sy-

auxquelles les femmes sont le plus fréquemment exposées à l'époque de la cessation des menstrues; Paris an X.

⁽a) G. G. RICHTER, judicium de phthisi nervosâ; Gotting. 1744; et opusc. medic., tom. 111. -- J. G. ROEDERER, de phthisi infantum nervosâ; Gotting. 1762. -- Hoquet nerveux; SAUV., cl. V, ord. I, gen. IV, esp. 25. - Dysphagie spasmodique; D. A. COURANT, de nonnullis morbis convulsivis esophagi; Monspel. 1778. -- Dystocie dolorique; M. HE-FINGER, de doloribus parturientium; Vienne 1752. -- VOGEL, de anginis nervosis; Budæ 1779.

⁽b) G. TURNER, de morbo hypochondriaco; Edinb. 1756; et coll. d'Edimb., vol. 11, pag. 401. -- J. N. A. LEUTH-NER, praktische keilung versuche, etc.; Ulm 1781.

⁽c) Baillement hystérique; SAUV., cl. V, ord. I, gen.

nonimie, ib. — Bibliographie, 346. — Caractère, 347.

Sous-espèce I. Manie vulgaire, 347.

II. Manie périodique, 347.

Genre XXX. Salacisme, 347. — Ethymologie, ib. — Synonimie, 348. — Caractère, ib.

Espèce I. Masculin, 348. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Satyriase des jeunes-gens, 348.

II. Satyriase furieux, 348.

Espèce II. Féminin, 349. — Synonimie, ib. — Bi-bliographie (a), ib. — Caractère, ib. — Variété A. Nymphomanie salacitique, ib. — B. Nymphomanie furibonde, 350.

Sous-espèce I. Métromanie douloureuse, 350. Sous-espèce II (b).

Genre XXXI. Tonisme, 350. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

J. I. Général.

Espèce I. Tétane, 350. — Ethymologie (c), ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), 351. — Caractère,

⁽a) G. A. OSTERTAG, de metromania; 1763.

⁽b) Métromanie (maniaque) avec accès de salacité, saus desir du coît. -- Manie hytéralgique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 8.

⁽c) Spasme universel ou convulsion tonique permanente; P. CAMPET, traité pratique des maladies graves des pays chauds, pag. 1.

⁽d) CRAUS, diss. de spasmo cyniquo; Jena 1677. -- BIL-GUER, diss. de tetano; Argent. 1708. -- MUCKE, diss. historia tetani nuper observati; Jena 1770. -- TRNKA, de tetano; Vindob. 1777. -- BRONNER, diss. trismus ex vulnere; Goetwing. 1784. -- CH. FR. G. P. FUNDEL, observationes de

352. — Rapports, ib. — Variété A. Holotonique, ib. — B. Opisthotonique, ib. — C. Emprosthotonique, ib. — D. Latéral, ib.

Sous-espèce I. Pyrétique, 353.

II. Apyrétique, 353. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce III. Anæsthésique, 353. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce IV. Comateux, 353. — Synonimie, ib. — Caractère, 354.

S. II. Particulier.

Espèce II. Strabisme, 354. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Vulgaire, 354.

II. Asthénospathique, 354. - Rapports, ib.

Espèce III. Trisme, 355. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Néophytique (a), 355.

II. Traumatique, 355. — Bibliographie (b), ib. — Rapports, 356.

spasmis tonicis visco albo persanatis; Jena 1784. -- Projet d'instruction sur une maladie convulsive, fréquente dans les colonies de l'Amérique, connue sous le nom de tétanos; par la Société royale de médecine de Paris; Paris 1786, -- LAU-RENT, mémoire clinique sur le tétanos chez les blessés; Strasbourg an V.

⁽a) Description d'une maladie qui a été funeste à un grand nombre d'enfans dans l'hôpitul des femmes en couche de Dublin; par J. CLARKE, dans the transactions of the royal irish academy, etc.; Dublin 1790.

⁽b) ACKERMAN, de trismo; Halæ 1775.

Sous-espèce III. Cataleptique, 356.

Espèce IV. Torticolis, 357. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Espèce V. Contracture, 357. — Synonimie, ib. — Caractère, 358. — Rapports, ib.

Espèce VI. Crampe, 358. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Espèce VII. Priapisme, 358. — Caractère, ib. — Rapports (a), ib.

Espèce VIII. Catalepsie, 359. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, ib. — Rapports, 360.

Sous-espèce I. (c).

Genre XXXII. Narcose, 360. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), 361. — Caractère, 363.

⁽a) Priapisme pubertique; CAMPER, prix de l'académie de chirurgie. tom, v, part. 11, pag. 844.

⁽b) Albinus, de catalepsi; Franc. 1690. -- CAMERARIUS, de catalepsi epileptică; Tubing. 1690. -- BRENDEL, de catalepsi; Witeb. 1700. -- WEDEL, de affectibus soporosis et catalepsi; Jena 1708. -- DIONIS, dissertation sur la mort subite et la catalepsie; Paris 1718. -- EHLEN, de catalepsi; Herbip. 1754.

⁽c) Epilepsie cataleptique; REHFELD, morbi singularis epileptico cataleptici opio potissimum sanati historia; Gryphisw. 1788.

⁽d) SCHEID, de ossiculis in cerebro humano mulieris apoplexiá extinctæ; Argentor. 1687. -- HUGON, de apoplexiá; Basil. 1704. -- WUCCHERER, de apoplexiá; Erf. 1718. --LUDOLFF, diss. de apoplexiá; Erf. 1722. -- SCHMID, diss. sistens extinctum apoplexia ab hæmorrhoidibus suppressis; Altd.

Espèce I. Narcose modérée, 363. — Caractère; iba — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Cataphore, 363. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — (a). — Caractère, ib. — Rapports, 364.

Sous-espèce II. Carus, 364. — Synonimie, ib. — Caractère, 365. — Rapports, ib. — Variété A. Carus solaire, ib. — B. Caroche diurne, ib.

Espèce II. Narcose violente, 365. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Apoplexie, 365. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, 366. — Rapports, ib.

Genre XXXIII. Clonisme, 367. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, ib.

^{1723. --} STEVART, de apoplexiá; Edinb. 1777. -- LANG, de apoplexiá; Frib. 1781. -- NICOLAI, diss. de apoplexiá; Jena 1781. -- CH. G. TH. KORTUM, de apoplexiá nervosá; Goetting. 1785; et coll. de FRANK, vol. VI, pag. 1.

de comate somnolento, observato et curato; Erford 1704. -J. F. CARTHEUSER, de typhomania; Franc. ad Viad. 1750.

CHER, de convulsionibus habitualibus ex terrore; Erfort 1727.

-- TIDEMANN, de motibus convulsivis infantum; Groning.

1746. -- H. P. JUCH, de convulsionibus; Erforde 1751. -
BUCHNER, de salutaribus et noxiis motuum convulsivorum symptomaticorum effectibus; Halæ 1762. -- A. F. WEDENBERG, de strammonii usu in morbis convulsivis; Upsal. 1775; et coll. de BALDINGER, toin. II, pag. 95. -- BAUMER, de convulcionibus clonicis; Giessæ 1778. -- GUILLEMIN, an in conv

Espèce-I. Eclampsie, 367. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 368. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Espèce II. Epilepsie, 368. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (a), 369. — Caractère, 370. — Rapports, ib.

Sous-espèce I. Précursive, 37.1.

II. Aprécursive ou subite, 371: III. (b).

vulsionibus et motibus convulsivis indistinctus opii usus? Nancy

(a) HEINRICI, de epilepsiá; Halæ 1710. -- ZWINGER, de epilepsiá; Basil. 1714. -- BECK, de epilepsiá; Basil. 1715. -- ALBERTI, de epilepsiá; Halæ 1718. -- J. J. STAHL, de morbo caduco; Erford 1730. -- ROLFINCK, de epilepsiá; Jenæ 1737. -- KORTUM, de epilepsiá; Duisb. 1766. -- L. E. HIRSCHELS, gedanken die heilungs art der hinfallenden sucht betrefend; Berlin 1767. -- BALDINGER, de epilepsiá ex tumore duræ matris scirrhoso et carie cranii; Jena 1771. -- F. A. HOFFMANN, de epilepsiá; Vienn. 1776. -- SIGWART, de puellá post mensium suppressionem epileptica; Tubing. 1780. -- BROWN; de epilepsiá; Edinb. 1781. -- J. F. CAPPEL, de epilepsiá, ex tumore nervo vago inhærente; Helmst. 1781. -- REHFELD, analecta historica ad theoriam epilepsiæ; Gryphisw. 1788. -- H. B. MITHOF; de sede irritamenti in epilepsiá aspersis practicis analectis; Goetting. 1789.

(b) Imitative.

L'attaque n'est déterminée que par l'impression que fait la vue d'un épileptique.

Rap. A. Histoire d'une maladie convulsive extraordinaire;
JUSSY, journ. de médec. milit., tom: 11, pag. 53. -- LoRENTZ, ibid, pag. 202-207. -- BAUMES, ibid, pag. 211.

B. Epilepsie par imitation, etc.; J. L. Moreau de la Sarthe, journ. de méd. de SEDILLOT, tom. VI, pag. 226.

Espèce III. Convulsion, 371. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 372. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Espèce IV. Palpitation, 374. — Synonimie, ib. — Bibliographie (a), ib. — Caractère, ib. — Variété A. Vive, 375. — B. Foible, ib.

Espèce V. Hoquet, 375. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, ib. — Rapport, ib. Sous-espèce I. Epileptico-maniaque, 376.

II. (c).

Espèce VI. Eternuement, 376. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), ib. — Caractère, ib.

Genre XXXIV. Toux, 376. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (e), 377. — Caractère, ib.

Espèce I. Simple, 377:

Sous-espèce I. Accidentelle, 377. - Rapport, ib.

II. Gutturale, 377.

III, Xérolaryngée, 378.

IV. Indéterminée, 378.

Espèce II. Quinteuse, 378. — Synonimie, ib. — Bibliographie (f), ib. — Caractère, 379.

, and

_ , , =)

⁽a) FELZ, de palpitatione cordis; Basil. 1694. -- LUDOLFF, palpitationis cordis pathologia et therapia; Erfordt 1727.

⁽b) J. B. N. de singultu; Monspel. 1764. -- Îschudi, de singultu; Basil. 1767.

⁽c) Höquet périodique; JAURION, rec. per. de la soci de méd. de Paris, tom. II, pag. 348.

⁽d) M. HOFFMANN, ptarmographia; Altdordf 1710. --SIDREN, de sternutatione; Upsal. 1779.

⁽e) REINHARD, de tussi; Altordf 1700.

⁽f) J. C. GEHLER, de tussi epidemică infantum convulsivă, etc.; Rostoch 1763. -- GREST, de tussi convulsivă;

Genre XXXV. Asthme, 379. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Paroxistique; Asthme, 379. — Synonimie, ib. — Bibliographie (a), 380. — Caractère, 381. — Rapport, ib.

Sous-espèce I. Humide, 381.

II. Sec, ib. — (b).

Formes, 382. — Sortes, ib.

Espèce II. Suffocant; Orthopnée, 382. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapports (c), 383.

- (a) DE BERGER, de difficultate respirandi; Witeb. 1700.

 -- EYSEL, de caduco pulmonum; Erfordt 1705. -- FRANKENAU, de asthmate; Regiom. 1706. -- WEDEL, de asthmatis mechanică; Jena 1700-17. -- VAGNER, de asthmate,

 Hafn. 1706. -- ETMULLER, de asthmate; Lipsiæ 1710. -
 ZWINGER, nosographia anhelantium; Basil. 1714. -- VATER,

 de ægris asthmaticis rite judicandis et curandis: Viteb. 1724.

 -- Alberti, de spirandi difficultate; Halæ 1726. -- G. Aber
 NETHIE, de asthmate; Edinb. 1754; et coll. d'Edimbourg,

 vol. 11, pag. 95.
- (b) EYSEL, de caduco pulmonum; Erfordt 1705. -- Asthme causé par la poussière de l'ipécacuanha; G. Scott, gazette salutaire, ann. 1776, n.º XLIII.
- (c) C. F. KALTSCHMID, de catarrho suffocativo; Jenæ 1763. -- E. A. NICOLAI, de catarrho suffocativo; Jenæ 1763. -- COOKSON, de asthmate infantum suffocativo; Edinburg. 1780.

Argent. 1778. -- C. F. NURNBERG, diss. super pertussi animadversiones quasdam continens; Witemb. 1783. -- FAIRT-LOUGH, de pertussi; Edinb. 1785. -- GALLEY, de tussi conpulsiva; Edinb. 1785.

Espèce III. Continu; Dyspnée, 383. — Synonimie, ib. — (a). — Caractère, 384.

Sous-espèce I. (b).

Genre XXXVI. Phthisie, 384. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Pulmonaire, 385. — Synonimie, ib. — Bibliographie (c), ib. — Caractère, 388. — Rapport, 389.

⁽a) Bibl. LAVATER, de dyspnæå; Basil. 1715. -- J. F. CARTHEUSER, de diversissimå dyspnææ origine et curatione; Francof. ad Viad. 1753.

⁽b) Dyspnée lunaire; A. FRANZERI, memoria sobre una difficultad de respirar periodica, que manifiesta el influxo de la luna en el cuerpo humano, etc. --- HALLÉ, journal de médecine par CORVISARD, tom. I, pag. 387. -- Bulletin des sciences, 2. année, n.º III, pag. 119.

⁽c) CH. BENNET, theatri tabidorum vestibulum, etc.; Lond. 1654-57. -- Tabidorum theatrum, etc.; Francof. 1665, Leyda 1714-42, Florent. 1755. -- R. MORTON, phthisiologia, sive exercitationes de phthisi; Lond. 1689. -- Bugnot, de tabe pulmonali; Basil. 1705, -- WEDEL, de phthisi; Jenæ 1714. -- VATER, de ægris phthisicis et tabidis; Witeb. 1726. · - FISCHER, diss. exhibens phthiseos cognitionem et curationem; Erfordt 1628. -- J. ARMSTRONG, de tabe purulenta; Edinb. 1732; et coll. d'Edimbourg, vol. I, pag. 61. -- J. G. BREN-DEL, de phthiseos hecticaque discrimine et setaceorum utrobique usu; Gotting. 1754. HEUMANN, observationes quædam anatomicæ ex corpore phthisici enecati desumptæ; Erford 1776. --SHADWEILL, de phthisi pulmonali; Edinb. 1777. -- WEBER, de phthisi pulmonali post hepatitidem exortà, etc.; Argentor. 1779. -- CH. F. JEGER, corticis peruviani in phthisi pulmonali historiam et usum exhibens; Tubing. 1779; et coll.

Sous-espèce I. Phthisie pulmonaire de naissance, 389.

- Rapports, ib.

Sous-espèce II. Phthisie hémoptyque, 389. — Bibliographie, 390. — Caractère, ib. — Rapports, ib.

Sous-espèce III. Phthisie colliquative, 390. — Variété A. Diarrhée colliquative, 391. — B. Ephidrosique, ib.

Espèce III. Hépatique, 391. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — (a).

Espèce IV. Ovairique, 392. — Caractère, ib.

Espèce V. Cellulaire, 393. - Caractère, ib.

Genre XXXVII. Gastrorexie, 393. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce I. Boulimie, 393. — Synonimie (b), ib. — Bibliographie (c), 394. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Voracique (d), 394.

II. Cardio-syncopale, 394.

III. Emétique, 395.

- (a) Ray. A. Toux hépatique: SAUV., cl. v, ord. 1, gen. v, esp. 9.
 - (b) Polyphagie.
- (c) J. F. CARTHEUSER, de appetitu alimentorum præternaturali; Francof. ad Viad., 1760. -- J. S. A. WOGAW, de fame naturali et præter naturam auctå; Jenæ 1774.
- (d) Voracité rematquable; BLANE, account of a man, etc.; biblioth. britannique, scienc. et arts, tom. XIV, pag. 84. -- PERCY, bull. des scienc., n.º III, 6. année, tom. III, pag. 119.

de BALDINGER, vol. VI, pag. 140. -- S. F. SIMMONS, practical observations on the treatmen of consumptions; Lond. 1780. -- J. DE LONGROIS, de la pulmonie, etc.; Paris 1781. -- D. VICI, dissertazione sopra la tisicheza pulmonale; Napoli 1782. -- OBERLEIN, de phthisi ex ulcere; Giessæ 1782.

Espèce II. Polydipsie, 395. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — (a).

Espèce III. Antropophagie, 395. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, ib.

Genre XXXVIII. Algie, 395. — Ethymologie, il:
— Synonimie, ib. — Bibliographie (c), ib. — Caractère, ib. — Rapports, (d), 397. — Formes, ib. —
Sortes (e), ib.

C. Anxiété; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. I, va-gues; gen. V. -- LINNÉ, cl. V, mentales; ord. III, pathétiques; gen. LXXXIX. -- VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CXXXIV. -- SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. I, vagues; gen. V.

Bibl. SCHELHAMMER, de anxietate præcordiali; Jen. 1694.
-- DE BUCHNER, de causis anxietatis ægrotantium, ejusque curatione; Halæ 1747. -- HAMBERGER, de anxietatibus; Jen. 1751.

[[]a] Rap. A. Hydromanie (fièvre, avec desir excessif pour la boisson, des enfans); gazette salutaire, année 1777, n. XXVIII.

⁽b) GRUNER, de antropophago bercano, sectio prior historica; Jenæ 1781. -- F. G. A. DE HATZFELD, de antropophago bercano; Jenæ 1781.

⁽c) J. MONTHEIT, de dolore; Edinb. 1726; et coll. d'Edimbourg, vol. 1, pag. 1. -- J. JUNCKER, de doloribus sorumque causis generatim; Halæ Magdeb. 1755.

⁽d) B. Prurit; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. I, vagues; gen. VIII. -- LINNÉ. cl. IV, douloureuses, ord. II, extrinsèques; gen. LXIV. -- VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CXXXVI. -- SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. I, vagues; gen. VIII.

Bibl. Wedel, de pruritu; Jena 1696. -- Sommer, de pruriginosis affectibus senum; Altd. 1727. -- LOESCHER, de pruritu senili totius corporis; Witeb. 1728. -- Alberti, de affectibus pruriginosis; Halæ 1743. -- Seeber, de pruritu; Lips. 1756.

⁽e) Hoquet dolorique; SAUV., cl. v, ord. 1, gen. 1V, esp. 17.

Espèce I. Céphalalgie, 397. — Bibliographie (a), ib. — Caractère, 398.

Sous-espèce I. Gravative, 398. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, 399. — Sortes (b).

Sous-espèce II. Tensive, 399. — Synonimie, ib. — Bibliographie (c), ib. — Caractère, ib. — Rapport, ib. Sous-espèce III. Fixe, 399. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), 400. — Caractère, ib. — Rapport, ib.

Espèce II. Prosopalgie, 400. — Ethymologie, ib. — Synonimie (a), ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

⁽a) KROKIS, de cephalalgià habituali cum vertigine; Regiom. 1703. --HANNEMANN, de dolore capitis et epilepsià; Kiliæ 1706. -- HELVIG, de cephalalgià; Lugd. Batav. 1719. -- FR. HOFFMANN, de dolore cephalico; Halæ 1731. -- JUNCKER, de doloribus capitis, scandalo medicorum difficulter removendo; Halæ 1741. -- BEIFFUS, de dolore capitis; Giessæ 1749. -- W. TRNKA, historia cophoseos et baryecoiæ; Vindob. 1778. -- PLOUCQUET, de cephalalgià; Tubing. 1787.

⁽b) Formes. Sor. 1. Agrypnie céphalalgique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 4. -- 2. Hoquet céphalique; SAUV., cl. V, ord. 1, gen. IV, esp. 24.

⁽c) F. HOFFMANN, de cæphalæå; Halæ 1735. -- HESSLER, de cæphalæå; Erford 1743.

cephalagra periodică; Erfordt 1703. -- EGER, de hemicraniă; Halœ 1738. -- Juncker, de hemicraniă horologică; Halœ 1747. -- Rossel, de ovo cephalææ specie; Argentor. 1755. -- Schobelt, de hemicraniă; Berol. 1776. -- Nicolai, hemicraniæ therapia; Jena. 1788.

⁽e) Affection particulière très-douloureuse de la face; Fo-THERGILL, medical observations and inquiries etc.; Lond. 1776.

Espèce III. Otalgie, 401. — Ethymologie, îb. — Synonimie, ib. — (a). — Caractère, ib.

Espèce IV. Ophtalgie, 401. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, 402. — Rapport, ib.

Espèce V. Odontalgie, 402. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, 402.

I.º Odontalgie gingivale, 404. — Synonimie, ib. — Bibliographie (c), ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Nerveuse, 403.

II. Maxillaire, 403. — Rapport, ib. — Formes, 404. — Sortes (d), ib.

⁽a) Bibl. WAREN, de catarrho et ex eo descendente otalgiá, etc.; Rostoch 166;. -- Volkamer, de otalgiá; Altordt 1733. -- Kaltschmid, de otalgiá; Jena 1749.

⁽b) SENNERT, de dentium dolore; Witeb. 1629. -- ZEIDLER, de dolore dentium; Lips. 1631. -- WAREN, de catarrho et ex eo descendentibus odontalgià, etc.; Rostoch 1663. -- PAULI, de dolore dentium; Hafn. 1639. -- ROLFINCK, de odontalgià; Jena 1669. -- STISLER, de odontalgià; Lugd.-Batav. 1675. -- VESTI, de odontalgià; Erfordt 1697. -- SCHELAMMER, de odontalgià tactu sanandà; Jena 1701. -- J. DE FRITSCH, de dentibus; Viennoz 1772. -- J. HUNTER, a practical treatise on the diseases of the teeth; Lond. 1778. -- PLISSON, observation sur un nouveau moyen de guérir certaines douleurs des dents; Lyon 1788.

⁽c) Wedel', de dentitione infantum; Jena 1678. -- F. CH. ETTINGER, de ortu dentium et symptomatibus quæ circa dentitionem infantum occurrunt; Tubing. 1770. -- J. J. Plenck, de morbis dentium ac gingivarum; Viennæ 1778. -- H. S. Jackson, physiologia et pathologia dentium eruptionis; Edinb. 1778. J. L. G. Kebel, de dentitione difficili; Lips. 1800.

⁽d) Strabisme odaxistique; M. HERZ, journel der practis-

II.º Odontalgie dentaire, 404. - Synonimie, ib. - Caractère, ib.

Sous-espèce I. Catieuse, 404. — Rapport, 405. —

Sous-espèce II. Maxillaire, 405.

III.º (b).

Espèce VI. Esophalgie, 405. — Ethymologie, ih. — Synonimie, ib. — Bibliographie (c), ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Libre, 406. — Rapport, ib. II. Empêchée (d), 406. — Rapports, ib. III. (e).

chen arzneykunde und wundurzneykunst, etc., par KUFELAND, vol. 111.

- (a) Formes. Sor. 1. Migraine odontalgique; SAUV., cl. VII, ord. 11, gen. XIII, esp. 2.
- (b) III.º Odontalgie (dento-gingivale) par la transplantation des dents.
- Rap. A. Ulcères à la gorge, au palais, avec éruption à la peau, à la suite des dents transplantées; Duncan, medical commentaries, ann, 1785. -- WATSON, medical transactions, vol. III. G. SPENCE, mémoire sur une maladie qui vient quelquefois à la suite de la transplantation des dents; journ. de mêdec, de BACHER, tom. XCII, pag. 149.
- (c) CH. CH. HAASE, diss. medic. sistens causas difficilis deglutitionis, etc.; Gotting. et Strasb. 1781. --- J. BLEU-LAND, observat. anatom. med. de sana et morbosa esophagi structura; Leydæ 1785.
- (d) Voy. T. BORDENAVE, de corporibus extraneis intra essophagum hærentibus; Paris 1763.
- (e) Jeu de nature (dysphagia lusoria); D. BAYFORD, memoirs of the medical society of London, vol. 11; London, 1788, art, XXIV,

Espèce VII. Sternalgie, 406. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. Bibliographie (a), 407. — Caractère, ib. — Observation, ib.

Espèce VIII. Gastéralgie, 408. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Cardialgie, 409. — Ethymologie, ib. Synonimie, ib. — Bibliographie (b), ib. — Caractère, ib. — Variété A. Flatulente, 410. — B. Enfantile, ib. — C. Organique, ib.

Sous-espèce II. Gastrodynie, 410. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Flatulente, 411. — B. Périodynique, ib. — C. Astringente, ib. — D. Attérente, ib.

Sous-espèce III. Pyrose, 411. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — (c). Caractère, ib. — Rapport,

⁽a) G. B. Schoeffer, de angina pectoris vulgò sic dicta; Cotting. 1788.

⁽b) Polz, de cardialgiá; Groning. 1704. -- Sperling, de cardialgiá; Witeb. 1704. -- Zehner, de cardialgiá; Witeb. 1704. -- Wedel, de cardialgiá ex epitome praxeos clinicæ; Jen. 1719. De cardialgiá; Jen. 1742. -- Schaper, de cardialgiá; Rostoch 1720. -- Sennert, de cardialgiá; Witeb. 1722. -- Ludolff, dissert. sistens casum cardialgiæ; Erfurt 1725. -- Van der Does, de cardialgiá; Lugd.-Batav. 1725. -- Goelike, de cardialgiá syncopticá; Franc. ad Viad. 1727. -- Hoff-mann, de dolore cardialgico; Halæ 1731. -- J. Stahl, de cardialgiá; Erfurt 1731. -- Vierthaler, de colico ventriculi spasmodico; Lugd.-Batav. 1732. -- Alberti, de colicá ventriculi; Halæ 1735. -- Juch, de cardialgiá; Erfurt 1743. -- Cartheuser, de cardialgiá spuriá; Franc. 1745. -- Orth, de cardialgiá, etc.; Wirceb. 1750. -- Luther, de cardialgiá; Erfurt 1776.

⁽c) Bibl. LUDOLFF, de ardore ventriculi; Erfort 1722. --

Sortes, ib. Variété A. Suédoise, ib. — Formes, ib. —

Espèce IX. Entéralgie, 412. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Cholérée, 412. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (a), 413. — Caractère, 414. — Rapports, ib.

Sous-espèce II. Iléose, 414. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie (b), 415. — Caractère, ib. — (c). — Variété A. Spasmodique, 416. — B. Volvuleux, ib.

Sous-espèce III. Colique, 416. — Synonimie, ib. — Bibliographie (d), ib. — Caractère, 417. — Variété

J. BLACK, de humore acido à cibis orto et magnesiá; Edinb. 1754; et coll. d'Edimbourg, vol. 11, pag. 271.

⁽a) METTFORD, de cholerá; Edinb. 1777. -- LYONS, de cholerá; Edinb. 1985.

⁽b) SCHACHER, de morbis à situ intestinorum præternaturali; Lips. 1721. -- SCHODER, de mutuo intestinorum ingressu; Stet. 1729. -- BOSE, de coalitus viscerum ventris historià; Lips. 1776. -- CH. G. L. HEYNE, de ileo, etc.; Gotting. 1784. -- D. RAHN, de passionis iliacæ pathologia; Halæ 1791. -- Voyez tom. III de cet ouvrage, pag. 430, rap. B.

⁽c) Rap. A. Coliques iliaques nerveuses; P. J. BARTHEZ, mém. de la soc. médic. d'émulat., 3.e ann., pag. 402.

⁽d) Anhorn, de colicá; Basil. 1705. -- EYSEL, de colicá passione; Erfurtd 1716. -- M. Alberti, de colicá hæmorrhoidali; Halæ 1718. -- Fabricius, de colicá; Rostock 1720. -- Vater, de passionibus colicis et iliacis prudenter avertendis et curandis; Witeb. 1726. De passione colicá et hystericá; Witeb. 1726. -- Juch, de colicá simplici; Erfort 1732. -- J. A. Vedel, de colicá; Jen. 1739. -- Teychmeyer,

A. Spasmodique, ib. — B. Bilieuse, 418. — C. Venteuse, ib.

Sous-espèce IV. Tenesme, 418. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Spontané, 419. — B. Indien, ib. — C. Oriental, ib.

Espèce X. Proctalgie, 419. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, 420. — Variété A. Intertrigineuse, ib. — B. Brésilienne, ib.

Espèce XI. Hépatalgie, 420. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Variété A. Infarctive, ib. — B. Pétitienne, 421. — C. Ictérique, ib.

Espèce XII. Splénalgie, 421. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Espèce XIII. Néphralgie, 422. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib.

Espèce XIV. Cystalgie, 422. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce XV. Mictalgie, 422. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, 423. — Caractère, ib. — Variété A. Dysurie primitive, ib. — B. Coïtique, ib. — C. Néonymphale, ib. — D. Chronique, ib.

Espèce XVI. Elytralgie, 424. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

Espèce XVII. Métralgie, 424. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Caractère, ib. — Rapports, 425.

de doloribus colicis; Jenœ 1740. -- JUNCKER, de morbis colicam consequentibus; Halæ 1749. -- STOCK, de ictero colicœ juncto; Jenœ 1757. -- LANGGUTH, de diversa colicam curandi methodo; Witeb. 1762,

Espèce XVIII. Didymalgie, 425. — Ethymologie, ib. — Caractère, ib.

Espèce XIX. Arthronalgie, 425. — Ethymologie, ib. — Synonimie, ib. — Bibliographie, ib. — Caractère, ib.

Sous-espèce I. Entorse avec irritation, 425. — Ca-ractère, 426.

Sous-espèce II. Entorse avec inflammation, 426.—
Caractère, ib.

Sous-espèce III. Entorse avec suppuration, 426. — Caractère, ib.

FIN de la table analytique des matières du Tome II.

ERRATA.

PAGE 15, ligne 7 de la note, trouve-t-elle, lisez se trouve-t-elle.

Page 26, ligne 24, mélancolie, lisez vésanie.

Page 40, lignes 21 et 22, supprimez ces deux lignes.

Page 58, lignes 16 et 17, supprimez des forces.

Page 78, ligne 10, 4.e partie, lisez 1.e partie.

Page 83, ligne 19, rejection, lisez sortie active.

Page 103, ligne 11, après 1798, lisez et coll. de BRERA, tom. IV, pag. 1.

Page 184, ligne 3, 1085, lisez 1686.

Page 243, ligne 18, tome 11, pag. 55, lisez tome 111, pag. 55 et 103.

Page 305, ligne 16, S-esp. VII, lisez S-esp. VIII.

Page 320, ligne 14, sommeii, lisez sommeil.

Page 324, lignes 19 et 20, supprimez ces deux lignes et transportez-les au commencement de la page 326, à la 2.º ligne.

Page 326, ligne 1, Esp. III, lisez Esp. II.

Page 332, ligne 25, Esp. IV, lisez Esp. III.

Page 359, ligne 16, 1754, lisez 1750.

Ibid, ligne 17, Herschell, lisez Hirschell.

Page 364, ligne 18, hypophose, lisez hypophase.

Page 371, ligne 6, esp. 8, lisez esp. 6.

Page 379, ligne 10, après convulsiva, lisez Viennæ 1780.

Page 413, ligne 25, après cholera, lisez Viennæ 1781.

Page 452, ligne 17, siévreuse, lisez siévreux.

A NISMES, de l'imprimerie de la veuve BELLE, place du château, n.º 32.









